

《產兒科護理學》

- B 1 依我國「人工生殖法」規定，下列何者錯誤？
 (A)禁止從事代理孕母行為
 (B)未婚者可為受術者
 (C)精卵捐贈不得為四等親內之旁系血親
 (D)男性捐贈生殖細胞者應介於 20~49 歲之間
- C 2 有關臺灣家庭結構改變的敘述，下列何者錯誤？
 (A)晚婚晚育造成高齡產婦的問題日增
 (B)女性在兼顧家庭與職場的衝突下，易延後適婚年齡
 (C)雙薪家庭的增加及經濟能力的提升，因而提升我國目前的生育率
 (D)離婚造成單親家庭日增，對家庭結構與性別角色造成衝擊
- D 3 懷孕 8 週的婦女，經常反覆思考「繼續工作」或「擔任專職母親」，此種心境較屬於下列何種孕期心理反應？
 (A)接受懷孕事實 (B)注意力集中在自己 (C)不切實際的幻想 (D)矛盾心理
- D 4 潛伏期待產婦最可能有的行為反應為何？
 (A)會不自主想要向下用力 (B)將注意力及能量集中在產痛上
 (C)顯得疲累失去自我控制感 (D)精力充沛、興奮、有信心接受分娩挑戰
- A 5 有關雌性素 (estrogen) 對懷孕早期生殖系統所造成的變化，下列何者錯誤？
 (A)子宮頸長度增加 (B)產生黏液塞 (C)陰道黏膜變厚 (D)子宮壁厚度增加
- B 6 採全素食之孕婦，容易缺少下列何種營養素？
 (A)維生素 B₁₂、鋅、維生素 D (B)維生素 B₁₂、鐵、鋅
 (C)維生素 C、維生素 B₁₂、鐵 (D)維生素 C、鈣、維生素 D
- B 7 針對胎兒胚胎發育成身體各器官及構造中，下列何者是由中胚層發育而來？
 (A)皮膚上表皮 (B)心臟 (C)肝臟 (D)神經組織
- B 8 下列何種情況最常利用超音波偵測胎兒臍帶動脈血流，以評估胎兒之生長發育？
 (A)妊娠糖尿病 (B)妊娠高血壓 (C)過期妊娠 (D)紅斑性狼瘡
- A 9 有關海洋性貧血之敘述，下列何者錯誤？
 (A)海洋性貧血屬於體染色體顯性遺傳
 (B)監測平均紅血球體積 (MCV) 為海洋性貧血篩檢的第一步驟
 (C)若夫妻為同一型的帶因者，則孕婦可接受羊膜穿刺以利產前診斷
 (D)若夫妻為同一型的帶因者，胎兒可能罹患重型海洋性貧血的機會是 1/4

【版權所有，翻印必究】

- D 10 有關第一孕期唐氏症篩檢的敘述，下列何者錯誤？
 (A) 檢測項目包括母血的 β -hCG 與妊娠關聯之血漿蛋白 A (PAPP-A) 以及超音波掃描測量胎兒頸部透明帶厚度
 (B) 若胎兒頸部透明帶厚度大於 6 毫米，則可懷疑唐氏症或其他染色體異常
 (C) 此項母血篩檢可提早至妊娠 11~14 週左右執行
 (D) 唐氏症四指標篩檢的正確偵測率為 50%
- C 11 有關妊娠期婦女甲狀腺分泌功能變化的敘述，下列何者正確？
 (A) 妊娠期婦女基礎代謝率增加，甲狀腺素 (thyroxine, T4) 的分泌會受到抑制
 (B) 妊娠期甲狀腺功能亢進的婦女，易發生自發性流產
 (C) 甲狀腺結合血清蛋白平均值在第二妊娠期達到最高
 (D) 妊娠期甲狀腺素值會升高，但三碘甲狀腺素 (triiodothyronine, T3) 值則下降
- C 12 子宮生理性收縮環在肌肉上的變化為何？
 (A) 子宮上段變薄，下段變厚 (B) 子宮上段變薄，下段沒有變化
 (C) 子宮上段變厚，下段變薄 (D) 子宮上段沒變化，下段變薄
- D 13 王女士 G₂P₁，在待產活動期時接受腰椎硬膜外麻醉，護理師發現王女士的血壓突然降低，下列護理措施何者最不適宜？
 (A) 增加靜脈輸液輸入量 (B) 協助採左側躺
 (C) 評估胎心率狀況 (D) 評估子宮收縮情況
- A 14 楊女士目前子宮頸口全開且完全變薄，當子宮收縮時感到非常疼痛。有關此時生產疼痛的主要來源，下列何者正確？
 (A) 疼痛來自於子宮韌帶的伸張，陰道及會陰肌肉的伸展
 (B) 疼痛位置主要在下腹部及下背部
 (C) 疼痛來自於子宮體下段伸展及宮縮肌肉細胞缺氧
 (D) 疼痛的神經衝動由 T₁₀~L₁ 傳導進入脊髓
- C 15 陳女士待產時感到疼痛不安並要求止痛藥物，護理師依醫囑給與 meperidine (demerol) 50mg 肌肉注射，下列護理措施何者較不適宜？
 (A) 告知產婦藥物的常見副作用，包括尿滯留、噁心、嘔吐等
 (B) 觀察產婦的頭暈嗜睡狀況，確保使用床欄
 (C) 每小時監測陰道出血情形
 (D) 密切監測胎心率的變異性
- B 16 自然產的胎頭娩出後將進入下列何項分娩機轉？
 (A) 下降 (descent) (B) 外迴轉 (external rotation)
 (C) 屈曲 (flexion) (D) 伸展 (extension)
- D 17 陳女士 G₂P₀ 獨自來待產，下列何種情況需立即通知醫師？
 (A) 主訴先生在外島工作，一直哭泣 (B) 宮縮時胎心率为 110~120 bpm
 (C) 破水 2 小時內，無規則性宮縮 (D) 宮縮間歇時的壓力為 50 mmHg
- D 18 王女士第一胎，目前子宮頸開 6 公分，當宮縮時，閉眼睛不理人，下列何種護理措施較不適宜？
 (A) 引導放鬆呼吸技巧 (B) 提供音樂分散注意力
 (C) 手握產婦雙手陪伴在旁 (D) 提供止痛藥或麻醉劑訊息以供選擇

- C 19 當待產婦使用 PGE₂ 陰道栓劑後，護理師需要監測下列何種變化？
 (A) 子宮頸平滑肌收縮 (B) 胎兒肺部成熟 (C) 子宮頸軟化成熟 (D) 子宮頸水腫
- C 20 張女士 G₂P₂，陰道生產後第 2 天，向護理師表示：「餵母乳時，我的肚子會痛！」。下列護理指導何者適宜？
 (A) 2 星期後疼痛情況就會改善 (B) 因母乳哺餵造成泌乳激素分泌而引起
 (C) 適當活動可以改善疼痛 (D) 先停止母乳哺餵以緩解疼痛
- B 21 陰道生產剛結束的婦女若有尿瀦留的現象，最主要的原因為何？
 (A) 膀胱內括約肌收縮 (B) 胎兒通過產道時壓迫膀胱
 (C) 產後雌性素濃度增加所致 (D) 第一節薦椎神經受損
- A 22 有關結紮手術之敘述，下列何者正確？
 (A) 女性結紮可於產後 24~48 小時內實施 (B) 女性結紮後不會再製造卵子
 (C) 男性結紮後立即有避孕效果 (D) 男性結紮後容易有腹腔沾黏的情形
- C 23 楊女士產後第 10 天，仍有輕微足踝水腫情形，其他的生理徵象均正常，護理師給予的指導何者最適宜？
 (A) 採低鹽飲食 (B) 穿緊縮的襪子促進血液回流
 (C) 坐著時不要交叉雙腿 (D) 多臥床休息，並減少活動
- A 24 有關產後性行為 (sexual intercourse) 的護理指導，下列敘述何者最適當？
 (A) 建議惡露乾淨與會陰傷口癒合後才有性行為
 (B) 母乳哺餵的母親因泌乳激素較高易導致陰道乾燥
 (C) 產後陰道潤滑性減少，可用脂溶性潤滑劑促進潤滑
 (D) 因會陰傷口復原之需要，故產後八週後才能有性行為
- A 25 有關 REEDA 評估會陰切開傷口的內容，下列何者正確？
 (A) R 為 Redness，發紅 (B) E 為 Edege，邊緣
 (C) D 為 Drain，引流 (D) A 為 Abscess，膿瘍
- B 26 下列何者為產後霍曼氏徵象 (Homan's sign) 的評估方式？
 (A) 以兩手食指水平對稱下壓乳房，從乳暈處向上、下牽拉，再向左、右牽拉，檢查乳頭是否突出
 (B) 一手支托膝關節，另一手置於腳掌將其足部向背側屈曲，腓腸肌有無疼痛感
 (C) 將大腿靠近腹部，足底靠近臀部，伸直後再放回床面，大腿前側有無疼痛感
 (D) 雙膝彎曲，雙腳平放，兩手支托雙膝移向左側，再向右側，腰部是否疼痛
- C 27 劉女士第一胎，依據魯賓 (Rubin) 對產後婦女行為態度之研究結果判斷，下列敘述何者表示劉女士處於接受期 (taking-in phase)？
 (A) 寶寶為什麼一直睡覺？ (B) 我要怎麼樣才能讓奶水量增加？
 (C) 生小孩好痛，下次再也不要生了 (D) 我的先生晚上照顧寶寶，現在他很累
- D 28 有關新生兒出生 2~6 小時過渡期常出現的生理現象，下列何者異常？
 (A) 心跳及呼吸速率變化大 (B) 腸蠕動增加
 (C) 解胎便 (D) 黃疸出現
- D 29 有關新生兒黃疸之敘述，下列何者正確？①黃疸最先出現於額頭 ②黃疸症狀漸漸由頭往下，由身體中心向外發展至四肢 ③新生兒出生第 3 天血中膽紅素大於 14 mg/dL，不需處理 ④可輕壓鼻尖觀察皮膚黃疸的情形 ⑤新生兒黃疸照光應保護眼睛與生殖器
 (A) ①②⑤ (B) ②③⑤ (C) ①④⑤ (D) ②④⑤

- D 30 有關新生兒神經成熟度評估之描述，下列何者是早產兒的特徵？
 (A)四肢表現出高張性屈曲 (B)方形窗徵象角度為 0 度
 (C)腳跟無法拉到耳朵 (D)手肘可以超過身體中線
- B 31 有關子宮外孕之敘述，下列何者錯誤？
 (A)血中 hCG 濃度有上升情形 (B)臨床處置只能採腹腔鏡手術
 (C)出血時易有腹痛情形 (D)主要好發於輸卵管壺腹部
- D 32 有關硫酸鎂 ($MgSO_4$) 在安胎使用的敘述，下列何者錯誤？
 (A)需監測尿量 (B)用藥過量時可能抑制深部肌腱反射
 (C)可利用生化檢驗監測血中濃度 (D)血中濃度過高可使用 halothan 拮抗
- B 33 以比夏計分法 (Bishop's score) 評估產婦引產的難易度，下列何者錯誤？
 (A)子宮頸擴張 (B)胎兒體重 (C)胎頭位置 (D)子宮頸堅硬度
- C 34 有關評估 32 週妊娠糖尿病孕婦過去一個月間血糖控制之成效，下列何項檢測最佳？
 (A)飯前空腹血糖值是否均在正常範圍內
 (B)飯後一小時之血糖值是否均在正常範圍內
 (C)糖化血色素值是否均在正常範圍內
 (D)胎兒體重的變化，是否能維持在妊娠週數之 50 百分位
- D 35 正在接受第 2 次腹腔內化學治療的卵巢癌病人，主訴一直覺得噁心，下列回應何者最適當？
 (A)「噁心是化學治療副作用之一，過幾天就會好了」
 (B)「我了解您的心情，聽說吃人蔘可緩解噁心，您要不要試試看」
 (C)「噁心是最輕微的副作用之一，接下來還有其他的副作用會出現」
 (D)「少量多餐，攝取高熱量、高蛋白質飲食可逐漸減緩噁心的現象」
- B 36 有關女陰癌之敘述，下列何者正確？
 (A)是臺灣女性較常見之生殖器官惡性腫瘤之一
 (B)早期病變不明顯常被忽略
 (C)第一期以放射線治療為主
 (D)以基底細胞癌居多
- C 37 王女士第一胎，日前在第一產程的過渡期，隨著越來越密集的字宮收縮，王女士顯得很焦慮不安。在床邊陪伴的王先生詢問護理師：「我的太太很不舒服，我也不知道怎麼幫忙，我最好到產房外面等待？」，此時護理師最適當的回答為何？
 (A)「這個時候王太太最需要你，你怎麼可以離開呢？」
 (B)「因為你的擔心會干擾生產，你最好到外面休息。」
 (C)「我知道你的壓力很大，我們一起來幫忙王太太好嗎？」
 (D)「我知道陪產很辛苦，你確實需要好好休息，寶寶出生後再告訴你。」
- D 38 常導致愛滋病患肺部感染的病原體為何？
 (A)肺炎鏈球菌 (B)黴漿菌 (C)結核桿菌 (D)肺囊蟲
- D 39 朱女士，29 歲，主訴上週做過流產手術，因發燒和下腹部壓痛前來就診，內診時見子宮頸有膿狀分泌物，細菌培養結果為淋病雙球菌、披衣菌和黴漿菌感染，最有可能的診斷為何？
 (A)子宮外孕 (B)巴氏腺囊腫 (C)卵巢囊腫 (D)骨盆腔炎
- B 40 下列何種治療方式，最常用在子宮頸糜爛時的治療？
 (A)電燒灼術 (B)冷凍治療 (C)雷射手術 (D)子宮內膜破壞術

- D 41 下列何者是丹佛嬰幼兒發展篩檢測驗 II (DDST II) 的評估項目之一？
 (A)對於新事物的趨避性 (B)對物體恆存的概念
 (C)遇到挫折的容忍度 (D)語言與社會適應力
- B 42 有關瀕死兒童的呼吸與心臟血管生理反應，下列敘述何者錯誤？
 (A)會出現陳施式呼吸或嘔嘆式呼吸 (B)喉頭肌肉緊縮，可自行將分泌物咳出
 (C)四肢末梢脈搏變弱且不易觸診 (D)皮膚濕冷、蒼白、四肢發紺
- A 43 張太太懷孕 30 週，因早期破水產下重 2,400 公克女嬰，其體重與妊娠週數的關係屬於：
 (A) LGA：大於妊娠週數應有體重 (B) AGA：體重符合妊娠週數
 (C) SGA：小於妊娠週數應有體重 (D) VLBW：非常低出生體重
- D 44 琳琳，9 個月大，因細支氣管合併肺炎再度住院，醫囑需要胸腔物理治療，有關協助家屬進行出院準備，下列護理指導何者正確？
 (A)示範家人如何確認痰堆積部位，先進行姿位引流再行噴霧治療
 (B)確定痰液堆積部位後，每個姿位宜連續姿位引流約 15~30 分鐘
 (C)過程中若琳琳出現呼吸窘迫、躁動不安等現象，仍可繼續執行
 (D)最佳的姿位引流時間，宜安排在飯前 1 小時或飯後 2 小時執行
- C 45 為嬰幼兒進行胸腔物理治療的叩擊 (percussion) 時，下列何項步驟不適當？
 (A)叩擊宜在姿位引流後執行，以達更佳效果
 (B)以手指併攏、弓為杯狀，規律地叩擊胸壁
 (C)為達鬆動痰液的較佳效果，可直接拍擊病童裸露的皮膚
 (D)每部位的叩擊時間建議約為 1~2 分鐘，可視病童情況而增減
- A 46 鎌狀細胞貧血 (sickle cell anemia) 病童不會出現下列何項臨床表徵？
 (A)顳骨變大、顳骨隆起 (B)末端肢體腫脹與疼痛
 (C)視網膜病變以致失明 (D)肝、脾腫大
- A 47 小玉，罹患先天性甲狀腺功能低下 (congenital hypothyroidism)，長期服用甲狀腺藥物，下列何者不是甲狀腺毒性反應之症狀？
 (A)心跳減緩 (B)腹瀉 (C)呼吸困難 (D)痙攣
- D 48 協助罹患腦瘤病童之家庭正向因應疾病時，下列護理照護何者較不適當？
 (A)評估病童及家屬對診斷治療及預後的了解程度
 (B)教導病童及家屬評估病童的神經功能、腦壓上升及感染之徵象
 (C)教導家屬評估病童在生長發展技能上的情形
 (D)避免讓病童知道疾病情況，以免焦慮與緊張
- B 49 婷婷，9 個月大，體重 9 公斤，母親主訴最近一天解水便數次，現體重為 8 公斤，此屬於下列何種情況？
 (A)正常體液流失 (B)輕度脫水 (C)中度脫水 (D)重度脫水
- B 50 小珊，10 個月大，因中耳炎合併熱性痙攣住院治療，下列護理措施何者正確？
 (A)定時給與退燒劑，將體溫控制於攝氏 38 度即可
 (B)小珊發作後有嗜睡情形，故應協助其適當休息
 (C)必須終身服用抗痙攣藥物，以免造成腦部傷害
 (D)小珊並非全身性發作，所以不必使用床欄護墊

- A 51 10 歲的阿偉出現發燒、頭痛、頸背僵硬等症狀，經評估有腦膜炎徵象，下列何者不是腦膜炎的徵象？
 (A)歐氏徵象 (Ortolani's sign) (B)柯林氏徵象 (Kernig's sign)
 (C)布魯辛斯基氏徵象 (Budzinski's sign) (D)角弓反張 (opisthotonic)
- B 52 幼年型類風濕性關節炎兒童的護理措施，下列敘述何者正確？
 (A)評估身體外觀有無異常出血點、關節皮膚冰冷蒼白情形
 (B)清晨易有關節僵硬疼痛，可以熱敷及止痛藥減輕不適
 (C)宜鼓勵多臥床休息，以改善肌無力、預防關節攣縮情形
 (D)類固醇及免疫抑制劑為最常用的長期治療藥物
- C 53 在嬰幼兒期自閉症的症狀表現，易與下列何種障礙混淆？
 (A)味覺障礙 (B)肢體障礙 (C)聽覺障礙 (D)觸覺障礙
- A 54 根據兒童及少年福利與權益保障法 (2015)，醫事人員發現兒童遭受猥褻行為或性交，需於多久時間內通報主管機關？
 (A) 24 小時內 (B) 48 小時內 (C) 72 小時內 (D)一週內
- D 55 陳小妹，2 歲，12 公斤，被人從火場中救出，全身 30% 的部分皮層燒傷，至今已過 1 小時，現以靜脈輸液幫浦提供輸液，輸液的速度每小時應為幾 mL？
 (A) 60 mL (B) 69 mL (C) 90 mL (D) 103 mL
- C 56 小倫，1 個月大，接種 B 型肝炎疫苗。下列何者是適合肌肉注射的部位？
 (A)左上臂三角肌中央 (B)腹直肌 (C)股外側肌 (D)腹臀肌
- A 57 小華，2 歲，護理師在給與左耳用藥時，下列護理措施何者正確？
 (A)給藥前向右側呈半側臥姿 (B)給藥前將耳垂往上往後輕拉
 (C)給藥時直接滴於鼓膜上 (D)給藥後以棉棒塞住小華耳道
- B 58 惠惠，4 歲，護理師預計在 30 分鐘內完成 2c.c. 的抗生素靜脈滴注，目前以每小時 60c.c. 的速度接受靜脈輸液，應該如何處置？
 (A)加在 58 c.c. 輸液中維持 60 gtt./min (B)加在 28 c.c. 輸液中維持 60 gtt./min
 (C)加在 38 c.c. 輸液中維持 40 gtt./min (D)加在 58 c.c. 輸液中維持 30 gtt./min
- A 59 運用感官對事物所得的心像來了解世界，但卻仍不能以質量保留以及長度保留來認知事物，此兒童之認知發展處於：
 (A)感覺動作期 (B)運思前期 (C)具體運思期 (D)形式運思期
- A 60 為 1 歲兒童測量生命徵象，下列敘述何者正確？
 (A)呼吸、脈搏均需測量完整一分鐘 (B)體溫測量以量口溫為佳
 (C)壓脈帶的寬度應為上臂的 1/3 長度 (D)橈動脈是測量脈搏常使用的部位
- B 61 小美，6 個月大，由媽媽抱來接種五合一疫苗，下列護理措施何者適當？
 (A)利用布偶及空針，說明即將注射的程序 (B)注射後請媽媽擁抱，並提供安撫奶嘴
 (C)注射時盡可能的緩慢推注藥劑 (D)注射後，部位貼上小膠布
- B 62 兒童在瀕死過程中，出現呼吸逐漸由深變淺時，下列護理措施何者正確？
 (A)避免給與止痛藥，以防呼吸抑制 (B)出現臨終嘎聲時可抬高頭部或採側臥
 (C)提供昏暗的環境，以減少光線刺激 (D)嚴格限制絕對臥床休息，避免任何活動
- B 63 有關罹患先天性梅毒的嬰兒皮膚丘疹及脫屑的護理措施，下列何者不適當？
 (A)接觸個案時需穿著隔離衣及戴手套 (B)鼓勵家人探視，但避免觸摸或擁抱
 (C)皮膚丘疹及脫屑部位可予以嬰兒油塗敷 (D)評估是否有皮膚丘疹造成的不適或乾燥

- A 64 小鳴，6個月大，腋下、鼠蹊、頸部長出膿疱後結痂脫屑，求醫確診為膿疱病，下列處置何者不適當？
 (A)因膿疱病具高度傳染力，避免清洗患部及引流膿疱
 (B)依醫囑局部塗抹新黴素（neomycin）抗生素藥膏
 (C)協助患嬰清潔及剪短指甲，以保護患處被抓破
 (D)指導照顧者適當隔離、維持清潔，預防感染
- D 65 高危險新生兒常易出現呼吸窘迫症候群（RDS），下列敘述何者錯誤？
 (A)呼氣時出現咕嚕聲（expiratory grunting）
 (B)肺泡缺乏表面張力素，而使肺泡塌陷
 (C)嚴重者兩側肺部 X-ray 檢查呈現出毛玻璃樣之影像
 (D)容易有呼吸性鹼中毒
- C 66 綺綺，3歲，罹患急性白血病，近日因出現疼痛問題而住院，有關疼痛評估的敘述，下列何者正確？
 (A)以 0~10 分的數字量表，使其選擇疼痛分數
 (B)表達疼痛常見的敘述字句，如刺痛、鈍痛、悶痛等，給予選擇
 (C)以哭泣到高興的臉譜量表，使其挑選能代表自己疼痛的臉譜
 (D)以簡單描述量表，使其選擇最適合他感覺疼痛狀態的字詞
- D 67 有關德國麻疹（German measles）的護理指導及處置，下列何者正確？
 (A)體溫及症狀變化於年紀愈小兒童愈明顯
 (B)粉紅色斑丘疹通常由四肢開始出現
 (C)出疹後即不需採接觸防護隔離
 (D)第一孕期婦女應與德國麻疹隔離
- C 68 有關嬰兒玫瑰疹（roseola infantum），下列何者錯誤？
 (A)熱痙攣是常見合併症
 (B)常在退燒後開始發疹，由軀幹開始擴散至四肢
 (C)需要呼吸道隔離至出疹後四天
 (D)感染後可終身免疫
- D 69 有關急性細支氣管炎的敘述，下列何者正確？
 (A)是學齡期兒童常見的上呼吸道感染
 (B)最常見的致病因素是細菌感染
 (C)主要傳染途徑為接觸傳染，需採取隔離措施
 (D)呼吸困難嚴重之病童，會出現呼吸性酸中毒現象
- D 70 兒童的呼吸道系統由於尚未完全發展成熟，而與成人有差異，下列何者正確？
 (A)嬰兒喉頭在頭部較低處，約在第 5~6 頸椎處，易造成吸入性肺炎
 (B)嬰兒會厭軟骨較成人短且有彈性，較不易嗆到
 (C)嬰兒肋骨位置較成人垂直，穩定性小，故較少利用腹式呼吸
 (D)嬰幼兒的歐氏管（耳咽管）較成人短、寬且直，呈水平位置，較易使致病菌或異物入侵
- B 71 持續靜脈灌注前列腺素 E₁（PGE₁）可維持動脈導管開放，增加肺動脈血流。下列何種先天性心臟病，不適合使用 PGE₁ 治療？
 (A)肺動脈瓣狹窄 (B)主動脈狹窄 (C)三尖瓣閉鎖 (D)大血管轉位
- C 72 有關罹患心臟病嬰兒服用毛地黃的護理指導，下列何者正確？
 (A)家中應備聽診器，服用前量心尖脈，至少測量 30 秒
 (B)心跳如果高於 120 下/分鐘，可能是毛地黃中毒的症狀，需盡速就醫
 (C)發生噁心嘔吐時，可能是中毒症狀，需盡速就醫
 (D)毛地黃要與牛奶或食物併用，以減少腸胃刺激

- B 73 陳小弟，8 個月大，體重 7 公斤。心臟手術後第一天，下列何者為異常表徵？
 (A) 肛溫 37.2°C (B) 24 小時尿量 60 c.c.
 (C) 動脈血氧分壓 PaO₂ 95 mmHg (D) 兒童葛氏昏迷量表 (PGCS) 13 分
- A 74 有關先天性甲狀腺功能低下嬰幼兒之症狀處理，下列何者錯誤？
 (A) 嬰兒出生 24 小時內抽血驗 TSH 值以確立診斷
 (B) 嬰兒需暫停母乳哺餵以正確測得甲狀腺素濃度
 (C) 治療目標之一為維持 T₄ 濃度在 10~16 µg/dL
 (D) 需定期注意新生兒聽力檢查及發展評估
- A 75 有關性早熟 (precocious puberty) 的敘述，下列何者錯誤？
 (A) 通常男孩子發生率較高，較女孩高出 2~3 倍
 (B) 血清中 LH, FSH, estrogen, testosterone 皆上升
 (C) 可用 X 光檢查骨骺板癒合情況以確認骨齡
 (D) 可以腦部掃描確認是否有中樞神經性早熟
- C 76 有關腎病症候群 (nephrotic syndrome) 與急性腎絲球腎炎 (acute glomerulonephritis) 之比較，下列何者正確？
 (A) 兩者皆受到 A 群 β 型溶血性鏈球菌感染所致
 (B) 兩者檢驗值皆呈現 C-反應性蛋白質 (CRP) 增加
 (C) 兩者皆會出現蛋白尿臨床表徵
 (D) 兩者皆會出現高血脂現象
- C 77 王小弟，診斷為急性腎衰竭 (acute renal failure)，下列敘述何者正確？
 (A) 腎臟排出過多氫離子與鉀離子，造成代謝性酸中毒
 (B) 依醫囑給與口服 kayexalate，增加鉀離子的吸收
 (C) 少尿期，體液容積過多，宜限制水分攝入
 (D) 少尿期應攝入高鉀、高鈉飲食，矯正電解質不平衡
- B 78 小美，14 歲，診斷為泌尿道感染 (urinary tract infection)，有關出院護理指導，下列何者錯誤？
 (A) 依醫囑服用抗生素，返院追蹤複檢尿液
 (B) 多攝取碳酸飲料，酸化尿液，減少重複感染機會
 (C) 如廁後，由前往後擦拭清潔會陰處
 (D) 排空膀胱，減少重複感染機會
- D 79 有關重症肌無力 (myasthenia gravis) 病童的臨床症狀，下列何者錯誤？
 (A) 眼球肌肉受到侵犯而有複視 (B) 出現吸吮及吞嚥困難
 (C) 顏面神經出現麻痺 (D) 活動之後症狀會改善
- A 80 陳小弟，因腦瘤 (brain tumor) 接受手術，下列護理措施何者錯誤？
 (A) 抬高床尾，增加腦部組織灌流 (B) 監測生命徵象及意識狀況
 (C) 觀察傷口紅、腫、熱、痛現象 (D) 教導避免用力咳嗽或解便