

# 《產兒科護理學》

- (B) 1 王女士想了解溫柔生產的照護方式，下列護理指導何者錯誤？  
 (A)待產期間可以自由走動 (B)常規執行會陰部剃毛  
 (C)生產時先生可以陪產 (D)產後立即進行產檯肌膚接觸
- (C) 2 有關衛生福利部推動的母嬰親善醫院十大措施，下列何者錯誤？  
 (A)提倡產後儘早哺餵母乳 (B)依嬰兒的需求哺餵母乳  
 (C)提供嬰兒安撫奶嘴 (D)實施24小時親子同室
- (C) 3 王女士，G1P0，懷孕16週，為增進母親與胎兒的情感連結，下列護理措施何者最適當？  
 (A)討論增加孕期舒適方法 (B)教導婦女監測胎動出現頻率  
 (C)鼓勵婦女與胎兒說話 (D)安排她參觀產房設備
- (B) 4 懷孕24週婦女接受產檢，血壓值：124/80 mmHg、未有水腫，尿液試紙的白蛋白顯現痕跡（trace），下列解釋何者最適當？  
 (A)子癇前症早期徵象 (B)腎微血管充血所致  
 (C)腎小管對蛋白質吸收增加所致 (D)攝取過多水分所致
- (B) 5 一位單胞胎孕前BMI為30的孕婦，其飲食與體重的護理指導，下列何者最適當？  
 (A)第一孕期可採用極低熱量飲食 (B)整個孕期體重宜增加5~9公斤  
 (C)第二孕期開始，可執行減重計畫 (D)宜在第三孕期再開始增加體重
- (A) 6 有關胚胎附屬器官發育的敘述，下列何者正確？  
 (A)絨毛膜是由囊胚滋養層細胞發育而來  
 (B)羊膜是胚胎膜最外層  
 (C)羊水因含有胎兒尿液，故呈弱酸性  
 (D)羊水量會隨著妊娠週數的增加而遞增，於懷孕40週達最高峰
- (A) 7 有關絨毛膜取樣（Chorionic Villus Sampling）之敘述，下列何者錯誤？  
 (A)可檢測胎兒神經管發育缺陷 (B)可檢測胎兒染色體缺陷  
 (C)建議妊娠10~12週執行 (D)易出現胎兒四肢缺陷
- (D) 8 一般建議孕期無壓力試驗（NST）開始測試的時間點和目的之敘述，下列何者正確？  
 (A)24週，檢測胎兒呼吸成熟度 (B)24週，檢測胎兒神經成熟度  
 (C)32週，檢測胎兒呼吸成熟度 (D)32週，檢測胎兒神經成熟度
- (B) 9 有關以羊水評估胎兒成熟度之敘述，下列何者正確？  
 (A)檢查合宜時機為妊娠16~18週  
 (B)卵磷脂與抱合髓磷脂（L/S Ratio）之比值 $\geq 2$ 表示肺部已經成熟  
 (C)羊水中雌三醇（Estriol）值 $< 10 \text{ mg}$ 表示胎兒肺泡成熟  
 (D)羊水中膽紅素值降至0，表示胎兒肝臟發育有問題
- (C) 10 有關胎血循環，下列何者正確？  
 (A)臍帶內含二條靜脈、一條動脈 (B)臍靜脈血在進入右心房之前為充氧血  
 (C)臍動脈內含缺氧血 (D)卵圓孔是連接左右心室之間的開口
- (B) 11 丁女士使用催產素催生，胎兒監視器顯示胎心音早期減速，此時最合宜之措施為何？  
 (A)立即停止催產素 (B)密切觀察，不需特殊處理  
 (C)馬上給予氧氣 (D)即刻準備剖腹產
- (D) 12 江女士待產中出現換氣過度現象，抱怨暈眩、嘴唇、手指有麻刺感，下列何者為優先護理措施？  
 (A)以鼻導管提供氧氣 $2 \text{ L/min}$  (B)加快靜脈輸液  
 (C)鼓勵採取左側臥 (D)教導減慢呼吸速率
- (C) 13 蔡女士第一胎，因待產緊急狀況需進行剖腹產，醫師採用吸入性麻醉藥物進行全身麻醉，下列何者錯誤？  
 (A)一般以吸入性麻醉藥物作為麻醉誘導用藥  
 (B)使用吸入性麻醉藥物會影響子宮收縮，需注意產婦出血情況

- (C)全身麻醉法容易影響心血管系統，常發生低血壓情況  
(D)吸入性麻醉藥物為脂溶性易通過胎盤，可能抑制新生兒的神經行為
- (A) 14 胡女士子宮頸口全開，護理師協助產婦躺上產檯並準備生產，下列護理措施何者不合適？  
(A)把手擋在會陰部禁止胎兒娩出 (B)請準父親穿上隔離衣、帽子、口罩在產房陪產  
(C)監測胎心率變化 (D)確認預先加熱新生兒處理檯
- (A) 15 王女士，待產期間為右枕前位，進行內迴轉時，下列何者正確？  
(A)自ROA旋轉45度至OA (B)自ROA旋轉135度至OA  
(C)自ROP旋轉45度至OA (D)自ROP旋轉135度至OA
- (B) 16 有關剖腹產的敘述，下列何項錯誤？  
(A)經由腹壁及子宮切口將胎兒取出的手術 (B)剖腹產後，下一次生產一定要採剖腹生產  
(C)胎兒窘迫是緊急剖腹產的適應症 (D)子宮下段橫式切開法，手術出血量較少
- (B) 17 有關待產與生產時姿勢的敘述，下列何者錯誤？  
(A)待產過程中應允許婦女自由活動或變換姿勢  
(B)生產時採膀胱截石臥位姿勢，婦女較能有效用力及減少疲勞  
(C)生產時採背部直立姿勢有利於胎兒下降  
(D)生產時採背部直立姿勢可減少下腔靜脈壓迫，較少發生胎心音異常
- (C) 18 陳女士陰道檢查結果子宮頸擴張9公分，變薄程度80%，高度+2，此時胎頭最有可能在下列那個位置？  
(A)骨盆入口 (B)坐骨棘上 (C)坐骨棘下 (D)陰道出口
- (C) 19 下列何者為母乳哺餵的禁忌？  
(A)乳腺炎 (B)嬰兒膽紅素低於15 mg/dL (C)藥物濫用 (D)母親為A型肝炎
- (D) 20 下列那項父親行為最無助於與新生兒建立依附關係？  
(A)陪伴太太哺餵母乳 (B)對新生兒說話 (C)協助換尿布 (D)詢問新生兒血型
- (D) 21 李女士剖腹生產後第1天，生命徵象正常，尚未排氣，惡露為少量的深紅色，下列護理指導何者適當？  
(A)避免下床活動以免傷口疼痛影響腸蠕動 (B)因乳汁尚未分泌暫不進行母乳餵食  
(C)惡露量為異常應注意有內出血情形 (D)教導腿部運動以防血栓靜脈炎
- (D) 22 吳女士產後第2天於餵母乳時表示：「妹妹跟爸爸長得好像！」此時產婦的行為屬於下列何者？  
(A)分極作用 (B)提出所有權 (C)分離個別化行為 (D)認同行為
- (C) 23 有關產後正常紅惡露 (lochia rubra) 的護理指導，下列何者正確？  
(A)含大量血塊 (B)惡臭味 (C)活動時流量會增加 (D)持續至產後6週
- (A) 24 有關黃體素抑制劑 (RU486) 阻斷懷孕過程的敘述，下列何者正確？  
(A)能破壞子宮內膜的穩定性 (B)懷孕10週前服用  
(C)可做為常規的避孕方法 (D)可在藥房購買自行服用
- (C) 25 李女士GIP1，2小時前因雙胞胎妊娠採剖腹生產，採硬脊膜外麻醉，剛剛自恢復室轉到產後病房，下列何者不是護理師應優先進行的評估項目？  
(A)子宮收縮 (B)母乳哺餵 (C)腸蠕動 (D)下肢神經肌肉感覺
- (D) 26 產婦分娩結束其生理變化回復至懷孕前狀態的期間，稱為什麼時期？  
(A)復舊期 (Involution Phase) (B)惡露期 (Lochia Phase)  
(C)霍曼期 (Homan Phase) (D)產褥期 (Puerperium)
- (B) 27 有關新生兒黃疸之敘述，下列何者錯誤？  
(A)生理性黃疸通常出現於出生後2~3天  
(B)母乳引起的黃疸通常於出生後1個月發生  
(C)增加母乳哺餵次數有助於改善母乳不足性的黃疸  
(D)皮膚發黃的順序為由頭往下，由中心向外發展至四肢
- (B) 28 產後會陰傷口評估所使用的項目縮寫為何？  
(A)HELLP (B)REEDA (C)Rubin' s test (D)Kegel' s test
- (A) 29 有關新生兒皮膚之敘述，下列何者錯誤？  
(A)毛細血管瘤為永久性不會消失 (B)毒性紅斑1~3週會消失

- (C)蒙古斑大約1~5歲會漸漸消退 (D)粟粒疹2~4週會消失
- (A) 30 李小弟出生第2天，無臉部表情與眼睛活動，呼吸規律，偶有驚嚇反應及突發的吸吮動作，此睡眠與活動狀態屬於那一期？  
(A)安靜睡眠期 (B)半睡半醒期 (C)安靜清醒期 (D)活動清醒期
- (A) 31 有關孕期心臟病之敘述，下列何者錯誤？  
(A)懷孕38~40週時心臟負荷最大 (B)孕婦易早產及流產  
(C)懷孕體重增加控制於10公斤左右 (D)每餐飯後至少半小時躺下休息
- (A) 32 有關前置胎盤之敘述，下列何者正確？  
(A)可能造成的原因為多胎妊娠、高齡、前次剖腹產等 (B)部分性前置胎盤仍可陰道生產  
(C)前置胎盤之診斷在懷孕30週前即可確認 (D)孕婦若有前置胎盤情形一律採絕對臥床休息
- (D) 33 有關安胎藥物之敘述，下列何者正確？  
(A)硫酸鎂 (MgSO<sub>4</sub>) 使用需監測呼吸不能少於18次/分 (B)Adalat屬於 $\alpha$ 阻斷劑  
(C)Yutopar適用於妊娠全期 (D)硫酸鎂 (MgSO<sub>4</sub>) 中毒時可使用10%葡萄糖鈣中和
- (B) 34 有關高危險妊娠的敘述，下列何者正確？  
(A)按照古德溫 (Goodwin) 產前胎兒危險計分法，高危險妊娠因子不包括「年齡」與「產次」  
(B)高危險妊娠不一定會造成不良的妊娠結果，良好的產前醫護措施與胎兒健康評估，可降低其危險性  
(C)相對於高危險妊娠孕婦，一般正常孕婦是屬於零危險妊娠者  
(D)高危險妊娠的定義是「懷孕時因生理或心理因素，導致母體（不包括胎兒）病理性傷害」
- (B) 35 Tamoxifen (Nolvadex) 可抑制內生性雌激素作用，以有效降低乳癌的復發，若長期服用此藥物，護理師需要評估下列那些副作用？①血糖過低 ②鈣離子過低 ③噁心嘔吐 ④更年期症狀 ⑤末梢水腫  
(A) ①②④ (B) ③④⑤ (C) ②③④ (D) ①③⑤
- (C) 36 有關子宮肌瘤之敘述，下列何者正確？  
(A)以漿膜下肌瘤為主 (B)易產生惡性病變 (C)常有不正常子宮出血 (D)因黃體素過多所致
- (A) 37 有關生殖器疱疹之敘述，下列何者正確？  
(A)新生兒會經由陰道感染 (B)為第一型單純疱疹病毒感染  
(C)臨床症狀少有發燒現象 (D)只要確實服藥都可根治
- (A) 38 最常導致愛滋病患神經系統感染的病原體為何？  
(A)新形囊球菌 (B)金黃色葡萄球菌 (C)大腸桿菌 (D)肺囊蟲
- (B) 39 有關骨盆腔炎之敘述，下列何者正確？  
(A)都為單一病原體感染 (B)常見之合併症為不孕  
(C)治療期間不需禁慾 (D)少有異常的陰道分泌物
- (C) 40 下列何者不屬於腦下垂體所分泌之促性腺激素 (pituitary gonadotrophic hormones)？  
(A)濾泡刺激素 (follicular stimulating hormone, FSH) (B)黃體生成素 (luteinizing hormone, LH)  
(C)動情激素 (estrogen) (D)催乳激素 (prolactin)
- (C) 41 有關異物吸入造成兒童輕微支氣管阻塞的症狀描述，下列何者錯誤？  
(A)作嘔 (B)咳嗽 (C)無法說話 (D)哮喘
- (C) 42 下列何者是2歲幼兒對疼痛最不常採取的反應？  
(A)大聲哭泣、尖叫，有生氣的表情 (B)抱住父母或他人，尋求情緒上的支持  
(C)出現拖延的行為，如：我要去尿尿 (D)手腳扭動、踢人，不肯合作
- (C) 43 林小弟，妊娠週數37週又3天，出生體重2950公克，採純母乳哺餵，今體重2620公克，減少出生體重的10%以上，給予檢測血糖為33 mg/dL，有關低血糖可能造成的影響及處理，下列何者錯誤？  
(A)立即給予口服餵食葡萄糖水、母乳或配方奶 (B)若餵食不順，則應給予靜脈注射葡萄糖液  
(C)建議每6~8小時監測一次血糖 (D)治療目標應維持血糖在45 mg/dL以上
- (A) 44 有關腸病毒傳染途徑的敘述，下列何者錯誤？  
(A)發病前數天在喉嚨及糞便都有病毒存在，但不具傳染力  
(B)腸病毒感染之傳染力，在發病後1週是高峰  
(C)一般腸病毒在呼吸道口沫中，可存留約1~3週  
(D)可持續經由腸道釋出病毒，時間可達2~3個月

- (D) 45 有關川崎氏症 (Kawasaki Disease) 的敘述，下列何者錯誤？  
 (A)急性期會持續發燒5天以上，並有草莓狀舌  
 (B)急性期給予高劑量阿司匹靈 (Aspirin) 可抗發炎及抑制血小板凝集  
 (C)亞急性期病童的手指、腳趾、肛門會有脫皮現象  
 (D)當症狀獲得控制後，仍須長期追蹤其中樞神經系統病變
- (D) 46 兒童氣喘發作時最容易造成呼吸性酸中毒的原因，下列何者正確？①呼吸過慢 ②新陳代謝率減慢 ③脫水 ④低血氧  
 (A)①② (B)①③ (C)②④ (D)③④
- (B) 47 有關缺鐵性貧血病童口服鐵劑的注意事項，下列何者錯誤？  
 (A)飯前1小時服用，吸收較佳 (B)合併制酸劑服用，吸收較佳  
 (C)宜使用吸管服用液態鐵劑 (D)口服鐵劑期間，大便呈黑色
- (D) 48 王小妹，8歲，罹患急性腎絲球腎炎，若出現少尿情形，有關飲食之護理指導，下列何項應避免？  
 (A)鳳梨 (B)木耳 (C)胡瓜 (D)香蕉
- (A) 49 婷婷，14歲，泌尿道感染三度入院，下列護理指導何者較不適當？  
 (A)增加運動量 (B)解便後由前向後擦拭 (C)多喝水，不憋尿 (D)穿寬鬆的棉質內褲
- (C) 50 有關細菌性腦膜炎的護理措施，下列何者錯誤？  
 (A)靜脈注射抗生素至少10天 (B)維持病童的體溫於正常範圍  
 (C)增加環境刺激預防病童嗜睡 (D)運用姿勢的調整以減輕疼痛
- (A) 51 10歲的大華罹患癲癇 (Epilepsy) 以口服phenobarbital (luminal) 藥物治療，護理人員給予大華母親的護理指導，下列何者正確？  
 (A)定時帶大華回診抽血，監測血中藥物濃度  
 (B)尿液顏色變紅棕色是正常現象  
 (C)服藥6週後未再發生抽搐，即可停藥  
 (D)發作後須進食高碳水化合物飲食，以避免低血糖造成抽搐再度發作
- (D) 52 有關自閉症的護理指導，下列何者最適當？  
 (A)教養方式為自閉症之主要導因，持續與父母親討論教養策略  
 (B)強調按時服藥的必要性，以能治癒自閉症  
 (C)儘速提供多元有變化的新情境刺激，發展其潛能  
 (D)提供正向行為治療，以增強建立適當的行為
- (C) 53 玲玲，14歲，父母親離異後出現進食量少，餐後嘔吐。即使身體質量指數為13，玲玲自覺很胖，故初次診斷厭食症而開始住院接受治療。有關維持營養的護理措施，下列何者最適合？  
 (A)監測玲玲的用餐情形，直到願意開始進食為止  
 (B)提供玲玲高熱量食物，每週增加3公斤為目標  
 (C)建立行為契約，與玲玲討論營養攝取目標  
 (D)邀請父母親參與飲食護理指導，不需轉介家庭心理諮商
- (C) 54 有關青少年憂鬱症的治療與處置，下列何者正確？  
 (A)青少年憂鬱症藥物的使用以三環抗鬱劑為首選  
 (B)輕度憂鬱症青少年使用電氣痙攣治療效果為佳  
 (C)可多攝取多醣類、奶製品、魚油及維生素的食物  
 (D)避免聚焦其人際困擾議題，以免加重憂鬱症狀
- (D) 55 有關嬰兒的心肺復甦術，下列何者正確？  
 (A)急救者只有一人時，先趕快打119求救 (B)先吹兩口氣再壓胸30下  
 (C)以口對口人工呼吸，吹氣時需捏住鼻子 (D)每分鐘壓胸100~120下
- (B) 56 王小妹，8歲，國小2年級，依據皮亞傑 (Piaget) 認知發展理論，其處於「具體運思期」階段，有關此階段發展特性，下列何者正確？  
 (A)開始學習使用符號、象徵及語言  
 (B)較能了解相互間的關係，可將不同事物連接，開始可逆性思考  
 (C)能使用抽象的符號，由系列觀察中，導出符合邏輯之結論  
 (D)能融合數個觀念形成概念

- (C) 57 小華，4歲，因急性腸胃炎住院，護理師與其溝通時，下列何者錯誤？  
 (A)先讓小華熟悉護理師的存在 (B)配合小華的高度與他談話  
 (C)首次互動宜安排與小華單獨談話 (D)避免告知小華「打針一點都不痛」
- (C) 58 有關兒童呼吸與脈搏之測量與評估，下列何者正確？  
 (A)新生兒呼吸急促是指呼吸大於40次/分 (B)1歲以下嬰兒大多數採胸式呼吸  
 (C)2歲以下的兒童通常以聽診器測心尖脈 (D)兒童最常使用的脈搏測量部位為股動脈
- (A) 59 小文，6個月大，被診斷胃食道逆流 (Gastroesophageal reflux)，下列護理指導何者正確？  
 (A)添加麥粉或米粉，泡製較濃稠的配方奶 (B)容易溢奶，其嘔吐物含膽汁  
 (C)餵食後，宜採仰臥平躺姿勢 (D)餵食時，避免拍背排氣引起食物逆流
- (B) 60 宏宏，8個月大，因支氣管炎住院接受治療，服用口服藥物的護理指導，下列何者正確？  
 (A)採躺臥的方式餵藥，以能充分吞入 (B)用姆指壓其下顎（下巴），以便張口  
 (C)將藥輕輕由口腔中間滴入，以免嗆到 (D)滴入時間儘量快速，以免哭泣而吐出
- (C) 61 小華，4歲，住院接受靜脈輸液導管治療，有關導管拔除前後之護理措施，下列何者正確？  
 (A)注射部位的固定，儘量包紮手指末梢，以免鬆脫  
 (B)儘量採纏繞方式固定注射部位，以防關節滑動  
 (C)拔除後，注射部位乾燥後貼上膠布，以維護身體完整性  
 (D)拔除後，給予輸注部位熱敷，以避免產生靜脈炎
- (B) 62 有關早產兒在保溫箱中的感官刺激，下列護理措施何者正確？  
 (A)聽覺刺激應最早開始執行，有助於促進感覺統合  
 (B)晚上可在保溫箱上覆蓋布罩，以調节日夜光線變化  
 (C)協助四肢伸展的姿勢擺位，以達寧握照護的原則  
 (D)採分段式的護理措施，以給予足夠的休息時間
- (D) 63 有關新生兒罹患先天性梅毒的敘述，下列何者錯誤？  
 (A)出現病理性骨折，稱為溫伯格式 (Wimberger's) 徵象  
 (B)背部、臀部皮膚出現圓形丘疹的病灶，具傳染力  
 (C)肝脾腫大、有明顯黃疸，貧血及紅血球母細胞數量增多  
 (D)早期症狀會造成軍刀狀脛骨及痙攣性麻痺
- (B) 64 有關新生兒生產過程造成的鎖骨骨折，下列護理措施何者錯誤？  
 (A)協助穿脫衣服時，採患側先穿後脫的原則 (B)建議採趴睡姿勢，以利患部癒合  
 (C)避免測量圍巾徵象，將手肘越過對側鎖骨中線 (D)抱起時支持後背及臀部，避免自手臂處抱起
- (B) 65 有關囊性纖維變性 (Cystic Fibrosis) 之敘述，下列何者錯誤？  
 (A)此為體染色體隱性遺傳疾病，提供家庭遺傳諮詢  
 (B)止咳劑及抗組織胺藥物可以協助改善呼吸道分泌物排除  
 (C)醫療計畫包括胰酵素製劑、補充脂溶性維生素及鐵劑  
 (D)應採取高熱量、高蛋白飲食，且攝取大量水分
- (D) 66 有關以家庭為中心的兒童緩和安寧醫療照護，下列何者錯誤？  
 (A)乃為了減輕末期病童之痛苦，施予緩解性、支持性之醫療照護  
 (B)強調能免除痛苦，並獲得符合其年齡需求的身心靈安適，安詳離去  
 (C)需同時視病童及家屬為一整體，評估病童與家屬在痛失親人前後之哀傷情緒與靈性需求  
 (D)孩童年齡滿7歲後，須給予簽署不施行心肺復甦術同意書
- (D) 67 小瑛，2歲，入院時，護理師在進行呼吸系統評估時，聽到哮鳴音 (Stridor)，可能的原因為何？  
 (A)氣喘即將發作的前兆 (B)小孩常有的喉部吵雜音，長大後會自然改善  
 (C)呼吸道中有含水分多的分泌物 (D)上呼吸道發炎或有異物阻塞的情形
- (D) 68 有關氧氣治療的敘述，下列何者正確？  
 (A)氧氣頭罩具有噴霧效果，可將氧氣濕化，需用生理食鹽水作為噴霧來源  
 (B)氧氣面罩濃度最好維持在1~3 L/min使用，以避免二氧化碳滯留  
 (C)病童在氧氣帳內易哭鬧，可給予手機或平板電腦，以分散注意力，降低焦慮  
 (D)氧氣帳內應以氧氣分析儀在病童口鼻處測試氧氣濃度
- (C) 69 張小弟，5個月大，至健兒門診接受預防注射，下列何種預防注射疫苗適合張小弟注射？

- (A)日本腦炎疫苗 (B)水痘疫苗 (C)卡介苗 (D)麻疹疫苗
- (B) 70 王小弟，一出生即被診斷為大血管轉位，合併心室中隔缺損。下列何者錯誤？  
 (A)依醫囑靜脈注射前列腺素E1 (Prostaglandin E1, PGE1)，應注意是否有呼吸窘迫與血管炎的副作用  
 (B)合併心室中隔缺損會讓發紺更嚴重，應立即給予100%氧氣  
 (C)合併嚴重的中隔缺損，應注意是否有充血性心衰竭症狀  
 (D)注意血液檢查是否有紅血球增多症狀
- (B) 71 王小弟，3歲，罹患法洛氏四重症。每天早上9點與晚上9點需服用毛地黃。若在早上需服藥時間的3小時後，發現遺漏服用，下列護理措施何者正確？  
 (A)立即補服一劑，下一劑延到晚上12點服用 (B)立即補服一劑，下一劑維持晚上9點服用  
 (C)不需補服，下一劑維持晚上9點服用 (D)不需補服，晚上9點服用兩劑
- (D) 72 王小弟，5歲，因心臟病需進行胸骨切開式開心手術。有關傷口換藥的術前心理準備，下列護理措施何者合適？  
 (A)王小弟年紀還小，不需先提供傷口訊息 (B)提供真實的傷口換藥影片給王小弟看  
 (C)告訴王小弟傷口不會疼痛、不用害怕 (D)用布偶示範傷口換藥的方式
- (A) 73 阿明，1歲，因罹患急性淋巴性白血症正接受誘導期化學治療。因發燒而追蹤抽血檢查，白血球100/mm<sup>3</sup>，血色素7.6 g/dL，血小板為10000/mm<sup>3</sup>，下列護理措施何者正確？  
 (A)依醫囑立即給予廣效性的預防性抗生素 (B)發燒時，可給予Aspirin藥物協助降溫  
 (C)鼓勵阿明沒發燒時可多活動，如走路及玩球 (D)仍可依其年齡施打水痘疫苗
- (D) 74 新生兒篩檢為半乳糖血症陽性之飲食原則，下列何者錯誤？  
 (A)禁止餵食市售兒童配方奶 (B)應避免餵食乳酪製品  
 (C)依醫囑建議補充維生素與礦物質 (D)維持完全母乳哺餵以維持足夠營養
- (D) 75 小明，15歲，因慢性腎衰竭而引發副甲狀腺功能亢進 (Hyperparathyroidism)，血鈣質為12 mg/dL，骨骼X光顯示脫鈣現象。相關的護理措施，下列何者錯誤？  
 (A)維持足夠的水分攝取，減少腎結石產生 (B)為預防骨折發生，下床活動必要時可穿硬背心  
 (C)心尖脈監測需測滿1分鐘，注意有無心律不整 (D)建議服用維生素C，以促進鈣質排出
- (C) 76 副甲狀腺功能低下 (Hypoparathyroidism) 的兒童會出現的臨床表徵，下列何者正確？  
 (A)血中鈣質為12.0~15.0 mg/dL (B)血中磷質為2.5~3.5 mg/dL  
 (C)喉部肌肉痙攣及喘鳴現象 (D)大量鈣流失而骨密度不足
- (B) 77 小奇，10個月大，接受尿道下裂 (Hypospadias) 手術，有關手術後護理措施，下列何者錯誤？  
 (A)應臥床休息及限制肢體活動 (B)可跨坐父母身上，進行靜態活動  
 (C)監測尿量、尿液顏色及導尿管的通暢度 (D)尿液由陰莖以外部位滲出，應通知醫師
- (B) 78 張小弟，2個月大，經由鼻胃管餵食，下列有關管灌餵食的敘述何者正確？  
 (A)總灌入量為胃殘餘量加上該次灌食量  
 (B)如出現嘔吐、腹脹、呼吸暫停等徵象應立即停止灌食  
 (C)餵食後，採坐姿或左側半坐臥，避免食物逆流  
 (D)鼻胃管餵食期間，不應給予安撫奶嘴，以免影響呼吸
- (A) 79 協助有吞嚥困難的學齡前腦性麻痺病童進食，下列護理措施何者正確？  
 (A)協助病童坐起、身體維持正中位置 (B)使病童肩膀前屈、膝蓋放鬆低於大腿  
 (C)食物位置高於嘴巴，將食物放於舌頭前方 (D)選擇適當輔具，完全由照顧者餵食
- (D) 80 張小妹，4個月大，被診斷水腦 (Hydrocephalus)，接受腦室腹膜分流 (V-P shunt) 手術，有關手術後護理措施，下列何者錯誤？  
 (A)記錄頭圍變化，觸診前凶門有無膨出  
 (B)觀察意識狀態及顱內壓增高徵象  
 (C)植入引流管處，勿碰撞或擠壓，保持傷口乾燥  
 (D)觀察引流管阻塞徵象是周圍皮膚出現紅、腫、熱