

《內外科護理學》

- C 1 有關病毒性腦膜炎的處置，下列何者正確？
(A)給予10天抗生素使用(B)使用抗病毒製劑
(C)採症狀療法，以減輕不適(D)增加水分攝取，以排出毒素
- B 2 李先生是建築工人，近日因椎間盤突出入院行腰椎椎板切除術，護理師提供之術後護理指導，下列何者正確？
(A)絕對臥床3日才可以下床活動
(B)背架需使用3~6個月，只有睡覺及洗澡時可取下
(C)出院後可立即恢復正常的活動
(D)使用柔軟的床鋪以減輕腰背部的壓力
- C 3 腦腫瘤病人進行外科手術移除腫瘤後，顱內壓仍非常高，下列何種方式可以協助降低顱內壓？
(A)顱骨鑽孔術(B)開顱術(C)顱骨切除術(D)顱骨整形術
- C 4 顱內壓升高 (ICP) 的臨床表徵，下列何者正確？
(A)心跳增加(B)血壓下降(C)脈壓變寬(D)視神經萎縮
- B 5 有關照護HIV感染者及共同生活者之護理指導，下列何者正確？
(A)與愛滋病毒感染者進行性行為時，肛交是危險的性交行為，口交是安全的
(B)與愛滋病毒感染者共同生活，沒有發生性行為，不易感染HIV病毒
(C)提供感染者低熱量高蛋白飲食，應避免生食，以避免感染
(D)未取得病人同意前，可主動告知其主要照顧者有關疾病診斷及照護事項
- D 6 有關巴金森氏症的敘述，下列何者正確？
(A)是一種自體免疫疾病(B)神經物質多巴胺分泌量增加
(C)神經物質乙醯膽鹼分泌量減少(D)可能與遺傳或環境因素有關
- C 7 有關腦瘤之敘述，下列何者正確？①腦膜瘤好發於男性 ②續發性腦瘤常見於肺癌或乳癌病人
③突然的發作抽搐是腦瘤的明顯指標 ④星狀細胞瘤好發於女性
(A)①② ①③(B) ②③(C) ②④(D)
- D 8 有關青光眼藥物治療作用之敘述，下列何者錯誤？
(A)可使用縮瞳劑(B)pilocarpine可促進房水流入許萊姆氏管
(C)timolol可減少房水分泌(D)diamox可促進房水排出
- C 9 有關上消化道出血的臨床表徵，下列何者正確？
(A)大多解鮮血便(B)常見的原因為結腸不正常的出血
(C)嚴重時會造成心搏過速、血壓不穩(D)嚴重時會造成皮膚發熱、潮紅
- C 10 有關小腸阻塞的臨床表徵，下列何者正確？
(A)便秘(B)晚期才出現腹脹(C)嘔吐頻率增加(D)腸音增加
- B 11 病人抽出腹水1,500 mL後，可能出現下列何種徵象？
(A)呼吸加快(B)心跳加快(C)體溫上升(D)血壓上升
- A 12 下列何者是造成腹膜炎常見的致病菌？
(A)革蘭氏陽性菌(B)黴菌(C)厭氧性細菌(D)真菌
- C 13 病人主訴「左上腹疼痛，吃了東西後1小時更痛」，下列何者為其最可能之診斷？
(A)胃食道逆流(B)慢性胃炎(C)胃潰瘍(D)十二指腸潰瘍

- B 14 病人骨盆骨折後第2天，突然發生意識改變、呼吸與心跳加速、瘀斑及發燒等徵象，下列何者為病人最可能發生的問題？
 (A)腔隙症候群(B)脂肪栓塞症候群(C)骨頭感染致敗血症(D)動脈損傷致內出血
- B 15 有關左側脛骨骨折病人使用柺杖之護理指導，下列何者錯誤？
 (A)三點式步態：兩側柺杖與左下肢同時向前，然後右下肢跟上
 (B)柺杖頂部距腋下二橫指，身體重心放於腋下
 (C)上樓梯順序：右下肢先上階梯，然後柺杖及左下肢同時上
 (D)左下肢可以承受重量時，可用兩點式步態
- C 16 有關脊髓攝影術檢查前後之護理措施，下列何者錯誤？
 (A)檢查前需禁食8小時(B)檢查前確認是否對碘製劑過敏
 (C)水性顯影劑檢查後需立即平躺8小時(D)檢查後需補充大量水分
- C 17 針對退化性關節炎病人之護理指導，下列何者不適當？
 (A)冰敷有助減輕炎症反應以緩解疼痛
 (B)使用aspirin止痛時，避免空腹服用
 (C)日常活動應儘量採等長運動以減少關節負重之壓力
 (D)鼓勵病人減重，以減輕膝關節的負荷
- B 18 有關中耳手術後病人護理措施及指導之敘述，下列何者錯誤？
 (A)觀察是否發生顏面神經切斷的合併症(B)咳嗽或打噴嚏時避免張口
 (C)避免頭部突然轉動(D)採軟質飲食
- D 19 有關白內障治療方式之敘述，下列何者錯誤？
 (A)白內障無有效治療的藥物(B)囊內摘除術易造成網膜剝離
 (C)晶體乳化法為囊外摘除術(D)人工水晶體可在晶體乳化術後一個月植入
- D 20 有關鼻咽癌之敘述，下列何者錯誤？
 (A)為上皮細胞癌(B)與遺傳有關(C)長期吸菸為致癌因子(D)血清EB病毒指數高
- A 21 有關喉癌的臨床表徵，下列何者正確？
 (A)外生性喉癌易發生頸部淋巴轉移，造成頸部淋巴結腫大
 (B)外生性喉癌會有聲音嘶啞、喉部異物感
 (C)内生性喉癌早期症狀為吞嚥時發生喉痛、灼熱感
 (D)内生性喉癌好發於喉部真聲帶以外之其他部位
- C 22 冠狀動脈繞道手術後病人送至加護病房時，下列何種徵象必須立即通知醫師？
 (A)體溫35°C (B)血壓90/60 mmHg
 (C)胸管引流量200 mL/hr (D)SaO₂ 90~92%
- D 23 有關中心靜脈壓升高之原因，下列何者錯誤？
 (A)心肌梗塞(B)二尖瓣逆流(C)心包膜填塞(D)敗血性休克
- C 24 有關急性心肌梗塞病人採限鈉飲食之敘述，下列何者正確？
 (A)可改善現存水腫問題，並提高心臟效能(B)可預防因組織水腫所導致的血壓升高
 (C)可避免水分滯留，以減少心臟工作負荷(D)可產生利尿效果，並減少循環血量
- C 25 有關冠狀動脈疾病治療藥物之敘述，下列何者正確？
 (A)心絞痛使用nitroglycerin (NTG)，必須密切監測心搏出量
 (B)心絞痛使用propranolol (ineral)，主要作用是擴張動脈，減輕心臟後負荷
 (C)心肌梗塞使用morphine，可以減輕疼痛並且降低心臟前負荷
 (D)心肌梗塞使用heparin，需要密切監測凝血酶原時間 (PT)

- D 26 60歲的王太太是退休公務員，平日在家日常生活活動都靠家人幫忙，休息時仍感呼吸喘，晚上常因呼吸不順無法入睡，根據美國紐約心臟學會（NYHA）的心臟功能分級標準，上述情況何者正確？
(A)第一級(B)第二級(C)第三級(D)第四級
- C 27 針對左心室射出率（EVEF）為12%，有端坐呼吸且雙側下肢水腫厲害的心臟衰竭病人之護理，下列何者較不適當？
(A)協助採半坐臥姿勢以維持呼吸順暢□(B)指導飲食限水、限鹽的方法
(C)抬高雙腳30度以上以利改善水腫□(D)監測並記錄體重變化及攝入與排出量
- B 28 評估脈搏強度時，發現「很難摸得到，脈搏明顯的減弱」，下列紀錄何者正確？
(A)0 (B)1+ (C)2+ (D)3+
- D 29 有關骨掃描的敘述，下列何者正確？
(A)檢查前要禁食(B)檢查體內細胞葡萄糖代謝過程
(C)體內注入已標記放射性物質的腫瘤抗體(D)靜脈注射放射線同位素，可診斷骨轉移
- B 30 有關惡性貧血病人特徵之敘述，下列何者錯誤？
(A)紅血球數目減少(B)紅血球外觀小且形狀不規則
(C)膽紅素上升(D)舌炎、皮膚發黃
- D 31 有關干擾素治療之敘述，下列何者正確？
(A)屬主動免疫，使人體產生抗癌細胞的抗體
(B)常使用深部肌肉注射方式給藥
(C)高劑量可增加抗體合成及淋巴球增殖
(D)常見副作用為頭痛、發燒、食慾降低等類似感冒症狀
- B 32 有關上腔靜脈症候群之敘述，下列何者錯誤？
(A)常見原因是淋巴結腫大壓迫，影響血液回流(B)臨床症狀在晚上最為明顯
(C)體外放射線照射是最常用的治療方式(D)呼吸困難時宜採半坐臥
- C 33 下列何者是瀕死病人最後消失的知覺？
(A)味覺(B)觸覺(C)聽覺(D)嗅覺
- C 34 有關多發性骨髓瘤的臨床症狀，下列何者錯誤？
(A)骨痛(B)腎功能不全(C)腹瀉(D)貧血
- D 35 有關急性骨髓性白血病人人在接受異體骨髓移植後3週，出現全身紅疹與腹瀉症狀，下列敘述何者錯誤？
(A)應注意肝功能異常與血中膽紅素上升(B)可進行皮膚切片以確定問題
(C)皮膚同時可能會出現斑丘疹(D)顯示為嚴重藥物過敏
- B 36 有關乳癌轉移壓迫脊髓最常見之部位，下列何者正確？
(A)頸椎(B)胸椎(C)腰椎(D)薦椎
- D 37 有關癌症初級預防之敘述，下列何者錯誤？
(A)避免隨便服藥、減少菸酒(B)均衡飲食，多吃新鮮蔬菜、水果
(C)養成規律運動習慣(D)定期接受身體檢查
- D 38 下列何者屬於發疱劑（vesicant agent）的化學治療製劑？
(A)ara-C (B)bleomycin (C)endoxan (D)oncovin
- A 39 B型肝炎帶原者接受化學治療時之護理指導，下列何者錯誤？
(A)可以採用親朋好友所提供的保肝偏方
(B)出入公共場所儘量戴口罩

- (C)若白血球數目太低，可多吃剝皮的水果補充維生素
(D)若皮膚或眼白變黃、食慾變差，則趕快就醫
- A 40 有關病毒感染與罹患癌症相關性之敘述，下列何者錯誤？
(A)A型肝炎病毒導致肝癌(B)EB病毒導致鼻咽癌
(C)巨細胞病毒導致子宮頸癌(D)幽門螺旋桿菌導致胃癌
- C 41 有關燒傷病人給與靜脈滴注「H2受體阻斷劑」類藥物（如tagamet）之目的，下列何者正確？
(A)刺激腸蠕動(B)預防低血容積(C)預防壓力性潰瘍(D)預防腎損傷
- A 42 有關燒傷水療法之敘述，下列何者錯誤？
(A)水療池的水溫通常維持在26.6~29.4℃
(B)水療池中可加入Beta-iodine，以抑制細菌生長
(C)水療池中可加入食鹽，以補充流失的體液
(D)水療法可以降低感染以及減少癍痕形成
- C 43 王先生從火災現場被救出，評估發現其鼻毛燒焦、聲音嘶啞、喘鳴聲、碳粒痰、呼吸有燒焦味，下列何者為王先生最可能的診斷？
(A)一氧化碳中毒(B)電燒傷(C)吸入性灼傷(D)化學性灼傷
- D 44 有關焦痂切開術的敘述，下列何者正確？
(A)適用於環形燒傷（circumferential burns），切開時無需麻醉
(B)適用於輻射性燒傷（radiation burns），切開時需要麻醉
(C)為了減壓而切開傷口，故切開後的傷口不宜包紮
(D)若焦痂切開術後仍無法改善組織灌流時，可進一步執行筋膜切開術
- C 45 有關燒傷病人的緊急處理措施5步驟之敘述，下列何者錯誤？
(A)沖：以流動的冷水沖患部
(B)脫：用剪刀移除衣物，若衣物與傷口沾黏，勿強行脫除
(C)泡：將患部泡在冰水中降溫，將餘熱去除減輕疼痛感
(D)蓋：以乾淨的衣物、毛毯、紗布等覆蓋，保存體溫且避免污染傷口
- C 46 有關後天免疫之敘述，下列何者錯誤？
(A)是一種經由與特定病原體接觸後，產生能識別並針對特定病原體啟動的免疫反應
(B)主動性後天免疫是人體接觸病原體後，製造抗體或淋巴球而產生的免疫能力
(C)注射含抗體的血清或免疫球蛋白是屬於主動性後天免疫
(D)經母體胎盤傳給胎兒或嬰兒，經由母乳獲得之免疫力屬於被動性後天免疫
- B 47 下列何者為自體免疫血清反應之實驗室檢查？
(A)紅血球沉降率(B)抗核抗體（ANA）(C)滑膜液(D)C反應蛋白質
- A 48 有關類風溼性關節炎流行病學之敘述，下列何者錯誤？
(A)男性的發生率是女性的3倍(B)30~50歲是發生的高峰期
(C)冬天的發生率高於夏天(D)可能發生於80歲的老人
- B 49 HIV抗體試驗呈陽性，且T4細胞數目為650 cells/mm³、占所有淋巴球之35%的病人，最可能處在HIV疾病那一期？
(A)空窗期(B)潛伏期(C)急性感染期(D)伺機性感染期
- C 50 評估右下肺葉時叩診出現濁音及聽診時呼吸音減弱，胸部X光檢查結果右側肋膜橫膈角呈鈍角，下列何者為病人最可能之診斷？
(A)右下肺葉肺炎(B)右側氣胸(C)右側肋膜積水(D)右下肺葉腫瘤
- C 51 肺栓塞病人於血栓形成後72小時內，可給與下列何種藥物以快速溶解血塊？

- (A) aspirin (B) heparin (C) streptokinase (D) warfarin
- B 52 肺栓塞病人使用肝素以阻止新的血塊形成，通常須維持部分凝血活酶時間（aPTT）為正常值的多少倍？
 (A) 1.0~1.4 (B) 1.5~2.5 (C) 2.6~3.5 (D) 3.6~4.5
- C 53 肺葉切除術後，常放置兩支胸管引流，下列敘述何者正確？
 (A) 一支置於腋中線的第二肋間引流液體，另一支置於胸前第八及第九肋間處引流肋膜腔下方的空氣
 (B) 一支置於腋中線的第二肋間引流空氣，另一支置於胸前第八及第九肋間處引流肋膜腔下方的液體
 (C) 一支置於胸前的第二肋間引流空氣，另一支置於腋中線第八及第九肋間處引流肋膜腔下方的液體
 (D) 一支置於胸前的第二肋間引流液體，另一支置於腋中線第八及第九肋間處引流肋膜腔下方的空氣
- B 54 當進行肺部聽診時，可經由聽診器清楚的聽到病人所說的話，下列何者為此項檢查之結果？
 (A) 羊語音 (B) 支氣管語音 (C) 耳語樣的胸語音 (D) 摩擦音
- D 55 右肺葉切除術後病人的姿勢擺位，下列何者最適當？
 (A) 左或右側臥 (B) 平躺或高坐臥 (C) 平躺或右側臥 (D) 左側臥或半坐臥
- A 56 下列何者為支氣管擴張症最主要的病因？
 (A) 細菌感染 (B) 過敏反應 (C) 遺傳 (D) 老化
- D 57 有關呼吸困難之徵象，下列何者最不常見？
 (A) 端坐呼吸 (B) 噤嘴式呼吸 (C) 使用胸鎖乳突肌 (D) 咳血
- B 58 成人在正常飲水狀況下，日間平均解尿次數超過8次之現象，下列何者正確？
 (A) 解尿困難 (B) 頻尿 (C) 夜尿 (D) 尿失禁
- B 59 下列何項實驗室檢查結果最能顯示腎臟功能受損？
 (A) 血中尿素氮升高 (B) 血清肌酐酸升高 (C) 尿中鈉離子升高 (D) 尿中鈣離子升高
- D 60 教導慢性阻塞性肺疾病病人採用橫膈式呼吸之預期效果，下列何者正確？
 (A) 減少潮氣容積 (B) 減少肺泡通氣 (C) 增加呼吸速率 (D) 增加活動耐力
- B 61 尿流速之檢查結果，最大尿流速為8 mL/秒，下列何者為最可能之診斷？
 (A) 急性腎絲球腎炎 (B) 前列腺肥大 (C) 腎病症候群 (D) 急性尿路感染
- 情況題：蔡先生因急性腎衰竭而住院，請回答下列第62題至第65題：
- D 62 對於蔡先生在急診室測得的動脈血氧氣體分析結果：pH 7.25、PaCO₂ 31 mmHg、HCO₃⁻ 18 mEq/L之判讀，下列何者正確？
 (A) 呼吸性酸中毒 (B) 部分代償性呼吸性酸中毒
 (C) 代謝性酸中毒 (D) 部分代償性代謝性酸中毒
- B 63 改善其酸鹼不平衡問題最有效的措施，下列何者正確？
 (A) 給予紙袋罩住口鼻 (B) 注射NaHCO₃ (C) 補充NH₄Cl (D) 使用人工呼吸器
- D 64 蔡先生目前正處於少尿期，其生化檢驗可能產生的變化，不包括下列何者？
 (A) serum creatinine上升 (B) BUN上升
 (C) 血鉀上升 (D) 血磷下降
- A 65 蔡先生主訴噁心、食慾不振，昨日嘔吐量約150 c.c./天，排尿量360 c.c./天，血清鉀 6.8 mEq/L，下列處置何者錯誤？
 (A) 液體攝入量應限制在 510 c.c./天 (B) 給予furosemide (lasix) 引發利尿

- (C)給予kayexalate降低血鉀濃度(D)應採高熱量、低蛋白、低鹽飲食
- D 66 有關腎盂腎炎的敘述，下列何者錯誤？
 (A)糖尿病、尿路結石是其危險因子(B)C反應蛋白質(CRP)值會增高
 (C)會有肋骨脊柱角處疼痛(D)急性期時應限制液體攝取量
- B 67 有關糖尿病酮酸中毒(DKA)之處置，下列何者錯誤？
 (A)建立靜脈輸液，給予0.9%生理食鹽水(B)皮下注射大劑量短效胰島素
 (C)當血糖降至300 mg/dL，應補充葡萄糖溶液(D)監測血中鉀離子濃度變化
- A 68 下列何種內分泌機能低下會造成黏液性水腫？
 (A)甲狀腺(B)副甲狀腺(C)腎上腺皮質(D)腦下垂體前葉
- B 69 有關甲狀腺切除後病人的護理措施，下列何者正確？①注意有無聲音嘶啞 ②禁止深呼吸、咳嗽運動 ③喝溫開水減輕傷口不適 ④觀察口部刺麻感
 ①(A) ①④(B) ②③(C) ③④(D)
- B 70 長期口服或注射類固醇病人最可能出現的副作用，下列何者正確？
 (A)低血鈉(B)高血糖(C)高血鉀(D)低血壓
- D 71 有關副甲狀腺機能亢進病人之護理指導，下列何者正確？
 (A)鼓勵攝取乳製品(B)鼓勵攝取高鈣食物(C)鼓勵攝取低纖維食物(D)鼓勵攝取蔓越莓製品
- B 72 有關代謝性酸中毒的症狀，下列何者正確？
 (A)出汗、口乾(B)頭痛、意識遲鈍(C)呼吸速率變慢(D)周邊血管收縮
- C 73 有關下視丘之敘述，下列何者正確？
 (A)位於腦下垂體之下，是間腦的一小部分，受到蝶骨蝶鞍部分的保護
 (B)會分泌調節因子來刺激或抑制腦下垂體後葉激素的分泌
 (C)下視丘分泌的調節因子直接由血管叢送達目的地
 (D)下視丘藉發出的神經衝動來控制腦下垂體前葉的激素分泌
- C 74 有關水分剝削試驗(Water Deprivation Test)之敘述，下列何者錯誤？
 (A)主要用來診斷尿崩症
 (B)病人限制飲水後，每小時採血液與尿液檢體
 (C)檢測檢體中滲透壓、鈣離子與鉀離子濃度
 (D)試驗期間需觀察病人的生命徵象、尿量、血中滲透壓與體重變化
- B 75 病人發生休克時對肝臟系統之影響不包括下列何者？
 (A)早期出現血中葡萄糖增加(B)漸進期出現代謝性鹼中毒
 (C)漸進期出現乳酸轉換下降(D)漸進期出現血中葡萄糖下降
- D 76 有關食物中毒之敘述，下列何者錯誤？
 (A)食物中毒多指食用遭細菌污染之食物或誤食野生蕈造成
 (B)葡萄球菌中毒是最常見之食物中毒
 (C)食物中毒之症狀嚴重度與食入污染物的量與內毒素含量有正相關
 (D)處理食物中毒休克病人時，應最先了解是何種食物導致病人出現腹瀉與脫水
- D 77 2015年修改「成人生存之鏈」，其中醫院內心臟停止的照護途徑不包括下列何者？
 (A)立即確認心臟停止並啟動緊急應變系統
 (B)立即進行高品質CPR
 (C)進行快速去顫
 (D)基礎及高級緊急醫療服務
- C 78 有關自動體外心臟去顫器(AED)之敘述，下列何者錯誤？

- (A)政府立法於公共場所設置AED以即時搶救病人，同時讓施救者受到免責之保障
 - (B)使用時機為病人出現心室纖維顫動或是無脈搏心室心搏過速
 - (C)使用時有整流與去顫兩種功能
 - (D)具有語音提示正確操作機器步驟之功能
- B 79 有關霍亂的症狀與治療之敘述，下列何者錯誤？
- (A)霍亂弧菌不會進入血管引起菌血症
 - (B)會有嚴重腹瀉、噁心、嘔吐及發燒
 - (C)要適當補充電解質液體以矯正酸中毒、脫水及低血鉀
 - (D)主以四環黴素（tetracycline）縮短病程及降低腹瀉的嚴重度
- B 80 有關嚴重急性呼吸道症候群（SARS）之臨床症狀，不包括下列何者？
- (A)肌肉痛
 - (B)發病期常見肺部鈣化合併胸部X光異常
 - (C)發病後3~7天即進入下呼吸道期，出現沒有痰的乾咳或血氧過低
 - (D)在早期肌酸磷酸激酶（CPK）與肝轉胺酶（hepatic transaminase）會升高

高
點
醫
護

【版權所有，翻印必究】