

《產兒科護理學》

- C 1 依據世界衛生組織及聯合國兒童基金會推行的政策，要成為母嬰親善醫院需符合下列那一項規定？
 (A)要求所有母親均需在產檯即開始哺餵母乳
 (B)醫院實施每天8小時親子同室
 (C)除非有醫療特殊需要，否則不給嬰兒母乳以外的食物，包括水、葡萄糖水或配方奶
 (D)醫療人員可提供嬰兒人工奶嘴或安撫奶嘴，以緩解哺餵母親乳頭的負擔
- D 2 下列那一種細菌或病毒感染，為罹患子宮頸癌的高危險群？
 (A)梅毒螺旋體 (B)奈瑟氏淋病雙球菌 (C)疱疹病毒 (D)人類乳突狀病毒 (HPV)
- A 3 李女士，G1P0，懷孕25週，請教護理師：「我身體上從肚臍到會陰部有一條褐色的線，這正常嗎？什麼時候會消失？」，護理師的回答，下列何者為宜？
 (A)這是懷孕期荷爾蒙變化造成皮膚色素沈著，約在生產後會逐漸變淡
 (B)這是懷孕常見的妊娠紋，約在生產後2~3個月會消失
 (C)有可能是胎兒異常的徵兆，建議進一步做染色體核型分析
 (D)需儘快到整型外科或皮膚科進行去斑處理，否則容易留下永久的色素沈著
- C 4 有關生產教育的觀念，下列何者正確？①由醫護團隊主導生產過程，減少孕婦生產壓力 ②讓孕婦因應懷孕與分娩照護的過程 ③朝向以家庭為中心的照護 ④強調一定不要使用藥物性減痛方法
 ① (A) ③④(B) ②③(C) ①④(D)
- C 5 有關運用廓清式呼吸之敘述，下列何者錯誤？
 (A)分娩期間每次宮縮開始與結束都應做一次廓清式呼吸
 (B)可做為產婦肺部通氣及放鬆的訊號
 (C)呼吸速率為正常呼吸速率的2倍（約每分鐘24~32次）
 (D)呼吸法的運用須依產婦的需要及放鬆程度來進行調整
- D 6 羊水指數 (AFI) 是以超音波觀察羊水量，有關判定之標準，下列何者正確？①小於10 cm為羊水過少 ②大於2000 mL為羊水過多 ③28週可達1000 mL ④約36週羊水增加至最高點
 (A) ③④(B) ①③(C) ②④(D)
- C 7 吳女士，育有一子，目前懷孕10週，她曾自然流產一次，也曾因懷孕24週胎死腹中而引產。其生產紀錄史，下列何者正確？
 (A)G4P3AA1 (B)G3P3SA1 (C)G4P2SA1 (D)G3P2SA1
- C 8 下列何種方式是依據懷孕婦女子宮底高度位置推估預產期？
 (A)最後一次月經週期 (LMP) (B)內格萊式法則 (Nagel's rule)
 (C)麥當勞法則 (McDonald's rule) (D)雙頂徑 (BPD)
- B 9 懷孕11週的黃女士向護理師抱怨有頻尿的現象，可是並無解尿困難的情形，下列何者是較適當的護理指導？
 (A)白天的飲水量應該減少
 (B)仍維持每日適當的飲水量
 (C)要求黃女士馬上接受醫生的問診
 (D)要求黃女士慢慢練習自我控制膀胱，然後將兩次排尿的時間盡量拉長
- B 10 李女士在第一產程中破水，下列何者為最優先的措施？
 (A)給予陰道內診 (B)評估胎心音1分鐘 (C)給予腹部觸診 (D)以石蕊試紙測試羊水
- D 11 王女士待產時，胎心率之變異性為6~10 bpm，下列敘述何者正確？
 (A)胎兒感染 (B)胎兒缺氧 (C)胎兒瀕死 (D)胎兒正常
- B 12 陳女士，G1P0，因規則陣痛而入產房待產，胎位為ROA，子宮頸口開1 cm，station=0，下列何者為station 0？

- (A)胎兒的胎頭在骨盆入口上方 (B)胎兒的雙頂徑通過骨盆入口
(C)胎兒的雙頂徑通過恥骨聯合 (D)胎兒的胎頭接近骨盆出口
- C 13 承上題，陳女士裝上胎兒監視器，此時胎兒心跳轉送器放置何處，可聽到最清楚胎心音？
(A)肚臍上1 cm處 (B)與肚臍平行右側3 cm處
(C)肚臍與右髂骨前上棘連線中點 (D)肚臍與恥骨聯合連線中點
- C 14 照顧處於過渡期之待產婦，下列何者為最適當的護理措施？
(A)減少探視次數 (B)延長衛教時間 (C)告知產程進展 (D)增加環境刺激
- A 15 有關分娩時經產婦的子宮頸變化之敘述，下列何者正確？
(A)子宮頸變薄與擴張同時進行 (B)子宮頸先擴張，再變薄
(C)子宮頸先變薄，再擴張 (D)潛伏期時，子宮頸變薄變短程度為90~100%
- D 16 吳女士G2P1，她希望生產時能免除會陰切開術，以維持會陰的完整性，有關第二產程的護理措施，下列何者錯誤？
(A)溫和觸壓按摩會陰 (B)鼓勵產婦溫和向下用力推進
(C)配合產婦用力衝動向下推擠 (D)平躺使用腳凳盡力伸展腿部
- A 17 有關基礎體溫的敘述，下列何者正確？
(A)危險期是排卵前3天及排卵後2天 (B)依據排卵時體溫上升的原理，以確認危險期
(C)排卵時體溫上升（高於36.7°C為高溫期） (D)排卵後體溫下降（約36.2°C為低溫期）
- A 18 下列何者為子宮復舊不全的現象？
(A)產後18天在腹部觸摸到子宮底 (B)產後子宮底每天約下降1~2 cm
(C)產後1週子宮重量下降至500公克 (D)產後第1天子宮底高度臍平
- D 19 有關剖腹產術後照護之敘述，下列何者錯誤？
(A)平躺時可將頭側一邊，避免分泌物阻塞呼吸道
(B)產後1小時內每隔15分鐘測量生命徵象
(C)術後導尿管須留置至少8小時
(D)等產婦可下床活動時，再哺餵母乳
- B 20 有關產後生理變化的敘述，下列何者正確？
(A)產後24小時內體溫會輕微下降，是因為生產過度用力、脫水的關係
(B)產後12~24小時內，排尿量增加為正常現象，是為了排除懷孕時滯留多餘的水份
(C)因為凝血因子增加，可利用霍曼氏試驗評估下肢血栓動脈炎
(D)產後心輸出量增加，脈搏會增加到80~120次/分
- D 21 劉女士G2P2，陰道生產，產後第2天主訴：「我的子宮收縮怎麼這麼痛」，下列何者錯誤？
(A)經產婦的肌肉張力較鬆弛，故疼痛感更明顯
(B)這是因為子宮收縮造成的正常現象
(C)建議熱敷或輕撫按摩緩解疼痛
(D)此現象稱為產後痛，約持續7天就會減輕
- A 22 有關母嬰親善醫院的10項措施，下列何者可直接促進親子依附關係？
(A)生產後於產權立即性肌膚接觸 (B)除非醫療需求，不提供配方奶
(C)不使用奶瓶奶嘴餵食 (D)提供產婦母乳支持團體
- B 23 有關霍曼氏試驗 (Homan's test) 之敘述，下列何者錯誤？
(A)須讓個案的腳板向背側彎曲 (B)在縮短腓腸肌以壓迫深部靜脈
(C)主要測試是否有深層靜脈血栓 (D)陽性反應為發生疼痛反應
- B 24 新生兒出生後進行口鼻抽吸之目的為何？
(A)刺激迷走神經 (B)移除呼吸道分泌物 (C)引發嘔吐反射 (D)適度移除二氧化碳
- D 25 有關新生兒凶門的敘述，下列何者正確？①前凶門為菱形，由二塊額骨及二塊頂骨組成 ②後凶門為三角形，約出生後18週關閉 ③凶門若凹陷代表有脫水現象 ④胎頭之塑形現象 (molding)，1個月後即可恢復
① (A) ③④(B) ②④(C) ①③(D)

- A 26 出生第3天的新生兒，出現早發性母乳黃疸，產婦擔心是否可以繼續哺餵母乳，下列護理師的回答何者適當？
(A)應該繼續哺餵母乳 (B)暫停哺餵母乳
(C)減少哺餵母乳次數 (D)暫停由口進食
- B 27 有關新生兒的暗示行為之敘述，下列何者錯誤？
(A)投入性暗示行為：注視著照護者，微笑，代表想和人互動
(B)脫離性暗示行為：手腳屈曲，臉轉向照顧者，表示想睡覺
(C)飢餓的暗示行為：把手放在嘴裡，哭泣，拱背
(D)吃飽的暗示行為：睡著，推開照顧者，吸吮動作減少
- B 28 護理師執行產後新生兒立即性護理時，發現劉小弟頭頂部有一局部軟組織腫脹，觸診組織鬆軟且外緣界線不清楚，下列敘述何者正確？
(A)是胎頭腫塊（產瘤），為骨膜與顱骨間的血液聚集
(B)是胎頭腫塊，為頭皮上軟組織水腫
(C)是頭血腫，會逐漸越過縫合線
(D)是頭血腫，通常於出生後24~48小時消失
- B 29 有關HELLP syndrome的症狀與致病機轉之敘述，下列何者正確？
(A)為妊娠子癇症，易在懷孕20週以前出現，主要症狀是因血小板增加與溶血所引發
(B)指溶血、肝功能指數上升、血小板下降的症候群
(C)是妊娠出血性疾病的一種，包含血液動力失衡、低紅血球症與胎盤功能下降
(D)致病機轉通常與孕婦對胎兒的ABO血型不合有關
- D 30 有關協助子宮復舊的產後運動，下列何者錯誤？
(A)臀部運動 (B)抬腿運動 (C)膝胸臥式 (D)擴胸運動
- B 31 張女士懷孕39週，入院待產中，產程進度情形為：子宮頸擴張4 cm，變薄40%，高度為0，胎兒監測器顯示如下圖。根據此圖形，下列何者正確？
(A)胎頭受壓 (B)胎盤功能不良 (C)臍帶受壓 (D)正常情形
- C 32 承上題，護理師的處置下列何者不適當？
(A)採左側臥 (B)調快點滴 (C)調增催產素 (D)面罩給氧
- A 33 有關前置胎盤住院治療的護理措施，下列何者錯誤？
(A)執行陰道檢查 (B)監測子宮收縮及胎心率
(C)觀察陰道出血狀況 (D)測量生命徵象
- A 34 下列何者不是用來判斷孕婦是否破水的方法？
(A)黏液塞排出 (B)陰道窺鏡檢查 (C)石蕊試紙試驗 (D)羊齒試驗
- A 35 子宮頸於產後多久可以恢復到幾乎完全閉合，且變得較厚？
(A)產後7天 (B)產後14天 (C)產後28天 (D)產後42天
- C 36 有關心臟病婦女妊娠期護理之敘述，下列何者錯誤？
(A)每天應有至少10小時以上睡眠，以減少心臟負擔
(B)採左側臥姿勢休息
(C)孕期應告知避免服用digitalis，以免致畸胎
(D)有上呼吸道感染應立即就醫，及早控制感染
- C 37 有關口服metronidazole (flagyl) 治療陰道滴蟲感染之護理指導，下列何者正確？
(A)婦女先接受治療，無效後再請性伴侶一起治療
(B)可進行陰道清水沖洗以加強治療效果
(C)服藥期間，不可飲用酒精性飲料
(D)治療期間，應配合採用口服避孕藥
- B 38 有關以子宮托 (pessary) 減輕子宮脫垂程度，其正確的放置部位為何？
(A)陰道前穹窿 (B)陰道後穹窿 (C)子宮頸外口 (D)子宮頸內口

- D 39 有關精液檢查之護理指導，下列何者正確？
 (A)保險套直接收集精液送檢 (B)取精後以冰塊維持7°C以下送檢
 (C)取精後保溫42°C送檢 (D)取精後室溫1~2小時內送檢
- B 40 有關更年期婦女的脂質與脂蛋白改變，下列何者錯誤？
 (A)血小板凝集增加 (B)高密度脂蛋白(HDL)增加
 (C)低密度脂蛋白(LDL)增加 (D)纖維蛋白原濃度增加
- C 41 有關青少年病人住院的護理，下列何者錯誤？
 (A)鼓勵青少年病人繼續與同儕保持聯絡
 (B)以不批判的態度，接受青少年可能會有的退化性行為
 (C)為維護其自我控制權，由他選擇服藥時間及意願，自行服藥
 (D)討論各種自我照顧的方式，儘量減少依賴
- B 42 護理師幫幼兒觸診頸部時，觸摸到淋巴結，下列對於觸摸到淋巴結特徵的描述，何者屬於異常現象？
 (A)直徑小於1 cm (B)界限不清楚 (C)指下可移動 (D)不會壓痛
- D 43 依據常見的嬰幼兒發展現象，一般嬰幼兒乳齒的生長順序，下列何者正確？①上排中央門牙 ②下排中央門牙 ③犬齒 ④第一臼齒 ⑤第二臼齒
 (A)①→②→③→④→⑤ (B)①→②→④→⑤→③
 (C)②→①→③→④→⑤ (D)②→①→④→③→⑤
- D 44 小妮及小美為幼稚園的玩伴，坐在地板互借遊戲器材或玩具一起玩，她們此時的遊戲特徵為何？
 (A)競爭遊戲 (B)合作遊戲 (C)平行遊戲 (D)聯合遊戲
- B 45 小明，1歲，罹患主動脈狹窄症(coarctation of the aorta)而入院，下列何者不是其症狀？
 (A)上肢血壓比下肢高 (B)肺血管阻力升高而有發紺現象
 (C)常主訴頭痛、暈眩 (D)股動脈搏動較弱，甚至摸不到
- B 46 雯雯是法洛氏四重畸形(Tetralogy of Fallot's)的病嬰，當其出現發紺嚴重時，護理師為其採膝胸臥式姿勢，可使症狀改善的原理為何？
 (A)減少全身血管的阻力，提高血壓 (B)減少下肢回心血量，增加肺部血流
 (C)減少上肢回心血量，增加腦部的血液供應 (D)減少血液循環全身的距離，提高全身循環血量
- C 47 葳葳，5歲，剛做完右心導管檢查，返回病房後護理師提供的護理措施，下列何者錯誤？
 (A)臥床6小時，清醒後即可進食
 (B)評估檢查側之肢體循環，並與另一側比較
 (C)砂袋加壓穿刺部位，彎曲肢體防止砂袋掉落
 (D)觸診兩側肢體的脛骨後動脈或足背動脈，做對稱性比較
- B 48 有關胰島素注射的敘述，下列何者錯誤？
 (A)應先抽取短效胰島素RI後，再抽取中效胰島素NPH
 (B)以Z字法做肌肉注射
 (C)注射部位須輪換，以避免注射部位脂質增生，影響胰島素的吸收
 (D)胰島素注射部位吸收速度由快而慢之排列順序為：腹部>手臂>大腿>臀部
- D 49 小明，8個月大，疑似患有胃食道逆流(gastroesophageal reflux, GER)接受多項診斷檢查，下列何者正確？
 (A)食道鏡檢查，可以確認逆流量的多寡
 (B)上腸胃道攝影術，需喝下含顯影劑的牛奶
 (C)腹部超音波掃描，確認食道炎的位置
 (D)24小時食道酸鹼值測定，是最準確的診斷方法
- C 50 兒童接受排空性膀胱尿道攝影(voiding cystourethrography)的主要目的是：
 (A)了解尿路動力學 (B)了解泌尿道生理結構
 (C)評估輸尿管逆流情形 (D)評估尿路結石情形
- A 51 病童罹患厭食症，於營養復健期間，因過度餵食、體重快速增加可能造成的問題，下列敘述何者正確？

- (A)心血管負擔過重 (B)無月經 (C)胃出血 (D)暴食症
- A 52 常見的兒童虐待類型包括身體虐待、情緒（精神）虐待、性虐待及疏忽，有關兒童虐待的敘述，下列何者正確？
 (A)多數兒童虐待的施虐者多為認識的人 (B)大部分兒童性虐待很容易由兒童的舉止發現異常
 (C)其中只有身體虐待會導致兒童死亡 (D)兒童疏忽主要是來自照顧者的過度保護
- A 53 有關嬰兒急救的程序，下列敘述何者正確？
 (A)可用刺腳跟的方式，檢查嬰兒是否失去意識
 (B)以手捏住嬰兒鼻子，口罩住其嘴巴吹兩口氣，進行人工呼吸
 (C)以5~10秒檢查嬰兒頸動脈的脈搏跳動
 (D)若懷疑嬰兒頸部損傷，應使用壓額抬下巴法
- C 54 根據衛生福利部擬訂「2025年衛生福利政策白皮書」，婦幼健康促進長程指標，下列敘述何者錯誤？
 (A)孕產婦死亡率降至0.016% (B)嬰兒死亡率降至2.0%
 (C)低出生體重比率降到2.0% (D)6個月以下純母乳哺育率提升至50%
- B 55 陳小妹，1歲半，14公斤，從火場中被救出，全身30%的部分皮層燒傷，目前正滴注靜脈輸液，為評估輸液是否適當，陳小妹每小時的尿量應為多少mL較適宜？
 (A)6 mL (B)14 mL (C)30 mL (D)60 mL
- D 56 阿帕嘉評分（Apgar score）是最常用來評估新生兒對子宮外生活立即適應的方法。下列何者不是阿帕嘉評分的計分項目？
 (A)心跳速率 (B)膚色 (C)肌肉張力 (D)排泄情況
- A 57 小英，4歲，因中耳炎需執行耳內給藥，給藥時，應將小英耳朵往那一方向拉？
 (A)往上往後拉 (B)往下往前拉 (C)往上往前拉 (D)往下往後拉
- D 58 小明，9歲，因患白血病被告知需住院至少一個月接受治療，此階段兒童最關心的事為何？
 (A)與父母分離 (B)活動限制 (C)閹割焦慮 (D)學業與同儕關係
- B 59 有關早產兒視網膜病變，下列敘述何者正確？
 (A)主要發生於妊娠35週以上的早產兒 (B)與過度或長期給高氧、光線刺激有關
 (C)因視網膜血管舒張及發育不良所致 (D)應於4個月大時，開始接受視網膜檢查及追蹤
- B 60 有關新生兒各系統生理特徵與調節，下列何者正確？
 (A)IgG不會通過母體胎盤到達新生兒體內
 (B)女嬰出生後，陰道出現紅色分泌物，此徵象乃是受母親雌激素中斷所影響
 (C)出生後肺血流增加，肺靜脈血回流至左心房血流量與壓力增加，使靜脈導管關閉
 (D)新生兒黃疸主要是由於體內甲硫胺酸（methionine）量不足或未活化，而導致結合型膽紅素無法排出
- D 61 小健，國中一年級，罹患第一型糖尿病（type 1 diabetes mellitus），有關糖尿病照護，下列敘述何者正確？
 (A)為減少兒童被歧視，儘量減少其參與社會性活動
 (B)避免告知老師及同儕罹患糖尿病，以減少被標籤化
 (C)聯絡老師，允許不參加體育課，以預防疾病惡化
 (D)只要適當控制血糖，也可自我照顧並和同學一起聚餐
- D 62 彤彤，因母親懷孕30週時突然破水致早產，出生體重1020公克，併有腦室內出血（intraventricular hemorrhage, IVH），下列護理措施，何者錯誤？
 (A)抬高床頭15~20度，以減少顱內壓
 (B)密切監測出血徵狀，如血壓降低、血比容下降
 (C)觀察是否出現囟門膨出、頭圍增加等顱內壓升高現象
 (D)限制家屬探訪，避免造成感染
- B 63 有關新生兒壞死性腸炎之敘述，下列何者錯誤？
 (A)因過產期窒息腸道缺氧，引起壞死及細菌侵犯腸黏膜
 (B)常侵犯部位為乙狀結腸及直腸壺腹處

- (C)哺餵母乳為最佳的預防方法，母乳內之IgA能抑制或殺死細菌
(D)體溫測量時宜避免測量肛溫，以免傷害腸黏膜
- A 64 凱凱，足月產，體重3050公克，出生後24小時抽血呈現血清膽紅素值為27 mg/dL，欲執行換血治療，下列相關描述，何者正確？
(A)採用之血液，最好為新鮮血液，或不超過72小時之血庫血袋，以防止血袋中鉀離子過高
(B)為預防血袋內抗凝血劑所含之檸檬酸，與嬰兒血中鈣結合引起高血鈣，需注射抑鈣激素（calcitonin）
(C)備血之血量為嬰兒全身血量的3倍，約800mL為原則
(D)如因Rh血型不合而發生溶血者，應備O型且Rh血型為陽性
- C 65 依照衛生福利部疾病管制署106年公布之「我國現行兒童預防接種時程」，卡介苗（BCG）之建議接種時間為：
(A)出生滿7~21天 (B)出生滿1~4個月 (C)出生滿5~8個月 (D)出生滿9~12個月
- C 66 小冬，5歲半，是一位初診斷後長期需要類固醇治療的腎病症候群的病童，今年秋天母親提出預防接種的問題，下列何種疫苗適用於小冬？
(A)水痘疫苗（varicella） (B)麻疹疫苗（measles）
(C)流行性感感冒病毒（influenza） (D)麻疹、腮腺炎、德國麻疹混合疫苗（MMR）
- D 67 有關哮吼（croup）之敘述，下列何者正確？
(A)最常引起的致病原是A群β型葡萄球菌
(B)較易發生在學齡期兒童
(C)呼氣時會聽見哮喘聲（stridor）
(D)病童會出現聲音沙啞（hoarseness）、喉嚨緊縮及狗吠式咳嗽（barking cough）
- A 68 有關扁桃腺切除術（tonsillectomy）後的護理措施，下列敘述何者錯誤？
(A)鼓勵病童常做咳嗽動作，以利肺部擴張
(B)協助採側臥或俯臥，以利分泌物引流
(C)觀察嘔吐物是否含血液性質
(D)開始進食後，可提供冰涼的果凍、布丁、冰淇淋
- B 69 下列那一項胸腔物理治療是利用重力原理，使肺內的分泌物，易流至較大的支氣管，以利痰液排除？
(A)震顫 (B)姿位引流 (C)叩擊 (D)抽痰
- B 70 小紅，7歲，因發燒、咳嗽、流鼻水症狀而入院。診斷為黴漿菌感染性肺炎（mycoplasma pneumonia），下列敘述何者正確？
(A)好發於1~3歲兒童 (B)使用藥物為erythromycin或azithromycin
(C)傳染途徑主要為接觸傳染，應加強洗手 (D)主要由腺病毒引起，導致黏膜水腫
- C 71 疼痛控制為照護兒癌病童之一大挑戰，有關疼痛的評估及處置，下列敘述何者正確？
(A)若兒童沒有主訴疼痛，表示沒有疼痛
(B)病童主訴疼痛時再給止痛藥，可減少止痛藥物副作用
(C)可運用轉移注意力的方式（如看卡通），緩解疼痛
(D)在給予止痛藥物時，應以針劑止痛藥為優先考量
- B 72 根據衛生福利部疾病管制署「愛滋病防治手冊」，有關照顧愛滋病（AIDS）的產婦及新生兒，下列敘述何者正確？
(A)母親於分娩過程中應停止抗病毒藥物治療 (B)新生兒出生24小時內通報
(C)新生兒一週後開始接受抗病毒藥物治療 (D)建議哺餵母乳增加新生兒抵抗力
- B 73 近年來由於飲食及生活型態的改變，致使那一類型的問題疾病增加？
(A)第一型糖尿病（type 1 diabetes）
(B)第二型糖尿病（type 2 diabetes）
(C)葡萄糖耐受性不良（impaired glucose tolerance）
(D)糖尿病酮酸症（diabetes ketone acidosis）
- D 74 有關於先天性腎上腺素增生症（congenital adrenal hyperplasia, CAH），下列敘述何者正確？

- (A)是一種體染色體顯性遺傳疾病
(B)24小時尿液17-ketosteroids (17-KS) 會下降
(C)夜間服用cortisone，以維持正常皮質類固醇分泌
(D)注意每日體重、輸入、輸出量及鈉、鉀離子之平衡
- D 75 小鋼，7歲，罹患威廉氏腫瘤 (Wilms tumor) 第三期，即將接受腎臟切除術。下列敘述何者正確？
(A)屬無觸痛感之良性腫瘤
(B)術前可按摩病童腹部，減輕腫脹不適
(C)第三期腫瘤局限於腎臟及周邊組織，以腎臟切除手術即可完全根除
(D)需監測腎功能、血壓及輸出入量
- A 76 5歲以下兒童跌倒，容易導致何部位脫臼 (dislocation)？
(A)髖部 (B)膝部 (C)手肘 (D)腕部
- D 77 王小弟，3歲，罹患腎病症候群 (nephrotic syndrome)，目前服用prednisolone治療。護理師在安排與王小弟同住的病童時，下列何者適宜？
(A)2歲，張小弟，診斷哮吼 (croup) (B)3歲，吳小弟，診斷腸病毒 (enterovirus)
(C)3歲，李小妹，診斷水痘 (varicella) (D)4歲，陳小妹，診斷疝氣 (hernia)
- C 78 有關皮肌炎 (dermatomyositis) 兒童的護理評估，下列何者錯誤？
(A)視診臉部會有紅斑結節性皮膚疹 (B)視診關節部有對稱性紅斑
(C)觸診肌肉時會感到鬆軟無力 (D)叩診病變處裡的關節反射減低
- B 79 王小弟，8歲，罹患細菌性腦膜炎 (bacterial meningitis)，下列徵象何者正確？
(A)巴氏徵象 (Barlow's sign) 陰性 (B)布魯金斯基氏徵象 (Brudzinski's sign) 陽性
(C)克爾尼格氏徵象 (Kernig's sign) 陰性 (D)反彈性疼痛 (Rebounding pain) 陽性
- B 80 有關腰椎穿刺之敘述，下列何者錯誤？
(A)可做為檢查、診斷或治療途徑
(B)採俯臥平躺，以利穿刺針頭插入，避免傷害
(C)穿刺後宜觀察中樞神經系統感染、脊髓脫出等合併症
(D)穿刺後應教導平躺4~6小時，避免頭痛等合併症

【版權所有，翻印必究】