

《產兒科護理學》

- (A) 1 有關以家庭為中心的照護，下列敘述何者正確？
 (A)家中每位成員的需求皆需要被注意及尊重
 (B)醫療機構只能讓準父親陪產
 (C)因孕產婦的自主權最重要，照護只需考量婦女需求
 (D)婚姻的品質與婦女的支持系統無關
- (B) 2 有關產婦接受腰椎硬膜外麻醉術可能發生的合併症，下列何者錯誤？
 (A)低血壓 (B)胎兒心跳變異性增加 (C)脊髓性頭痛 (D)排尿困難
- (B) 3 有關妊娠期腸胃系統的變化所造成孕婦不適的現象，下列敘述何項正確？
 (A)噁心與嘔吐是與胃蛋白酶分泌增加有關
 (B)膽囊排空時間延長，膽汁排出量減少
 (C)肝功能改變，如血漿白蛋白和球蛋白值上升
 (D)唾液分泌減少，若口腔衛生不佳者易患齲齒
- (A) 4 有關常見遺傳疾病之敘述，下列何項正確？
 (A)唐氏症是 21 號染色體多一條，95%非遺傳所造成
 (B)X 染色體脆折症為單基因遺傳疾病，女性發生率高於男性
 (C)裘馨氏肌肉萎縮症是為染色體異常遺傳疾病，每胎產下重症寶寶機率為 1/4
 (D)海洋性貧血為多基因遺傳疾病，也會受到環境因素共同調控而產生
- (A) 5 第三妊娠期孕婦身體姿勢之敘述，下列何項正確？
 (A)坐姿為挺直背脊，身體的重量壓力應集中在坐骨
 (B)採後傾 30 度的半坐臥姿，身體的重量壓力應集中在尾骨
 (C)坐時應儘量選擇無靠背椅子，大腿呈外八字可避免重心不穩及下背痛
 (D)坐下時應側身手扶椅面，並先坐椅面前 1/3 再將臀部挪進中央
- (A) 6 懷孕 32 週婦女接受無壓力性試驗 (Nonstress Test; NST) 20 分鐘後，未發現胎兒有活動訊號，下列措施何者最適當？
 (A)給予補充含糖電解質飲料，再監測
 (B)立即安排住院密切觀察
 (C)請孕婦返家，等到 34 週再監測
 (D)鼻吸氧氣 2~3L/min，30 分鐘後再監測
- (D) 7 懷孕婦女詢問為什麼她臉頰、額頭最近開始出現一些褐色斑點，護理師以下解釋，何者正確？
 (A)這是一種臉部結締組織擴張所致
 (B)這是因臉部的血管擴張、增生所致
 (C)臉部皮下組織代謝增加所致
 (D)因腦下垂體分泌的黑色素刺激素增加
- (B) 8 有關雷奧波德式操作法 (Leopold's maneuvers) 之敘述，下列何者正確？
 (A)在妊娠 12 週即可操作
 (B)第一段操作法的目的為找出胎兒的那一部位位於子宮底
 (C)檢查前需要先脹膀胱
 (D)第三段操作法的目的之一為找出最適當的胎心音聽診部位
- (D) 9 有關胎兒呼吸系統發育，下列敘述何者正確？
 (A)胎兒在 28 週，肺表面張力素開始製造
 (B)胎兒娩出後，才開始有呼吸動作
 (C)胎兒在子宮內有呼吸動作易造成羊水吸入
 (D)肺表面張力素過少易造成新生兒呼吸窘迫症候群

- (B) 10 有關受精的敘述，下列何者錯誤？
 (A)精子在進入卵子之前，必須穿過卵子外層的放射冠及透明帶
 (B)雙胞胎是指同時有二隻精子進入卵子的細胞核完成受精
 (C)受精最常發生於輸卵管壺腹部
 (D)受精是單套染色體的精子與單套染色體卵子的結合
- (C) 11 有關待產婦之照顧，下列敘述何者正確？
 (A)已破水的個案宜灌腸 (B)早產安胎的個案便秘宜灌腸
 (C)待產婦不用常規剃除陰毛 (D)破水後應立即生產
- (B) 12 有關生產疼痛之敘述，下列何者錯誤？
 (A)第一產程疼痛來源主要是子宮收縮與子宮頸變薄及擴張
 (B)第二產程疼痛來源主要是子宮收縮、陰道與會陰肌肉的伸張與伸展
 (C)第三產程疼痛來源主要是胎盤排出時子宮收縮和子宮頸擴張
 (D)生產疼痛是相當主觀而有個別性經驗，與個人過去經驗有關
- (A) 13 李女士待產時宮縮疼痛非常焦慮不安，下列護理措施何者錯誤？
 (A)換氣過度可給予塑膠袋及 O₂ 使用
 (B)利用集中注意力與意象法，減輕疼痛
 (C)利用音樂療法，促進放鬆減輕疼痛
 (D)讓待產婦浸泡於溫水中，達到肌肉鬆弛
- (C) 14 有關脊髓阻斷 (Spinal Block) 之敘述，下列何者正確？
 (A)常用於減痛分娩，有效緩解第一產程產痛
 (B)在 L₄₋₅ 或 L₅-S₁ 下針
 (C)麻醉前 30 分鐘須給予較多的靜脈輸液
 (D)麻醉後須平躺 3~4 小時，預防頭痛
- (D) 15 以下那些護理評估可以知道待產婦已開始進入第二產程？①破水 ②子宮規則收縮 ③陰道排出粉紅色黏液 ④子宮頸完全擴張 ⑤會陰可見胎頭膨出，個案有不自用力感
 (A)①② (B)②③ (C)③④ (D)④⑤
- (B) 16 入院待產婦裝置體外電子胎兒監測器後，下列何者為第一優先的監測項目？
 (A)辨識出胎心加速的型態 (B)評估胎心率基準線
 (C)確立子宮收縮強度 (D)確立子宮收縮的頻率
- (C) 17 有關正常子宮收縮的特性，下列何者錯誤？
 (A)無法由產婦的意志支配 (B)以子宮底收縮強度最高
 (C)受腸胃的神經管制 (D)間歇性的收縮
- (D) 18 待產婦以催產素 (Pitocin) 引產時，下列何者最不需要監測？
 (A)血壓與呼吸次數 (B)輸出入量 (C)宮縮與胎心率 (D)血糖
- (B) 19 林女士，陰道分娩後 12 小時，主訴會陰傷口疼痛，下列敘述何者適當？
 (A)請產婦採屈膝仰臥式評估會陰傷口
 (B)採 REEDA 評估時，A 是指傷口密合度 (Approximation)
 (C)指導如廁後由肛門往陰道口的方向擦拭會陰部
 (D)給予溫水坐浴 20 分鐘
- (C) 20 邱女士，產後第三天嚴重脹奶，原想採純母乳哺餵，表示：「昨天都還好，今早突然這樣，實在太痛了，我想打退奶針。」下列何項處置最適當？
 (A)哺餵次數過多會造成乳汁分泌量增多，建議定時餵奶
 (B)協助熱敷與按摩乳房直至乳房呈現柔軟狀態
 (C)刺激噴乳反射，協助擠出乳汁
 (D)建議穿著較緊胸罩、減少刺激與限制水分來退奶
- (A) 21 下列何者為更年期女性的生理變化？①濾泡刺激素大量增加 ②雌性素分泌增加 ③低密度脂蛋白增加 ④陰道 pH 值下降
 (A)①③ (B)②③ (C)①④ (D)③④

- (D) 22 丁女士 30 歲，第二胎，現為產後第二天，其宮底位於臍下一指，惡露呈紅色量中，主訴昨夜睡眠差且感宮縮疼痛不適，當新生兒推出餵奶時，表示想休息並拒絕餵奶，此行為正確的解釋是：
- (A)此為第二胎，所以對新生兒較不感好奇，也較以自我為中心
 (B)此宮縮痛是不正常之現象，應立即通知醫師
 (C)此時處於接受期，身體仍需調養，所以應主動為她哺餵新生兒
 (D)此時處於接受期，應先滿足她的需求，但同時亦應鼓勵她多接觸新生兒
- (B) 23 有關母乳哺餵對母親的影響，下列護理指導何者正確？
- (A)刺激腦下垂體前葉分泌催產素
 (B)停經前罹患卵巢癌的機率較低
 (C)因鈣質流失易造成母親更年期骨質疏鬆症
 (D)對月經來潮時間沒有影響
- (B) 24 王女士 G₁P₁，陰道生產產後第 3 天，主訴感覺疲倦、失眠、緊張、過於敏感，有時會不由自主的掉眼淚。她目前最可能的情况為何？
- (A)產後的正常現象
 (B)產後情緒低落 (postpartum blues)
 (C)產後憂鬱 (postpartum depression)
 (D)產後精神病 (postpartum psychosis)
- (D) 25 陳女士產後小便尚未自解，護理師評估結果為尿瀦留，下列敘述何者正確？
- (A)聽診下腹部有囉音
 (B)叩診恥骨聯合上方處有鼓音
 (C)陳女士目前為產後 3 小時
 (D)觸診腹部子宮底的位置偏向右側
- (B) 26 承上題，此時護理師需優先注意的現象為何？
- (A)排汗多寡 (B)子宮收縮狀態 (C)大便自解情形 (D)腰酸背痛程度
- (A) 27 有關新生兒凶門的敘述，下列何者錯誤？
- (A)前凶門為菱形，一般在新生兒出生後 12~18 週時關閉
 (B)後凶門為三角形，一般在新生兒出生後 8~12 週時關閉
 (C)當新生兒脫水時，可以觀察到其前凶門凹陷的狀況
 (D)當顱內壓力上升時，可以觀察到新生兒前凶門凸出的狀況
- (D) 28 下列新生兒的皮膚評估，何者為異常？
- (A)出生時臀部有蒙古斑
 (B)出生後 2~3 天胸腹部出現毒性紅斑
 (C)出生時先露部位有紅紫色瘀點 (Petechiae)
 (D)出生時臉頰有葡萄色酒斑
- (D) 29 有關新生兒免疫系統的敘述，下列何者錯誤？
- (A)新生兒自妊娠 20 週後即可自行合成少量的免疫球蛋白 (IgM, IgG, IgE)
 (B)第三妊娠期中，IgG 可通過胎盤，胎兒即可獲得來自母體的被動免疫能力
 (C)IgM 無法通過胎盤，若新生兒體內 IgM 值偏高，即可能表示胎兒有感染現象
 (D)IgE 可自初乳中分泌出來，因此哺餵母乳的新生兒，較易獲得來自母體的 IgE
- (D) 30 有關女陰癌之敘述，下列何者正確？
- (A)早期病變為搔癢、小傷口，但癌症生長快速
 (B)容易因直接接觸至鄰近器官而發生局部轉移
 (C)早期治療以化學治療為主
 (D)術後應採仰臥式，維持大腿 45 度外張，膝關節 90 度彎曲之姿勢
- (C) 31 王女士，有糖尿病病史，到院進行產前諮詢。醫護人員會建議她在懷孕前最好接受何項檢驗，以了解其血糖控制之狀況？
- (A)50 公克口服葡萄糖耐受試驗 (B)100 公克口服葡萄糖耐受試驗
 (C)糖化血色素 (D)空腹血糖

- (A) 32 陳女士妊娠 30 週，因有早產預兆而入院安胎，依醫囑使用 Ritodrine (Yutopar) 靜脈點滴注射。有關此藥物的副作用，下列何者錯誤？
(A)低血糖 (B)噁心 (C)頭痛 (D)胎心率增加
- (C) 33 李女士產後 8 小時，惡露呈鮮紅色，1 小時內即浸溼整片產墊，下列護理措施何者錯誤？
(A)監測生命徵象及血壓 (B)評估出血量
(C)暫停子宮按摩 (D)依醫囑給予子宮收縮藥物
- (C) 34 有關前置胎盤的敘述，下列何者正確？
(A)生育期婦女發生前置胎盤的機率與年齡無關
(B)胎盤著床的位置在子宮底部位
(C)有前置胎盤病史者，再次發生機率較高
(D)發生的機率與婦女有無多次子宮刮除術經驗無關
- (A) 35 下列何者不是多囊性卵巢疾病之臨床表徵？
(A)雌性素分泌過多 (B)肥胖 (C)多毛 (D)月經過少或無月經
- (B) 36 鄭女士 53 歲，有關更年期之注意事項，下列敘述何者最適當？
(A)多喝冰涼飲品，可舒緩熱潮紅
(B)仍需定期做子宮頸抹片檢查
(C)建議接受民俗療法，以舒緩不適症狀
(D)因萎縮性陰道炎，不要有性行為
- (D) 37 有關經前症候群的護理措施，下列敘述何者最適當？
(A)補充高蛋白、高熱量、高鹽分的飲食
(B)服用雌性素預防不適症狀
(C)多飲用咖啡、冰涼的手調茶飲
(D)調整生活作息，良好的睡眠品質
- (A) 38 有關子宮頸癌的護理措施，下列敘述何者正確？
(A)根除性子宮切除術後，可能出現排尿問題，病人需接受膀胱訓練
(B)全子宮切除術後一個月可恢復正常生活，例如爬樓梯、提重物等
(C)放射線治療的病人，照射部位皮膚容易乾燥搔癢，可自行擦拭乳液
(D)需先評估白血球在 $2,000/\text{mm}^3$ 、血紅素在 12gm% 以上才可行放射治療
- (A) 39 體外受精與胚胎植入術 (IVF-ET) 執行過程中，受精卵分裂數量為多少時即可植入子宮內？
(A)2~8 個細胞 (B)10~16 個細胞
(C)18~32 個細胞 (D)36~48 個細胞
- (B) 40 有關婦科體外放射治療後產生的腹瀉問題之護理指導，下列何者不適當？
(A)維持水分平衡 (B)增加乳製品攝取
(C)採用低渣飲食 (D)必要時使用止瀉劑
- (B) 41 依據「兒童及少年福利與權益保障法」第 53 條，當護理師知悉兒童非法施用毒品或管制藥品、遭受虐待或其他傷害，至遲不得超過幾小時，應立即向主管機關通報？
(A)12 小時 (B)24 小時 (C)36 小時 (D)48 小時
- (A) 42 小方，3 歲，因急性腸胃炎住院，下列何種行為反應顯示小方處於分離焦慮的抗議期？
(A)持續性哭叫 (B)吸手指頭 (C)白天尿床 (D)吃奶嘴
- (A) 43 有關燒傷病童休克期最初 24 小時的處置措施，下列敘述何者最適當？
(A)優先選擇乳酸林格氏液 (lactated Ringer solution) 補充液體
(B)以皮下或肌肉注射給予止痛藥物，降低病童疼痛不適
(C)提供高蛋白、高熱量飲食，以補充熱量與蛋白質耗損
(D)照護重點是避免燒傷造成關節攣縮或變形後遺症
- (B) 44 小玉，3 歲，體重 15 公斤，誤食外婆包粽子用的鹼水，就醫時意識清楚，下列處置何者最適當？
(A)食入後儘快進行催吐延緩吸收
(B)在食入 2 小時內喝清水或牛奶中和
(C)給予灌腸或胃灌洗
(D)食入後積極投予 deferoxamine 治療

- (A) 45 小瑄，1 歲 1 個月，因不明原因發燒而入住兒童病房，測量小瑄的生命徵象時，下列護理措施何者較不適當？
 (A)採肛溫測量以獲得正確體溫
 (B)讓主要照顧者陪伴在身旁
 (C)先量呼吸、心跳再量體溫
 (D)血壓測量部位最常用為右上臂
- (A) 46 下列何者是造成兒童燒傷急救期 (emergent period) 休克的主要原因？
 (A)低血量性 (B)壓力性 (C)心因性 (D)敗血性
- (C) 47 早產兒吸吮力弱，有關使用口胃管灌食的注意事項，下列敘述何者不適當？
 (A)插口胃管時先以無菌蒸餾水潤滑
 (B)每次餵食前應先檢查胃內殘餘量
 (C)灌食時，早產兒頭部抬高大於 30 度
 (D)每日攝取熱量宜為 100~120 Kcal/kg
- (A) 48 有關兒童疼痛概念與認知的敘述，下列何者錯誤？
 (A)早產兒、新生兒不會覺得疼痛，因為傳導慢
 (B)16 個月的小欣，對疼痛有記憶看到針頭就哭
 (C)5 歲的小美用語言抗議和肢體活動來表達疼痛
 (D)7 歲的阿偉將疼痛視為一種錯誤行為的懲罰
- (A) 49 有關兒童常用的鴉片類製劑 (opioids) 疼痛處置，下列敘述何者正確？
 (A)此類藥物適用於兒童中度至重度的疼痛
 (B)主要抑制前列腺素的合成，而有鎮痛效果
 (C)常見副作用包括胃潰瘍、腹瀉、出血性腎炎
 (D)Morphine 與雷氏症候群有關，不建議兒童使用
- (C) 50 嬰兒最早發展的知覺為下列何者？
 (A)聽覺 (B)視覺 (C)觸覺 (D)嗅覺
- (B) 51 小明，3 歲半，診斷為會厭炎而住院求治，下列護理措施何者最適當？
 (A)給予小明接種流感嗜血桿菌疫苗
 (B)協助喉嚨採檢時，備好急救用物
 (C)宜給予抽痰以維持呼吸道通暢
 (D)提供冰冷軟質食物，以減少會厭腫脹
- (C) 52 有關意識不清的嬰幼兒期病童疼痛評估，下列何者最適當？
 (A)Poker Chip Scale 籌碼片量表
 (B)Face Pain Scale 臉譜疼痛量表
 (C)Face, Legs, Activity, Cry & Consolability 量表
 (D)Numeric Pain Scale 數字疼痛量表
- (B) 53 張小妹，妊娠 28 週出生，體重 960 公克，有關早產兒的特徵及照護，下列敘述何者正確？
 (A)依醫囑由靜脈點滴給予表面張力素 (surfactant)
 (B)若無吸吮及吞嚥反射，以腸道外營養法提供營養
 (C)四肢屈曲且內縮，呈現子宮內姿勢
 (D)皮膚缺乏皮下脂肪、胎毛少、腳底皺摺多
- (D) 54 有關兒童事故傷害的預防與處置，下列敘述何者正確？
 (A)誤食漂白水，在 2 小時內，給予吐根糖漿 (ipecac syrup) 催吐
 (B)溺水發生時，最優先的緊急處置是恢復體溫
 (C)嬰幼兒乘坐汽車，安全座椅應固定於前座駕駛旁
 (D)處於口腔階段嬰幼兒容易發生異物哽塞或鉛中毒

- (C) 55 小傑，2 歲，罹患重度海洋性貧血（Thalassemia），需反覆入院輸血。母親為印尼裔回教徒的新住民，中文溝通有限，有關以家庭為中心的護理計畫，下列敘述何者最適當？
 (A)提供家庭以臺灣本土文化為主的照護計畫
 (B)完全配合印尼文化，進行所有病童與其家庭對疾病與住院的反應和需求照護
 (C)在住院期間，儘量與家庭的文化習慣和常規保有一致性
 (D)在所有照護決策過程，請小傑母親找尋其他家人幫忙做翻譯
- (B) 56 早產兒常出現呼吸暫停現象，下列敘述何者正確？
 (A)指呼吸停止連續 10~15 秒，且併有發紺、心跳變快的現象
 (B)維持俯臥姿勢，可縮短早產兒發生呼吸暫停時的心跳遲緩，或發紺之持續時間
 (C)給予 theophylline 時，須觀察有無心搏過慢，及嗜睡等中毒的徵象
 (D)出現呼吸暫停，立即執行心外按摩，促進呼吸恢復
- (B) 57 小花，8 歲，罹患神經母細胞瘤末期，問護理師他是否快要死掉了，下列敘述何者較適當？
 (A)沒有啊，是誰告訴你的，不要想那麼多
 (B)為什麼你突然問這個問題，說說看你在擔心什麼
 (C)你聽誰說的？你是不是太累了，會不會聽錯了
 (D)每個人都會死掉，只是早死或晚死罷了
- (D) 58 協助學齡前期的手足面對病童瀕死的護理措施，下列敘述何者正確？
 (A)為了保護病童之手足，應減少手足與瀕死的病童接觸
 (B)此年齡的孩童對死亡概念模糊，不需與他談到死亡
 (C)當手足出現行為問題時，須予以糾正
 (D)以繪本或遊戲方式，引導病童手足講出其心中想法
- (D) 59 有關川崎氏症（Kawasaki disease）的臨床表徵，下列敘述何者錯誤？
 (A)急性期會出現持續發燒 5 天以上
 (B)急性期兩眼結膜充血、草莓樣舌和頸部淋巴結腫大
 (C)亞急性期可能出現腕、膝和踝等關節痛的症狀
 (D)亞急性期紅血球沉降速率和血小板數值降低
- (D) 60 感染麻疹（measles）在卡他期（catarrhal stage）的病童之 3C 症狀，下列敘述何者不適當？
 (A)結膜炎（conjunctivitis）
 (B)鼻炎（coryza）
 (C)咳嗽（cough）
 (D)抽搐（convulsion）
- (C) 61 小傑，8 個月，罹患支氣管肺炎（Bronchopneumonia），需住院治療，下列護理措施何者不適當？
 (A)進行呼吸症狀評估，且依醫囑給予氧氣
 (B)促進小傑休息和節省體力，故採集中護理
 (C)每當小傑看見父母時都會大哭，宜避免父母親參與照顧
 (D)宜抬高床頭給予舒適臥姿，促進肺部擴張
- (D) 62 有關兒童罹患會厭炎（Epiglottitis）的典型症狀，下列敘述何者最不適當？
 (A)流口水 (B)吞嚥困難 (C)發聲困難 (D)口腔潰瘍
- (D) 63 王小弟，2 歲，因肺部的下葉上節有痰液蓄積，護理師為其執行姿位引流，下列姿勢何者最適當？
 (A)俯臥，頭放低 30 度 (B)側臥，頭放低 15 度
 (C)側臥，頭放低 30 度 (D)俯臥，頭放低 15 度
- (B) 64 王小妹，6 個月大，有關心導管檢查前的準備，下列敘述何者適當？
 (A)避免測量下肢血壓
 (B)確認禁食 4~6 小時
 (C)確認鼠蹊部脈搏最強處，標示記號
 (D)確認檢查前不宜給鎮靜劑與抗生素

- (B) 65 有關病毒性腦膜炎 (virus meningitis) 的護理措施，下列敘述何者錯誤？
 (A)採支持性療法或症狀治療
 (B)大多數病童會出現神經系統障礙的後遺症
 (C)持續監測病童的生命徵象
 (D)若同時發生細菌性感染，則會給予抗生素使用
- (B) 66 有關胎兒出生後的心臟血管變化，下列敘述何者錯誤？
 (A)左心房壓力大於右心房，導致卵圓孔瓣膜關閉
 (B)臍動脈閉合，形成肝圓韌帶
 (C)左心房與左心室的壓力增加
 (D)動脈導管於出生後 1~3 個月閉塞，形成動脈韌帶
- (C) 67 有關血友病住院病童及其家屬之照顧，下列敘述何者較適當？
 (A)父母為帶因者易對病童有罪惡感，應支持父母對病童的保護行為
 (B)為維護健康手足之生活品質，宜儘量減少其至病房
 (C)為提升病童自我照顧能力，應儘早提供居家照護知識
 (D)為避免受同儕排擠，應鼓勵病童積極參加學校各類活動
- (D) 68 小凌，16 歲，罹患再生不良性貧血，住院接受抗淋巴球蛋白 (ALG) 及 cyclosporin 治療，下列護理措施何者較適當？
 (A)因小凌食慾不振，儘量選擇其愛吃的食物，例如生菜沙拉
 (B)青春期在意身體外觀，先暫不告知藥物有外觀改變之副作用
 (C)為避免社交隔離，鼓勵安排同學到院探訪
 (D)發燒時，避免使用 aspirin，以免延長出血時間
- (A) 69 小青，2 歲，罹患先天性甲狀腺功能低下 (congenital hypothyroidism)，下列敘述何者不適當？
 (A)提供低纖維食物，以預防腹瀉
 (B)增加鐵質的提供，以預防貧血
 (C)給予四肢適當保暖，預防體溫過低
 (D)鼓勵增加日曬時間，以促進骨骼發展
- (A) 70 有關兒童腫瘤好發部位的敘述，下列何者錯誤？
 (A)骨肉瘤 (osteosarcoma) 最常發生於肱骨 (humerus)
 (B)最常見的原發性腦瘤是膠質瘤 (glioma)
 (C)神經母細胞瘤 (neuroblastoma) 最常發生在腎髓質
 (D)威廉氏腫瘤 (Wilm's tumor) 是發生於腎臟的惡性腫瘤
- (C) 71 林小弟，9 歲，因為急性腎絲球腎炎 (acute glomerulonephritis) 而入院治療，有關此疾病之護理照顧，下列敘述何者錯誤？
 (A)急性期階段，儘量鼓勵臥床休息，以減少能量消耗
 (B)須密切監測病童水腫、血壓、尿量等的變化
 (C)鼓勵病童多進食高鉀食物，如香蕉、橘子以預防低血鉀
 (D)每日定時使用同一磅秤與相同穿著測量體重
- (A) 72 有關早產兒呼吸窘迫症候群的護理措施，下列敘述何者正確？
 (A)胸部 X 光表現為肺擴張不全，毛玻璃樣的變化
 (B)胎兒在妊娠週數 32 週大時才開始製造及分泌表面張力素
 (C)早產兒呼吸窘迫症候群的臨床表徵為吸氣出現咕嚕聲
 (D)呼吸性酸中毒為動脈血液氣體分析 $\text{pH} < 7.20$ 、 $\text{PaO}_2 > 50 \text{ mmHg}$
- (B) 73 小強，男生，1 個月大，因泌尿道感染住院，有關此疾病敘述與照顧，下列何者錯誤？
 (A)嬰兒常出現的臨床表徵包括發燒、餵食困難、食慾下降等
 (B)鼓勵給予小強蔓越莓汁，以鹼化尿液，預防感染
 (C)指導母親應給予小強勤換尿布及避免泡澡
 (D)指導母親在小強抗生素服用期間，勿因症狀改善而任意停用抗生素

- (B) 74 兒童是易受輪狀病毒感染的高危險群，為預防輪狀病毒感染，有關家屬的護理指導，下列敘述何者錯誤？
 (A) 鼓勵父母及兒童養成勤洗手習慣
 (B) 需注射兩劑輪狀病毒疫苗
 (C) 儘量減少出入公共場所
 (D) 勿吃生食，保持廚房、器具、食材的清潔
- (D) 75 罹患腸套疊 (intussusception) 的病童，接受鉦劑灌腸治療後，下列敘述何者正確？
 (A) 腸套疊可完全復原，不需擔心再度復發
 (B) 必須配合外科手術使腸道完全復位
 (C) 初次解出灰白色糞便代表非正常現象
 (D) 解出正常的褐色糞便，表示腸套疊可能復原
- (A) 76 有關病童罹患膀胱輸尿管逆流 (Vesicoureteral Reflux; VUR) 的初期臨床表徵，下列敘述何者正確？
 (A) 排尿疼痛有灼熱感
 (B) 無尿意感
 (C) 出現下肢骨突處凹陷性水腫
 (D) 總膽固醇與三酸甘油脂數值上升
- (C) 77 周小弟，12 歲，因打球跌倒導致右側脛腓骨骨折，已上石膏住院治療，下列護理措施何者錯誤？
 (A) 不可使用烤燈加速石膏乾燥
 (B) 評估右下肢皮膚及指甲床顏色、溫度有無改變
 (C) 患肢未被石膏固定的上下關節儘量固定不動，避免疼痛
 (D) 抬高敷有石膏的患肢，以促靜脈回流
- (C) 78 小畢，5 歲，因騎腳踏車跌倒，頭撞到地板，出現頭痛、嘔吐的現象，送醫後緊急接受開顱手術，下列有關手術後護理何者不適當？
 (A) 密切評估監測意識狀態與生命徵象
 (B) 觀察有無顱內壓增高症狀，如頭痛、嘔吐、視力模糊等
 (C) 協助小畢採頭低臀高的姿勢，以促進頭部傷口引流
 (D) 提供安靜光線柔和的環境，並減少聲光刺激
- (C) 79 張小弟，5 個月，因水腦症入院，為預防顱內壓升高，下列護理措施何者不適當？
 (A) 密切觀察有無凶門鼓脹或噴射狀嘔吐現象
 (B) 抬高床頭 30~45 度，以降低腦內壓
 (C) 術後每 2 小時協助叩擊與抽痰，以預防吸入性肺炎
 (D) 給予安撫奶嘴以減少哭泣不安
- (D) 80 有關兒童腦性麻痺的型態及表徵，下列敘述何者不適當？
 (A) 運動失調型 (ataxic) 因小腦功能病變而導致平衡和協調障礙
 (B) 痙攣型 (spastic) 因錐體徑路病變而肌肉持續性出現高張力
 (C) 運動困難型 (dyskinetic) 因錐體外徑路病變而有不自主運動
 (D) 徐動型 (athetoid) 因基底核受損而使雙下肢麻痺

【版權所有，翻印必究】