

《產兒科護理學》

- (A) 1 一般來說，妊娠期間心臟負荷增加，橫膈膜被子宮壓迫，使心臟如何移位？
(A)向左上 (B)向左下 (C)向右上 (D)向右下
- (B) 2 李小姐急切想知道自己是否懷孕，下列何種檢體可最快確認受孕？
(A)尿液 (B)血液 (C)唾液 (D)陰道分泌物
- (C) 3 林女士第一胎，目前懷孕38 週，她告訴護理師說：「睡覺到半夜，突然發現褲子濕了，因此趕到醫院來」，此時護理師應採取何項措施以確定原因？
(A)驗尿檢查WBC (B)抽血檢查CRP
(C)以石蕊試紙測試陰道流出物 (D)做陰道分泌物培養
- (D) 4 下列何項是臍帶受壓迫的結果？
(A)早發性胎心音減速 (B)晚發性胎心音減速
(C)嚴重末期性胎心音減速 (D)變異性胎心音減速
- (D) 5 林小姐有施打海洛因習慣，目前懷孕28 週，下列敘述何者正確？
(A)繼續施打低劑量海洛因，以避免驟然戒斷危急胎兒 (B)以嗎啡替代使用
(C)胎兒會有臉部異常 (D)胎兒出生須觀察有無海洛因戒斷症候群
- (C) 6 林太太第一次懷孕，目前懷孕8 週，她抱怨先生對於懷孕並不興奮，照樣加班，無視她懷孕。護理師應如何回答較適當？
(A)「妳先生的確太不體貼。」 (B)「妳先生不喜歡表達內心的情感。」
(C)「妳先生正在適應準父親角色。」 (D)「男人都是這樣，妳不要太敏感了。」
- (B) 7 陳女士目前已懷孕34 週，她開始計劃為新生兒添購玩具、衣服、用品等。她告訴護理師，很怕自己會生下早產兒，護理師較適當的回應為：
(A)「妳可以請醫師為妳執行陰道內診。」 (B)「為什麼妳會擔心這個呢？」
(C)「這是妳計劃中的懷孕嗎？」 (D)「妳可以增加產檢的次數。」
- (C) 8 妊娠婦女陰道易受白色念珠菌感染之原因為何？
(A)黃體激素刺激使黏膜變薄，陰道pH 值上升
(B)陰道血流量增加pH 值上升，可抵抗細菌入侵
(C)子宮頸腺體增生陰道pH 值下降，有利酵母菌生長
(D)陰道血流量增加pH 值下降，不利細菌及酵母菌生長
- (B) 9 有關Rubin 所提出第三妊娠期婦女心理變化之敘述，下列何項正確？
(A)關心胎兒，並幻想胎兒的長相 (B)感覺自己體重增加後變得笨拙，希望胎兒趕快出生
(C)對懷孕感到懷疑及不確定 (D)開始感受到胎動，而有驕傲及滿足感
- (A) 10 在胎兒生理活動評估 (biophysical profile) 項目中，何者不須使用超音波掃描？
(A)無壓力試驗 (B)胎兒呼吸運動 (C)胎兒身體張力 (D)羊水量
- (D) 11 林太太第一胎，晚上感到子宮收縮，到院檢查，護理師以胎兒監視器測得其子宮收縮為每5~10 分鐘一次，陰道內診發現子宮頸未開，此時最合宜之護理措施為何？
(A)準備剃陰毛 (B)告知禁食 (C)協助點滴注射 (D)鼓勵散步
- (D) 12 引發分娩的相關因素，下列何者正確？
(A)雌性素減少 (B)黃體激素增加 (C)催產素減少 (D)前列腺素增加
- (B) 13 李太太懷孕40 週，因超音波預估胎兒重量 3900 公克而準備入院引產，護理師在陰道內診後，使用比夏計分系統 (Bishop score) 評估，分數至少要達幾分，引產才較容易成功？
(A) 4 (B) 6 (C) 8 (D) 10

- (D) 14 有關胎盤剝離的敘述，下列何者正確？
 (A)通常胎盤剝離發生在嬰兒出生30 分鐘之後
 (B)胎兒娩出之後到胎盤娩出前，產婦不會主訴子宮收縮
 (C)出血主要是胎盤之羊膜的海綿層發生剝離，逐漸與子宮壁分離
 (D)平均失血量約200~300c.c.
- (C) 15 有關以Oxytocin 催生，下列敘述何者正確？
 (A)有尿崩症之合併症 (B)用於橫位孕婦之引產
 (C)可將其加入5% 葡萄糖水中稀釋做靜脈滴注 (D)可連續滴注72 小時
- (D) 16 李太太第一胎，目前子宮頸開8 公分，胎頭高度為+1，有便意感，此時最合宜之護理指導為何？
 (A)協助李太太用力 (B)協助李太太下床
 (C)運用腹部皮膚輕觸按摩法以轉移其注意力 (D)運用呼吸方法以避免用力
- (A) 17 有關真痛 (labor pain) 的敘述，下列何者正確？
 (A)子宮收縮會讓子宮頸變薄 (B)子宮收縮不規則
 (C)通常走動會減輕不適 (D)疼痛集中在腹股溝部位
- 情況：護理師做晨間護理時，產後第一天的王太太不斷的敘述著昨天的生產經過，並抱怨下次再也不要生了，對於新生兒是女孩，感到非常不滿意，言談中眼睛也不時閃著淚水。請回答第18~19 題。
- (D) 18 此時護理師最適宜的護理措施是：
 (A)為增強親子關係，鼓勵哺餵母乳 (B)轉移其不滿的情緒
 (C)告知女孩男孩一樣好 (D)鼓勵她說出生產的感受
- (C) 19 護理師依據魯賓 (Rubin) 對產後婦女行為態度之研究結果判斷，王太太此時的心理狀態是處於：
 (A)興奮期 (B)緊執期 (C)接受期 (D)放手期
- (A) 20 產後若子宮底的位置較高又偏離中線，最可能的原因為何？
 (A)膀胱脹尿 (B)宮縮不好 (C)胎盤未剝離乾淨 (D)惡露聚積未排出
- (A) 21 有關產後子宮復舊及評估的敘述，下列何者錯誤？
 (A)如膀胱脹滿，子宮收縮會更硬 (B)當子宮呈球狀硬塊時，即可不須按摩
 (C)子宮收縮弛緩可能是感染所造成的 (D)子宮鬆弛須進一步評估惡露量、味、性質
- (B) 22 若 1 小時內惡露量在產墊上的面積約5 吋，評估結果為下列何者？
 (A)大量 (B)中量 (C)小量 (D)微量
- (B) 23 下列哺餵母乳的方式，何者對增加嬰兒的營養最有利？
 (A)每次餵奶時，每一側乳房均須輪流吸吮5 分鐘
 (B)儘可能吸吮一側乳房15 分鐘以上，直至嬰兒自己鬆開，下一次再由另一側乳房開始餵奶
 (C)兩次哺餵母乳之間，給予少量牛奶，以補充母乳營養之不足
 (D)母親食用豬肝炒韭菜，以促進乳汁分泌並增加營養
- (A) 24 產後排乳 (let-down) 反射主要是因為下列何種賀爾蒙之影響所致？
 (A)催產素 (oxytocin) (B)黃體激素 (progesterone)
 (C)雌性素 (estrogen) (D)泌乳激素 (prolactin)
- (B) 25 有關母乳與配方奶粉的比較，下列何者錯誤？
 (A)母乳乳糖含量較高 (B)母乳含乳酪蛋白較高
 (C)配方奶粉含飽和脂肪酸比率較高 (D)配方奶粉含鐵鈣濃度較高

- (C) 26 將未結合性膽紅素轉變為結合性膽紅素的是下列何種器官？
(A)脾 (B)腎 (C)肝 (D)胃
- (A) 27 下列何者不是第三妊娠期常見的出血原因？
(A)葡萄胎 (B)前置胎盤 (C)胎盤早期剝離 (D)早產
- (B) 28 下列何種新生兒生理特徵是異常現象？
(A)出生第二天，發現女嬰會陰部有紅色分泌物 (B)出生第二天，前囟門膨出
(C)出生第三天，身體皮膚出現毒性紅斑 (D)男嬰乳房有充盈現象
- (D) 29 HELLP 症候群之敘述，下列何者正確？
(A)通常發生在第二妊娠期 (B)H 是指羊水過多 (hydramnios)
(C)EL 是指胎心音早期減速 (D)LP 是指血小板減少症

情況：丁太太G₁P₀，妊娠12週，早晨起床後自覺下腹酸痛，陰道並有點狀出血，至門診檢查。請回答第30~31題。

- (B) 30 醫師診察結果：丁太太的子宮頸未開，超音波檢查胎兒狀況正常，胎心音也在正常範圍，胎盤功能正常。則下列處置何者正確？
(A)給予硫酸鎂 (MgSO₄) 安胎，並鼓勵丁太太增加運動量，以防止藥物副作用
(B)給予黃體激素服用，並鼓勵丁太太多臥床休息
(C)給予Yutopar 靜脈注射，並採絕對臥床，包括床上大小便
(D)給予肌肉鬆弛劑服用，可維持正常的工作量與生活作息
- (B) 31 丁太太持續有點狀出血，但妊娠18週時，出血量增多、下腹部痙攣合併子宮頸擴張、羊膜破裂，胎兒已無法保留。下列何者符合丁太太目前的情形？
(A)早產 (B)迫切性流產 (C)習慣性流產 (D)子宮頸閉鎖不全
- (D) 32 有關胎兒發生Rh 因子過敏反應之敘述，下列何者正確？
(A)母親為初產婦Rh (+)，胎兒為Rh (-)，父親為Rh (-)
(B)母親為初產婦Rh (-)，胎兒為Rh (+)，父親為Rh (+)
(C)母親為經產婦Rh (+)，胎兒為Rh (-)，父親為Rh (-)
(D)母親為經產婦Rh (-)，胎兒為Rh (+)，父親為Rh (+)
- (D) 33 下列何者不是骨盆構造的一部分？
(A)髖骨 (B)薦骨 (C)尾骨 (D)股骨
- (C) 34 陳小妹心跳速率 105 次/分，呼吸速率不規則，四肢屈曲張力佳，以吸球抽吸時面部扭曲，軀幹粉紅四肢發紺，以阿帕嘉 (Apgar) 評分系統評估時，陳小妹的得分應為多少？
(A)5 分 (B)6 分 (C)7 分 (D)8 分
- (B) 35 針對經前症候群，下列何種護理措施最合適？
(A)多攝取咖啡，以減輕偏頭痛的情形
(B)自在放鬆的做肢體運動，以增加全身氧氣及舒適
(C)使用類固醇類藥物，以緩解症狀
(D)臥床休息，以減輕水腫不適
- (A) 36 有關子宮頸癌疫苗接種之敘述，下列何者錯誤？
(A)預防子宮頸癌效果達95% 以上 (B)最佳接種的年齡約在青少年時期
(C)接種對象以尚無性經驗者最佳 (D)注射後，仍須定期接受子宮頸抹片檢查
- (D) 37 有關婦女更年期可能出現的熱潮紅與下列何者有關？
(A)黃體激素增加 (B)黃體激素減少 (C)動情素增加 (D)動情素減少
- (B) 38 有關預防陰道感染的方法，下列敘述何者錯誤？
(A)養成正確如廁習慣，由前往後擦拭 (B)經常以乳酸菌溶液做陰道灌洗
(C)多食用乳酸菌、蔓越莓，以維持陰道的酸性環境 (D)穿著透氣的棉質內褲

- (B) 39 張女士待產時胎心率發生變異性減速 (variable deceleration)，此時護理師應最先執行的護理措施為下列那一項？
(A) 抬高張女士頭部 (B) 觀察陰道有無出血
(C) 測量生命徵象 (D) 協助張女士改變臥姿，如採膝胸臥式
- (A) 40 下列那一種癌症，初期毫無症狀，等到發現症狀時已進入末期，且被認為是中老年婦女最危險的一種生殖器官疾病？
(A) 卵巢癌 (B) 子宮頸癌 (C) 乳癌 (D) 陰道癌
- (C) 41 謝小弟，體重8 公斤，不慎燙傷，送入急診，經評估為二度燒傷，燒傷面積為25%，最初24 小時須緊急輸注乳酸林格氏溶液 (Lactated Ringer's solution) 800c.c.，其最初8 小時的輸液量應為多少c.c.？
(A) 100 (B) 200 (C) 400 (D) 600
- (D) 42 由一位急救人員為10 歲兒童施行心外按摩時，心外按壓與人工呼吸的比例應為多少？
(A) 5 : 1 (B) 5 : 2 (C) 15 : 2 (D) 30 : 2
- (B) 43 有關兒童血液系統之解剖生理特性的敘述，下列何者正確？
(A) 顆粒性白血球中以嗜鹼性白血球數目最多，約占62%
(B) 胎兒型血紅素由2 α 及2 γ 血球蛋白鏈所組成
(C) 淋巴球正常壽命為120 天
(D) 衰老的血小板大部分從腎臟排出
- (C) 44 有關兒童汽車安全座椅的敘述，下列何者錯誤？
(A) 3 個月以下的嬰兒，須在頸部兩側放置支撐物
(B) 體重未達10 公斤的嬰兒，可坐在後座放置的安全座椅，面向車尾
(C) 體重10~18 公斤的幼童，可在後座由家人抱著，並共繫安全帶
(D) 體重18~36 公斤的兒童，應坐在後座，並使用安全帶
- (C) 45 護理人員做身體檢查評估時，發現王小弟心臟聽診有明顯的心雜音，觸診有震顫，以心雜音六級強度來記錄，下列何者正確？
(A) II/VI (B) III/VI (C) IV/VI (D) VI/VI
- (A) 46 有關新生兒篩檢的敘述，下列何者正確？
(A) 出生滿72 小時或餵奶滿48 小時後方可採血
(B) 檢驗前新生兒必須禁食8 小時，且膽紅素值低於15 gm/dL
(C) 採血穿刺部位宜選擇耳垂、手指或腳趾
(D) 新生兒有餵食問題或黃疸等異狀時，才須做新生兒篩檢
- (C) 47 依丹佛II 嬰幼兒發展篩檢測驗，百分之九十嬰幼兒能走得很穩的年齡為何？
(A) 9 個月大 (B) 12 個月大 (C) 15 個月大 (D) 20 個月大
- (C) 48 有關給予一位5 歲兒童耳朵滴藥的護理注意事項，下列何者錯誤？
(A) 應先將耳藥溫熱至與體溫相同 (B) 應將兒童耳廓向上及向後拉
(C) 給藥後應躺向患側5~10 分鐘 (D) 輕輕按摩耳前方以利藥液流入耳道
- (D) 49 有關兒童腦性麻痺型態的敘述，下列何者錯誤？
(A) 運動失調型乃因小腦功能病變，會出現跨大步伐
(B) 痙攣型會出現伸展反射及肌肉張力增加
(C) 手足徐動型主要因基底核及錐體外病變，而產生不自主運動
(D) 無張力型其肌肉呈規律性的不隨意運動
- (B) 50 有關病理性黃疸之敘述，下列何者錯誤？
(A) 出生24 小時內出現黃疸 (B) 易發生於Rh (+) 的母親懷Rh (-) 的胎兒時
(C) 足月兒黃疸症狀持續1 星期以上 (D) 每日增加膽紅素 > 5 mg/dL

- (D) 51 懷孕週數約36 週時，羊水中的卵磷脂／抱合髓磷脂（lecithin/sphingomyelin）之比值至少要達到多少時，才表示胎兒可產生足夠的表面張力素（surfactant）？
(A) 0.5 (B) 1 (C) 1.5 (D) 2
- (B) 52 4 歲小花最近遭遇母親死亡的經歷，根據此年齡對死亡的理解，小花可能會說什麼？
(A)「我的媽媽死了，爸爸會再幫我找個新媽媽。」
(B)「我媽媽死了，但是我很快就可以再見到她。」
(C)「我想我媽上天堂了，有一天我死了，我會去見她。」
(D)「爸爸說天使帶媽媽上天堂了，為什麼天使只帶她去？」
- (A) 53 下列何者是早產兒壞死性結腸炎（necrotizing enterocolitis）的早期徵兆？①胃餘量增加 ②腹脹 ③痙攣 ④體溫不穩 ⑤心搏過速
(A)①②④ (B)①③④ (C)②③⑤ (D)②④⑤
- (B) 54 有關疫苗種類及特性之說明，下列何者正確？
(A) b 型流行性嗜血桿菌（Hib）疫苗是一種活病毒疫苗
(B)破傷風疫苗是一種用加熱或化學方式來降低毒性效果之類毒素
(C)麻疹疫苗是一種已被殺死的微生物病原之死病毒疫苗
(D)小兒麻痺疫苗是一種改變微生物基因重組的疫苗
- (D) 55 林小弟自出生即按時接種疫苗，現在滿6 個月，今日來衛生所接受預防注射，尚不能接種的疫苗為：
(A)B 型肝炎疫苗第三劑 (B)白喉、百日咳、破傷風疫苗第三劑
(C)小兒麻痺口服疫苗第三劑 (D)麻疹、德國麻疹、腮腺炎混合疫苗第一劑
- (D) 56 有關腮腺炎之敘述，下列何者正確？
(A)不是傳染性疾病，不須採取隔離措施
(B)只侵犯嬰幼兒及兒童期孩童，易合併中耳炎
(C)前驅或發病期皆無明顯不適症狀或發燒
(D)由於咀嚼時會疼痛不適，應採流質或軟質飲食
- (CD) 57 林小弟，4 歲，罹患肺炎，有呼吸困難現象，護理人員為其做胸部評估不會發現下列何種徵象？
(A)視診：可看到鼻翼煽動 (B)視診：吸氣時，可看到肋間肌凹陷
(C)聽診：兩側肺葉有喘鳴聲 (D)叩診：肺部出現鈍音
- (C) 58 抽痰前不宜將生理食鹽水滴入氣管內管或氣切套管的主要理由為何？
(A)會使痰液量增加，致病童不易將痰液排出
(B)生理食鹽水附著在抽痰管壁，會增加呼吸道阻力
(C)會使病童血氧飽和度降低（desaturation），且增加院內感染
(D)會增加病童耗氧（O₂ consumption）及二氧化碳滯留（CO₂ retention）
- (C) 59 林小弟，6 歲，每日白天都有氣喘症狀，平時有慢性咳嗽或呼吸喘鳴聲，一星期內發作2 次，夜間症狀更明顯，發作時會影響活動及睡眠。依據以上敘述，林小弟屬於那一層級氣喘發作？
(A)輕度間歇性氣喘 (B)輕度持續性氣喘
(C)中度持續性氣喘 (D)重度氣喘
- (A) 60 王小弟，10 歲，診斷為破傷風，下列護理措施何者錯誤？
(A)告知王小弟及其家屬戴口罩，做呼吸道隔離
(B)咽喉痙攣會造成肺部擴張不全及肺炎
(C)保持環境安靜，避免聲光刺激，以防止強直性痙攣之發生
(D)在病人單位備氣管切開術用具，以備不時之需

- (B) 61 根據全球氣喘倡議組織 (Global Initiative of Asthma; GINA) 2006 版之診療指引, 下列何者是氣喘治療階段的指標?
(A)氣喘兒童的罹病時間 (duration of illness)
(B)氣喘的控制程度 (level of control)
(C)氣喘兒童的最大肺活量 (forced vital capacity)
(D)氣喘兒童的呼吸道再塑造 (airway modeling) 情形
- (B) 62 心室中隔缺損病童, 接受心導管檢查, 其結果會呈現下列何種現象?
(A)左心室的含氧濃度下降, 壓力下降
(B)右心室的含氧濃度上升, 壓力上升
(C)右心房的含氧濃度上升, 壓力上升
(D)左心房的含氧濃度下降, 壓力上升
- (A) 63 偉偉, 6 歲, 因罹患法洛氏四重畸形 (Tetralogy of Fallot's) 住院接受開心手術治療, 下列敘述何者錯誤?
(A)術前若出現缺氧發作, 可採膝胸臥式, 增加下肢靜脈血回流至心臟
(B)術前24 小時會停止使用毛地黃藥物
(C)可藉嚴密監測病童的尿量來了解心輸出量
(D)手術後每4 小時執行胸腔物理治療, 協助排出痰液
- (B) 64 有關開放性動脈導管 (patent ductus arteriosus) 的敘述, 下列何者正確?
(A)血液會由主動脈流向肺靜脈
(B)肺血流增加, 肺部壓力增高
(C)心音聽診時, 會出現舒張期心雜音
(D)可給予前列腺素E1 (Prostaglandin E1; PGE1), 以促使關閉
- (A) 65 江小弟被診斷為A 型的血友病, 下列敘述何者錯誤?
(A)A 型血友病是指血漿中缺乏第九凝血因子 (B)出血時間正常
(C)凝血酶原時間 (PT) 呈現正常 (D)血小板數目及形狀正常
- (C) 66 寶弟, 10 歲, 患有鎌狀細胞貧血 (sickle cell anemia), 今因出現血管阻塞危機 (vaso-occlusive crisis) 及關節疼痛而入院治療, 下列那種護理措施最能有效處理其關節疼痛的問題?
(A)冷敷疼痛部位及給予口服阿司匹靈 (Aspirin) 止痛
(B)用冷敷減輕疼痛, 並要求他臥床休息或安排繪畫、靜態遊戲
(C)用熱敷減輕疼痛, 並鼓勵大量飲水
(D)用熱敷消腫, 並鼓勵他在可以忍受的程度下活動
- (C) 67 有關兒童白血病的敘述, 下列何者正確?
(A)骨髓性白血病占兒童白血病的80%
(B)目前兒童白血病的治療以骨髓移植為主
(C)較大兒童的骨髓穿刺, 通常採後側腸骨嵴的部位
(D)在化學治療的鞏固期最容易出現感染及自發性出血
- (A) 68 秀秀, 10 歲, 診斷為第1 型糖尿病, 護理人員和秀秀的父母、老師討論秀秀在學校呈現低血糖症狀時, 須及時補充糖類飲食, 但下列何種情況不宜補充糖類飲食?
(A)胸痛、嘔吐、呼吸帶有水果味 (B)發抖、冒冷汗、皮膚濕冷、臉色蒼白
(C)頭昏、頭痛、全身無力 (D)飢餓、噁心、心悸、心跳加速
- (B) 69 小明罹患第1 型糖尿病, 下列何者不是酮酸中毒的血液檢驗結果?
(A)低血鈉 (B)高血鉀
(C)重碳酸氫鈉低於15 mEq/dL (D)pH 值少於7.3

- (C) 70 5 個月的嬰兒被診斷為呆小症 (cretinism)，其最有可能的原因是下列何者？
(A) 尿素合成代謝障礙 (urea cycle disorder)
(B) 高苯丙胺酸血症 (hyperphenylalaninemia)
(C) 甲狀腺素缺乏 (thyroxine deficiency)
(D) 高膽紅素血症 (hyperbilirubinemia)
- (A) 71 吳小妹，罹患白血病，化學治療期間血液檢查結果：絕對嗜中性白血球 (ANC) 數目為 $320/\text{mm}^3$ ，血小板為 $11 \times 10^4/\text{mm}^3$ ，紅血球為 $3.1 \times 10^6/\text{uL}$ ，血色素為 10 gm/dL 。依據檢查結果，下列護理措施何者適當？
(A) 吳小妹易感染，須採保護性隔離措施
(B) 須觀察皮膚、小便及大便情形，以早期發現自發性出血狀況
(C) 因紅血球不足，須限制活動，減少耗氧量
(D) 鼓勵攝入含鐵量高的食物，以提升血色素值
- (B) 72 有關膽道閉鎖 (biliary atresia) 的敘述，下列何者錯誤？
(A) 因缺乏膽素，大便呈灰白色 (B) 無法吸收鐵質及水溶性維生素
(C) 肝外膽管阻塞最好 2 個月大時，即進行外科手術 (D) 須攝取高蛋白低脂飲食
- (C) 73 有關腸套疊 (intussusception) 的臨床表徵，下列何者錯誤？
(A) 突然出現嚴重腹痛 (B) 解出草莓果醬樣大便
(C) 腹瀉，且嘔吐物不含膽汁 (D) 觸診右上腹部，可摸到香腸樣腫塊
- (C) 74 有關急性腎絲球性腎炎 (acute glomerulonephritis; AGN) 之敘述，下列何者錯誤？
(A) 主要由於上呼吸道或皮膚曾受到 A 群 β 型溶血性鏈球菌的感染
(B) 病童在急性期時，會出現無尿或少尿情形
(C) 急性期時會出現代謝性鹼中毒
(D) 蛋白尿約 3+ 至 4+
- (A) 75 小玉，7 歲，母親發現她的腹圍最近增大許多，經醫師檢查，確定小玉罹患威廉氏腫瘤 (Wilm's tumor)，小玉手術前的護理措施，下列何者不適當？
(A) 每日觸診小玉腹部，測量腫瘤大小，並用按摩方式，減輕腹部腫脹
(B) 術前要特別監測血壓，注意高血壓徵候
(C) 利用畫圖或可以移除腎臟的布娃娃，向小玉解釋她的病情與治療
(D) 告訴家屬，小玉手術後還須做化學治療與放射線治療
- (A) 76 有關因輪狀病毒 (rotavirus) 感染引起腸胃炎的敘述，下列何者正確？
(A) 好發於 6 個月 ~ 2 歲的嬰幼兒 (B) 主要傳染途徑為飛沫傳染
(C) 夏天的發生率較高 (D) 全家人均須檢查有無帶原
- (D) 77 4 歲大的水腦症 (hydrocephalus) 兒童，在其右側置入腦室-腹膜分流管 (ventriculoperitoneal shunt; V-P shunt)，術後立即性的姿勢應該是：
(A) 右側臥，床尾提高 (B) 左側臥，床頭提高 (C) 俯臥，床頭提高 (D) 仰臥，床頭放平
- (A) 78 有關脊柱側彎 (scoliosis) 之敘述，下列何者錯誤？
(A) 可發生於任何年齡，最常出現在青春期男孩 (B) 做彎腰動作時，背部呈現明顯的突峰
(C) 可能影響肺部換氣 (D) 早期病童可以游泳來作為治療性運動
- (B) 79 有關先天性髖脫位 (congenital dislocation of the hip) 的檢查方式，下列何者符合卡列阿齊氏徵象 (Galeazzi's sign) 陽性的敘述？
(A) 當患肢單腳站立時，健肢髖部由原來正常高度向下傾斜
(B) 仰臥，將髖關節屈曲成 90 度時，可發現患肢的膝蓋頂點較健肢低
(C) 將患肢腿屈曲做外展運動，可聽到股骨頭滑過髖臼緣的卡答聲
(D) 略施壓力於不穩定性的髖部，做大腿上下運動，可感覺股骨頭在關節囊內滑動

- (D) 80 有關熱性痙攣 (febrile convulsion) 的敘述，下列何者正確？
- (A) 好發於7 歲以上的兒童
 - (B) 在夏季，兒童體溫會隨著環境溫度升高，而發生抽搐
 - (C) 痙攣發生於發燒24 小時後
 - (D) 痙攣的特性呈現強直-陣攣性 (tonic-clonic) 抽搐

高
點
·
建
國

【版權所有，重製必究！】