

《產兒科護理學》

- (D) 1 有關新生兒死亡率的公式，下列何者正確？
 (A)所有原因死亡之新生兒死亡人數／該年活產數×100,000
 (B)所有小於30 天的新生兒死亡人數／該年活產數×10,000
 (C)所有原因死亡之新生兒死亡人數／該年活產數×10,000
 (D)所有小於28 天的新生兒死亡人數／該年活產數×1,000
- (B) 2 有關產科技術變革的敘述，下列何者錯誤？
 (A)羊膜穿刺術可評估胎兒健康狀態與胎兒肺成熟度
 (B)羊膜穿刺術的結果需36 小時就可得到完整的染色體檢查報告
 (C)絨毛膜取樣術比羊膜穿刺術可更快得到完整的染色體檢查報告
 (D)如胎兒泌尿道阻塞或先天性橫膈疝氣等可施行胎兒手術
- (C) 3 有關以超音波來估算預產期之敘述，下列何者正確？
 (A)妊娠5~6 週，測胎兒頭臀長（CRL）與常模比較可得最準確估算
 (B)妊娠20 週，測胎兒頭圍、腹圍及股骨長與常模比較可得最準確估算
 (C)妊娠20~29 週，測胎兒雙頂徑與常模比較可得最準確估算
 (D)妊娠38 週胎頭固定後，以超音波來估算預產期最準確
- (D) 4 有關孕時期子宮變化的敘述，下列何者正確？
 (A)子宮大小的改變是肌細胞數目的增加
 (B)子宮變化是受濾泡刺激素（FSH）及黃體生成素（LH）的刺激而增生
 (C)子宮變化與胎兒的成長及大小無關
 (D)子宮大小及容量增大時，子宮壁厚度反而變薄
- (C) 5 孕婦為避免背痛不適，可採許下列何種站姿？
 (A)腹部前傾站立 (B)肩膀前傾站立 (C)背部挺直 (D)兩腳併攏
- (A) 6 張女士目前妊娠34 週，產前檢查時主訴最近兩天感覺胎動明顯變少了，最適合安排的檢查為：
 (A)無壓力試驗 (B)宮縮壓力試驗 (C)羊膜穿刺術 (D)絨毛膜取樣術
- (C) 7 通常剖腹生產的皮膚準備範圍為何？
 (A)會陰部與下腹部 (B)乳線以下至整個腿部
 (C)乳線以下至大腿上1/3 處 (D)肩部至大腿上1/3 處
- (B) 8 妊娠期婦女胃腸系統平滑肌之鬆弛現象，是受下列何種荷爾蒙的影響？
 (A)雌性素 (B)黃體素
 (C)人類胎盤泌乳激素 (D)人類絨毛膜性腺激素
- (B) 9 王太太5 年前結婚，婚後自然懷孕並產下一女，之後王太太曾子宮外孕一次後，未避孕也未再懷孕。2 年前王太太開始接受不孕症治療，前後接受5 次的胚胎植入，有3 次未成功著床，一次在10 週時胚胎萎縮而接受子宮刮除術，此次終於成功懷孕並足月產下一對龍鳳胎，王太太的產科史為：
 (A)G₃A₁P₂ (B)G₄A₁P₂E₁ (C)G₇A₂P₃ (D)G₇A₁P₃E₁
- (C) 10 LOA 分娩機轉中的「固定」，是胎兒先露部位以何徑線通過骨盆入口？
 (A)前後徑 (B)矢狀徑 (C)雙頂徑 (D)斜徑
- (B) 11 下列何者不是施打硬膜外麻醉的副作用？
 (A)頭痛 (B)高血壓 (C)下肢麻木 (D)體溫上升

- (D) 12 有關護理人員指導待產時之呼吸技巧與功能，下列敘述何者正確？
(A)去除產痛，免用止痛劑 (B)減少胎盤血流，減少窘迫
(C)增加呼吸次數，以增加含氧量 (D)促使放鬆，提高對產痛閾值
- (B) 13 李太太自然分娩後第3天，口溫 38.5°C ，下腹部有壓痛現象，宮底尚未下降，惡露色紅，這些症狀可能為：
(A)產後正常的現象 (B)子宮內膜感染的徵兆
(C)生產時過度用力所致 (D)產後宮縮痛
- (B) 14 黃太太第一胎，子宮頸開3公分，不管有無子宮收縮，胎心音會減速至 $80\sim 90$ 次，持續 $2\sim 3$ 分鐘後回復，此時正確之護理評估為何？
(A)胎頭下降 (B)臍帶受到壓迫 (C)胎盤血流不足 (D)前置胎盤
- (D) 15 蔡太太凌晨2點子宮收縮每 $5\sim 6$ 分鐘一次，子宮頸未開，凌晨4點，子宮頸開2公分，早上11點子宮頸全開，則其第一產程時間大約為：
(A)2小時 (B)11小時 (C)7小時 (D)9小時
- (B) 16 王太太告訴護理人員，她打算做月子時都不洗頭，此時護理人員的回應，下列何者最適當？
(A)「這樣很髒，您怎麼受的了？」 (B)「是什麼原因做這個決定？」
(C)「有聽過，但是很少人做得到。」 (D)「真的嗎？好奇怪。」
- (C) 17 以家庭為中心的產後護理照護原則，下列何者錯誤？
(A)產後先給親子眼對眼接觸後，再為新生兒點眼藥
(B)親子同室
(C)如果嬰兒置於高危險單位，父母只能於會客時間去探視
(D)出院後，護理人員做產後居家訪視
- (A) 18 產後惡露主要含蛻膜殘留、紅血球、白血球、細菌及子宮頸黏液的是：
(A)漿性惡露 (B)紅惡露 (C)黏性惡露 (D)白惡露
- (B) 19 作用於乳腺泡周圍的肌皮細胞，使其收縮的催產素是由何處分泌？
(A)腦下垂體前葉 (B)腦下垂體後葉 (C)卵巢 (D)子宮內膜
- (C) 20 有關避孕針劑的原理，下列敘述何者錯誤？
(A)利用高濃度黃體素 (B)抑制下視丘－腦下垂體軸的功能
(C)達到完全預防排卵目的 (D)干擾子宮內膜的發育
- (A) 21 有關母乳的敘述，下列何者錯誤？
(A)成熟乳的前乳顏色較白，後乳顏色較清淡
(B)母乳中的乳糖成分比例較配方奶粉高
(C)母乳中的酪蛋白成分比例較配方奶粉低
(D)哺餵母乳的嬰兒有較少的蛋白質代謝物－氨
- (B) 22 有關產後的子宮變化，下列敘述何者錯誤？
(A)胎盤娩出後，有自體溶解現象
(B)產後12小時子宮底約上升至肚臍下一指的位置
(C)一般產後10天子宮便進入骨盆腔
(D)產後子宮進入骨盆腔時，其重量約減為 $300\sim 500$ 公克
- (C) 23 小美月經週期規則為32天，排卵大約發生在月經週期的第幾天？
(A)第 $7\sim 8$ 天 (B)第 $13\sim 14$ 天 (C)第 $18\sim 19$ 天 (D)第 $22\sim 23$ 天
- (A) 24 胎兒在母體內即能自行合成少量的免疫球蛋白。下列何種免疫球蛋白無法自行製造，但可藉由哺餵母乳而獲得？
(A) IgA (B) IgE (C) IgG (D) IgM

- (B) 25 妊娠30 週的新生兒，其身體特徵為：
(A)身上完全沒有胎脂 (B)背部、臉頰有明顯胎毛
(C)腳底有很明顯的皺褶紋路 (D)皮膚不透明，手腳有脫屑情形
- (D) 26 自腳跟沿著腳底外側往上朝著大拇趾方向刺激，腳趾會呈扇形張開，是下列何種反射？
(A)踏步反射 (B)爬行反射 (C)足底抓握反射 (D)巴賓斯基反射
- (A) 27 呂小姐妊娠39 週產下一女嬰後，第一次親子同室照顧新生兒，下列措施何者錯誤？
(A)將新生兒採俯臥且頭轉向一側 (B)教導呂小姐如何使用吸球為新生兒抽吸
(C)適當覆蓋為新生兒保溫 (D)接觸新生兒前後洗手
- (A) 28 讓新生兒平躺，將腿部屈曲與軀幹成正確角度並外展，旋轉髖關節以檢查先天性髖關節發育情況的方法是下列何者？
(A)奧特藍尼法 (Ortolani Maneuver) (B)巴羅法 (Barlow Maneuver)
(C)麥當勞法 (McDonald Maneuver) (D)潘尼法 (Penny Maneuver)
- (B) 29 有關新生兒注射維生素K1的敘述，下列何者錯誤？
(A)新生兒腸道缺少菌叢會影響凝血因子的合成，可能會發生出血的情形，故給予新生兒維生素K1預防注射
(B)注射部位要選擇足以吸收藥物且避開神經和血管的大肌肉，最好的注射部位是臀大肌
(C)肌肉注射維生素K1的副作用，包括注射部位疼痛和水腫，或者出現紅疹、風疹等過敏反應
(D)護理人員應觀察臍帶、鼻子以及腸胃道等的出血現象，評估預防性劑量是否足夠
- (B) 30 產後立即執行新生兒皮膚檢查，下列何者可能是異常的？
(A)觸診皮膚平滑有彈性，不透明 (B)腋下、鼠蹊部皮膚有淺綠色胎脂
(C)鼻頭有許多白色小粒 (D)薦部有1 個2x2.5 cm²的蒙古斑
- (A) 31 RU486 是一種黃體素的拮抗劑，下列敘述何者正確？
(A)通常可使用於懷孕6 週內之人工流產 (B)單獨使用的效果及成功率都最高
(C)建議婦女服藥後應嚴格禁食 (D)其主要作用是穩定子宮內膜
- (D) 32 具有早產之高危險性孕婦，應教導其自行注意早產跡象。下列注意事項何項正確？
(A)雙側乳房有脹痛感，應立即到院
(B)偶發性之肩部酸痛，是早產之跡象
(C)每日監測宮縮，正常狀態下每小時應有5 次以上宮縮
(D)陰道分泌物增加，並帶有血液之分泌物
- (C) 33 江太太妊娠28 週時發現有部分性前置胎盤。目前江太太妊娠36 週，發現陰道有少量鮮血流出，到院求診但陰道未再有出血。則下列處置何者正確？
(A)到院後應先以陰道指診，以確認江太太是否已進入產程
(B)應立即準備江太太接受剖腹生產
(C)先以腹部超音波檢查胎盤著床位置，再決定後續處置
(D)先輸500 c.c.濃縮紅血球，再給予黃體素安定子宮內膜
- (A) 34 下列何項感染疾病之婦女不適宜哺餵母乳？
(A)HIV (+) 陽性 (B)B 型肝炎帶原
(C)B 群鏈球菌感染 (D)流行性感冒病毒感染
- (C) 35 有關妊娠糖尿病的照護原則，下列何者正確？
(A)若飲食及運動無法有效控制血糖，則須建議醫師給予口服降血糖藥
(B)定時定量均衡飲食，不可進食碳水化合物
(C)每日應有規律運動，以有效控制飲食能量的消耗
(D)每日所需的飲食量及熱量，應較正常妊娠婦女多

- (A) 36 有關無壓力試驗 (Nonstress Test, NST) 之敘述, 下列何者正確?
(A)建議使用時間為第三妊娠期, 測量較準確
(B)檢測母體身體活動與胎心音變化關係
(C)反應型表示胎兒處於睡眠狀態
(D)不反應型表示母體內血糖值過高
- (A) 37 王太太是高危險妊娠婦女, 依照醫護人員之指示, 定期接受產前檢查, 且遵守傳統的民俗保護措施不移動床鋪, 不在床上剪東西, 及保留一些與受孕有關之吉祥物, 此為Rubin 所提孕婦心理發展任務中的那一項?
(A)確保自己及胎兒在懷孕和分娩過程中能安全順利 (B)確保家人接受新生兒
(C)與胎兒建立親密關係 (D)付出自己
- (D) 38 婦女執行下列那一項措施, 可以加強骨盆底的肌肉並預防壓力性尿失禁?
(A)食用高纖維的食物, 避免便秘增加腹壓 (B)每日大便後執行溫水坐浴, 以減輕腫脹
(C)減少飲水量, 以免尿量過多 (D)經常做凱格爾式運動 (Kegel's exercise)
- (B) 39 有關根治性女陰切除術的護理措施, 下列何者錯誤?
(A)注意評估有否Homan's sign (B)個案開始進食後, 應教導採高渣飲食
(C)需每天清洗傷口 (D)鼓勵增加攝水量, 避免便秘
- (C) 40 有關不孕症婦女的評估及檢查的敘述, 下列何者正確?
(A)基礎體溫的高溫期多於14 天可能是黃體功能不全
(B)有甲狀腺功能低下症可能導致泌乳激素過低症而不孕
(C)有泌乳素過高症者可能造成不排卵
(D)停止服用口服避孕藥四年後, 仍可能造成不孕
- (C) 41 曉華6 個月, 因腹瀉入院接受治療, 醫囑予2/3 奶, 奶粉沖泡指示說明為一匙泡60 c.c., 現沖泡2/3 奶, 一匙可泡多少c.c.牛奶?
(A) 40 c.c. (B) 75 c.c. (C) 90 c.c. (D) 120 c.c.
- (A) 42 有關兒童對疾病概念的敘述, 下列何者正確?
(A) 2~4 歲兒童會認定與生病時間相近, 但與疾病不相關的外在現象, 為其生病的原因
(B) 4~6 歲的兒童認為不接觸生病的人就可以預防疾病
(C) 7~9 歲兒童認為生病是因為器官功能不良或不具功能
(D) 10~12 歲的兒童了解心理反應和態度會影響健康與疾病
- (A) 43 預防嬰兒機動車輛事故傷害, 嬰兒座椅放置位置之敘述, 下列何者正確?
(A)置於汽車後座中央, 面向車尾 (B)置於汽車前座右側, 面向車頭
(C)置於汽車前座右側, 面向車尾 (D)置於汽車後座左側, 面向車頭
- (C) 44 李小弟體重10 公斤, 不慎燙傷, 評估為二度燒傷, 燒傷面積為20%, 醫囑24 小時內緊急給予靜脈輸液800 c.c., 下列輸注原則, 何者正確?
(A) 800 c.c. 平均在24 小時輸注, 每分鐘34 微滴
(B)最初12 小時輸入總量的2/3 為533 c.c., 第二個12 小時輸入總量的1/3 為267 c.c.
(C)最初8 小時輸入總量的1/2 為400 c.c., 第二及第三個8 小時, 分別輸入200 c.c.
(D)最初6 小時輸入總量的1/2 為400 c.c., 第二個6 小時輸入200 c.c., 餘200 c.c. 在12 小時內輸畢
- (D) 45 有關新生兒心肺復甦術的敘述, 下列何者錯誤?
(A)按壓方式: 以食指與中指同時垂直下壓1.25~2.5 公分
(B)按壓位置: 兩乳頭連線下胸骨處
(C)按壓速率: 每分鐘120 次
(D)按壓與呼吸之比為5:2

- (D) 46 有關新生兒生殖系統發展的敘述，下列何者錯誤？
(A)因母體荷爾蒙的影響，在出生2 至3 天內會有乳房腫脹現象
(B)出生1 週內分泌類似乳汁的物質，會自然消失
(C)因出生後母體荷爾蒙中斷，造成出生第1 週的女嬰可能會有假月經
(D)早產兒陰莖及陰囊發育不完全，龜頭突出於包皮外
- (D) 47 有關早產兒的臨床表徵，下列何者錯誤？
(A)女嬰陰蒂及小陰唇大而突出 (B)男嬰陰囊小且無皺褶
(C)皮膚薄且透明，腹部可見靜脈血管 (D)胎脂少，腳底皺褶多
- (D) 48 有關兒童使用集尿袋收集尿液標本的敘述，下列何者錯誤？
(A)收集小女孩尿液標本前，須先以肥皂及清水由上往下將會陰部清洗乾淨
(B)集尿袋黏貼處，應保持乾燥，並黏貼牢固，以免漏出
(C)集尿袋黏貼時，應先黏會陰處，再向上黏至恥骨聯合處
(D)收集小男孩尿液標本，只要將陰莖放入集尿袋中即可
- (D) 49 小美9 歲，目前就讀國小三年級，下列何者不符合她現階段的認知發展特徵？
(A)性別恆定觀 (B)質量守恆概念 (C)可逆性思考 (D)抽象思考能力
- (B) 50 依我國2007 年預防接種時程表，1 歲以內的正常嬰兒還不能接種下列何種疫苗？
(A)流行性感冒b 型嗜血桿菌疫苗 (B)水痘疫苗
(C)肺炎雙球菌疫苗 (D)流行性感冒疫苗
- (A) 51 陳小弟4 歲，常用手抓屁股，疑有蟯蟲感染，有關蟯蟲蟲卵檢體收集的時間，下列何者正確？
(A)清晨起床時 (B)清晨排便後 (C)清晨解尿後 (D)晚上睡覺前
- (A) 52 兒童生命徵象的測量，最好的順序是：
(A)呼吸→脈搏→血壓→體溫 (B)體溫→脈搏→呼吸→血壓
(C)脈搏→呼吸→血壓→體溫 (D)血壓→體溫→脈搏→呼吸
- (A) 53 有關兒童“慢性病”的定義，下列何者正確？
(A)日常功能受影響的時間每年至少3 個月 (B)日常功能受影響的時間每年至少6 個月
(C)住院時間每年至少4 個月 (D)住院時間每年至少6 個月
- (B) 54 江小弟6 歲，被診斷為破傷風而住院治療，江小弟可能出現下列何種臨床表徵？
(A)意識情況改變 (B)張口困難、下頷骨緊閉 (C)肢體麻痺 (D)皮膚出現瘀斑
- (B) 55 高膽紅素血症的新生兒於換血治療前，會投予何種物質，以促進血管外的膽紅素進入血液內，提高換血效果？
(A) 10% 葡萄糖溶液 (B) 25% 白蛋白溶液 (C) γ 免疫球蛋白 (D) 乳酸林格氏液
- (C) 56 護理人員發現林小弟呼吸困難、發紺，抽血檢查動脈血液氣體分析，下列結果何者顯示有呼吸衰竭現象？
(A) PaO_2 為80 mmHg， PaCO_2 為40 mmHg，pH：7.35
(B) PaO_2 為90 mmHg， PaCO_2 為35 mmHg，pH：7.40
(C) PaO_2 為40 mmHg， PaCO_2 為80 mmHg，pH：7.30
(D) PaO_2 為60 mmHg， PaCO_2 為40 mmHg，pH：7.45
- (A) 57 有關臨終病童的生理變化，下列何者錯誤？
(A)心跳快且弱 (B)陳施氏呼吸 (Cheyne-Stokes Respiration)
(C)血壓下降 (D)對光敏感
- (A) 58 照顧一位糖尿病母親的嬰兒時，護理人員需要注意那些低血糖徵兆？①嗜睡 ②呼吸暫停 ③末梢水腫 ④發紺 ⑤解綠便
(A)①②④ (B)①③⑤ (C)②③⑤ (D)②④⑤

- (D) 59 罹患「川崎氏病 (Kawasaki Disease)」的病童會呈現下列何種症狀？
(A)持續發燒3 天以上及軀幹皮膚出疹 (B)自臉部開始至軀幹、四肢之順序脫皮
(C)手掌及腳底泛紅，起水泡 (D)眼結膜充血、草莓狀舌
- (A) 60 陳小弟因為腮腺炎而合併發生病毒性腦膜炎，有關疾病照護與預後之敘述，下列何者正確？
(A)陳小弟3~5 天後就會痊癒，很少會有不良後遺症
(B)預後很差，可能留下聽力、視力、智力等障礙的後遺症
(C)容易再併發敗血性休克，宜給予強效抗生素
(D)家中其他小孩亦應該每天持續給藥，作為預防性治療
- (C) 61 有關兒童慢性中耳炎的敘述，下列何者錯誤？
(A)嬰幼兒較易罹患中耳炎的原因是因耳咽管短、寬，且水平
(B)學前兒童因咽扁桃腺肥大，增生快速易鼻塞而致感染中耳炎
(C)鼓勵病童臥向健側，避免患側受壓疼痛
(D)給予流質飲食，避免需咀嚼之食物
- (C) 62 陳小弟5 歲，有關接受扁桃腺切除手術的敘述，下列何者正確？
(A)術後1 週內持續的輕微發燒是正常現象
(B)鼓勵兒童深呼吸及咳嗽，以排除痰液
(C)術後2 週內暫時不要游泳
(D)避免吃冰涼的流質食物
- (D) 63 罹患氣喘的王小弟，經診斷過敏原為塵蟎，其居家環境的設施，何者不適宜？
(A)使用百葉窗 (B)採用大理石地板
(C)使用空氣清淨設備 (D)使用草蓆與榻榻米
- (B) 64 小方罹患完全性大動脈轉位 (Transposition of the Great Arteries)，按醫囑給予前列腺素E1 (Prostaglandin E1)，其主要的目的為何？
(A)促使動脈導管的關閉 (B)提高體循環的含氧飽和度
(C)改善肺水腫的情形 (D)減少下肢靜脈血液回流
- (B) 65 下列屬於左向右分流的先天性心臟病為何？①PDA ②TOF ③ASD ④TGA
(A)①② (B)①③ (C)③④ (D)②④
- (A) 66 法洛氏四重畸形不包括下列那一項？
(A)心房中隔缺損 (B)肺動脈狹窄 (C)右心室肥大 (D)主動脈跨位
- (B) 67 有關血友病 (Hemophilia) 病童出血控制的護理措施，下列何者錯誤？
(A)出血患處加壓固定不動 (B)出血部位給予熱敷
(C)出血部位需抬高超過心臟高度 (D)靜脈注射其所缺乏之凝血因子
- (A) 68 下列那一種血液疾病會造成血管阻塞危機 (Vaso-occlusive crisis)、脾臟阻斷危機 (Splenic sequestration crisis)、再生不良危機 (Aplastic crisis)？
(A)鎌狀細胞貧血 (Sickle cell anemia) (B)再生不良性貧血 (Aplastic anemia)
(C) β 型-海洋性貧血 (β -Thalassemia) (D)血友病 (Hemophilia)
- (B) 69 罹患第1 型糖尿病 (Type I diabetes) 的小明在早上7 點時，出現冒冷汗、發抖、頭痛的現象，此時護理人員應該採取什麼措施？
(A)鼓勵小明下床活動 (B)先監測小明的血糖值，再讓他進食
(C)讓小明喝熱開水 (D)協助小明注射短效胰島素
- (B) 70 小明罹患慢性腎衰竭，因尿毒霜沈積導致皮膚搔癢，下列護理指導何者正確？
(A)以消毒水洗澡 (B)以清水洗澡後塗擦乳液
(C)以酒精拍拭 (D)以肥皂洗澡

- (A) 71 副甲狀腺功能低下 (Hypoparathyroidism) 的兒童，不會出現下列那一種臨床表徵？
(A)骨質疏鬆 (B)低血鈣 (C)痙攣 (D)肌肉無力
- (D) 72 4 歲的圓圓因持續發燒及牙齦出血入院，診斷為急性淋巴性白血病，下列那一種結果可以確定其診斷？
(A)血液中白血球數量2 萬/mm³
(B)血液中的尿酸值上升
(C)腦脊髓液呈混濁，壓力上升，葡萄糖減少
(D)骨髓中胚芽細胞 (blast) 占90%
- (D) 73 小蘋現年1 歲，因腹脹、腹痛厲害，解出像草莓醬般的大便而入院求治，上述症狀是下列何種腸道疾病的臨床表徵？
(A)霍亂 (Cholera) (B)痢疾 (Dysentery)
(C)巨結腸症 (Megacolon) (D)腸套疊 (Intussusception)
- (D) 74 有關膽道閉鎖 (Biliary atresia) 之敘述，下列何者正確？
(A)肝內膽管阻塞最好的治療是外科手術
(B)病童呈現黃綠色的皮膚，大便逐漸變褐色
(C)新生兒出生即呈現嚴重的黃疸
(D)病童尿液呈現暗茶色
- (C) 75 有關急性腎絲球腎炎 (Acute glomerulonephritis) 的敘述，下列何者錯誤？
(A)此病通常在A 群 β 型溶血性鏈球菌感染後，1~3 週急性發作
(B)會呈現血尿、蛋白尿及高血壓等症狀
(C)建議多喝柳丁汁、葡萄柚汁，可酸化尿液，補充鉀離子
(D)急性期必須臥床休息，直至無血尿且水腫消退為止
- (D) 76 兒童輕、中、重度脫水的評定，是以下列何種項目為依據？
(A)輸出入量的不平衡程度 (B)體溫增高度數
(C)皮膚彈性度 (D)體重減輕程度
- (A) 77 手足徐動型 (athetoid type) 腦性麻痺的病童，其主要的護理重點是：
(A)給予容易吞嚥的食物 (B)增強下肢肌肉的收縮力量
(C)維持呼吸道通暢 (D)防止壓瘡的產生
- (A) 78 下列何者是嬰兒期顱內壓升高的症狀？①頭圍異常增大 ②哭聲尖銳 ③前囟門凹陷 ④血壓下 ⑤落日眼 ⑥脈搏加快
(A)①②⑤ (B)①④⑥ (C)②③⑤ (D)③④⑥
- (A) 79 4 歲小宇，有癲癇的病史，且已服用Phenytoin (Dilantin) 3 年，下列何者為長期服用此藥最重要的護理指導？
(A)做牙床按摩以減緩牙齦增生
(B)每日用試紙測尿蛋白，以監測腎功能
(C)避免跑步，以減少關節出血、疼痛
(D)宜採低鉀飲食，以減少心律不整的發生
- (B) 80 有關兒童骨骼特徵的敘述，下列何者正確？
(A)骨的癒合速度和兒童的年齡成正比，重製必究！
(B)骨骺板的生長速度受生長素的控制
(C)新生嬰兒的骨髓腔內含有脂肪，稱為黃骨髓
(D)成長中的兒童骨骼比成人堅硬