

《產兒科護理學》

- (D) 1 一般胎兒的枕下前囟徑為幾公分？
(A) 12.5 公分 (B) 12 公分 (C) 11 公分 (D) 9.5 公分
- (C) 2 陳小姐28 歲，在月經前一週感覺精神不佳，易怒且有偏頭痛情形，月經來臨後症狀就緩解改善，最正確的護理評估結果為何？
(A)子宮內膜炎 (B)子宮內膜異位 (C)經前症候群 (D)精神官能症
- (B) 3 細菌性陰道炎的常見致病原為：
(A)披衣菌 (B)金黃色葡萄球菌 (C)白色念珠菌 (D)陰道滴蟲
- (B) 4 下列那種前置胎盤孕婦，陰道生產仍為優先選擇之生產方式？
(A)邊緣性前置胎盤 (B)低位性前置胎盤
(C)部分性前置胎盤 (D)完全性前置胎盤
- (B) 5 糖尿病母親所生的新生兒，最容易發生下列何種問題？
(A)體溫調節困難 (B)產生低血糖 (C)受到感染 (D)氣胸
- (C) 6 產後於恥骨聯合上方約5 公分觸診到一小球的彈性組織感覺，且扣診為頓音，最可能是下列何者？
(A)收縮的子宮底 (B)胎盤殘餘組織
(C)膀胱脹滿尿液 (D)惡露凝結聚積
- (B) 7 當產婦於產後發生子宮收縮弛緩時，護士應採取何項護理措施？
(A)鼓勵多攝取水分 (B)按摩子宮 (C)給予口服PARLODEL 藥物 (D)鼓勵臥床休息
- (D) 8 陰道內診無法獲得下列何項資料？
(A)子宮頸變薄程度 (B)子宮頸擴張程度
(C)胎兒下降高度 (D)胎兒頭臀長度
- (D) 9 丁太太使用催產素引產，以每小時9c.c.靜脈滴注，胎兒監視器顯示胎心音早期減速，此時最合宜之措施為何？
(A)停止催產素 (B)給予氧氣
(C)準備剖腹產 (D)密切觀察，不需特殊處理
- (B) 10 有關妊娠週數與子宮底高度的敘述，下列何者正確？
(A)第一妊娠期子宮底高度尚在骨盆腔內，無法由腹部觸摸到
(B)妊娠20~24 週宮底高度約在臍平處
(C)妊娠28~32 週宮底高度達到最高
(D)第二妊娠期經產婦易因胎頭降入骨盆腔，宮底高度隨之降低
- (B) 11 遺傳諮詢過程的第一個步驟應該是下列何者？
(A)特殊診斷 (B)瞭解家族史 (C)產前檢查 (D)婚前檢查
- (B) 12 使婦女子宮黏膜產生清澈透明液體的主要荷爾蒙為：
(A)黃體素 (Progesterone) (B)雌性素 (Estrogen)
(C)前列腺素 (Prostaglandin) (D)濾泡促激素 (Follicle-stimulating hormone)
- (A) 13 下列何者為待產婦之異常症狀與徵象？
(A)宮縮持續時間超過90 秒
(B)子宮口全開已經1.5 小時，但是胎兒尚未娩出
(C)子宮頸口開9 公分，但是待產婦有向下用力的感覺
(D)子宮口全開，宮縮時用力胎頭會下降，但間歇期胎頭卻又內縮

- (D) 14 巫太太為B 型肝炎帶原者，其表面 (HbsAg) 及核心 (HbeAg) 抗原均為陽性反應，為避免巫太太的新生兒垂直感染B 型肝炎，下列敘述何者正確？
(A)不宜哺餵母乳，並於出生後立即注射第一劑B 型肝炎疫苗
(B)不宜哺餵母乳，並於出生後立即注射一劑B 型肝炎免疫球蛋白
(C)應採母乳哺餵，並於出生後立即注射第一劑B 型肝炎疫苗
(D)應採母乳哺餵，並於出生後立即注射一劑B 型肝炎免疫球蛋白
- (D) 15 張太太G1 P0 妊娠30 週，於診所測得之體重較上次產檢增加1 公斤，血壓值為160/100 mmHg，醫師診斷為子癩前症，下列何項症狀符合張太太之診斷？
(A)蛋白尿試紙測試為陰性 (B)僅腳掌有水腫情形
(C)有陣攣性痙攣 (D)測肱二頭肌反射評分為+3
- (D) 16 新生兒先天性代謝疾病篩檢項目中，下列何項檢查不受出生日數及進食狀況的限制，並可由臍帶血中測得正確之結果判讀？
(A)先天性甲狀腺低功能症 (B)苯酮尿症
(C)半乳糖血症 (D)葡萄糖-六-磷酸鹽脫氫酶缺乏症 (俗稱蠶豆症)
- (A) 17 有關骨盆腔炎的敘述，下列何項正確？
(A)85%的骨盆腔炎是經由性病感染 (B)主要致病原是白色念珠菌
(C)肺結核菌經由淋巴管上行至生殖器官 (D)診斷方法是以超音波或放射線為準
- (A) 18 張太太血清中德國麻疹抗體的效價為1：128，下列相關敘述何者正確？
(A)張太太具有免疫力
(B)效價不足，若妊娠末期感染德國麻疹胎兒易有先天性畸形
(C)第三妊娠期感染，不管效價高低均建議放棄胎兒
(D)張太太不具免疫力，應立即接受疫苗注射
- (B) 19 胎盤早期剝離與前置胎盤之鑑別性特徵比較，下列胎盤早期剝離之敘述，何者正確？
(A)腹部較少疼痛表現
(B)腹部觸診呈現如木板狀的堅硬
(C)陰道易有大量出血現象
(D)胎心音不會隨子宮灌流減少而改變
- (B) 20 江太太38 歲，G1 P0 ，妊娠16 週時接受羊膜穿刺術檢查，發現胎兒為血友病患。有關胎兒狀況之敘述，下列何者正確？
(A)血友病為基因突變，因江太太為高齡妊娠婦
(B)血友病為性聯遺傳，每胎得病之機率是固定的
(C)血友病為體染色體顯性遺傳，江太太必為血友病患
(D)血友病為體染色體隱性遺傳，江姓夫婦皆有血友病基因
- (A) 21 鄭小姐G1 P1 產後第二天，採母嬰同室，剛剛餵過奶，鄭小姐上過廁所後臥床休息，新生兒睜著眼，爸爸微笑凝視緊抱著並小聲對他說話，下列何種護理人員態度最合宜？
(A)爸爸能共同參與新生兒的親密互動，是很好的開始
(B)新生兒最好有固定的照顧者，讓媽媽來照顧就可以了
(C)爸爸抱的姿勢有問題，為了新生兒的安全，最好放回床上
(D)新生兒吃飽該睡了，就讓他安靜的躺下睡覺吧
- (A) 22 林小弟出生第一天，媽媽發現林小弟臉上及手臂上有膿疱，下列敘述何者錯誤？
(A)膿疱通常是由於新生兒感染金黃色葡萄球菌所造成
(B)膿疱破裂會形成厚、濕、黃色的痂
(C)膿疱須依醫囑使用抗生素藥膏局部治療
(D)治療約10~14 天可痊癒

- (C) 23 有關胎便的敘述，下列何者錯誤？
(A)胎便主要是由上皮細胞、膽汁、胰液和腸道分泌物、胎毛以及胎兒吞下的羊水所組成
(B)胎兒腸道中的胎便正常是不會排出的，若缺氧則會使肛門括約肌鬆弛而將胎便排到羊水中
(C)新生兒出生後6小時內無法排胎便則須做進一步評估
(D)新生兒出生後，柏油狀、黏性的胎便解出會持續2~3天
- (B) 24 魯賓 (Rubin) 認為產後那一期，產婦會將注意力轉至新生兒，並主動學習照顧新生兒？
(A)接受期 (Taking-in Phase)：產後2~3天
(B)緊執期 (Taking-hold Phase)：產後3~10天
(C)放手期 (Letting-go Phase)：產後10天至3個月
(D)恢復期 (Recovery Phase)：產後3個月以後
- (A) 25 有關避孕針劑的原理，下列敘述何者錯誤？
(A)利用高劑量的動情素 (B)抑制下視丘-腦下垂體軸的功能
(C)干擾精卵的運送 (D)干擾子宮內膜的發育
- (B) 26 有關母乳的敘述，下列何者錯誤？
(A)初乳含有免疫球蛋白IgA (B)前乳脂肪含量是後乳的2~3倍
(C)初乳對新生兒有輕瀉作用 (D)母乳中長鏈多元不飽和脂肪酸較配方奶粉高
- (B) 27 待產婦因低張性子宮功能收縮不良而接受剖腹產手術，手術後應優先注意下列何項？
(A)腸胃蠕動情形 (B)子宮收縮情形 (C)尿瀦流情形 (D)傷口疼痛情形
- (B) 28 第二產程時，對產婦使用傳統生產檯的適當安置及照顧，下列敘述何者錯誤？
(A)頭部抬高30至60度，以枕頭或支持者協助支撐產婦的頭及背部
(B)勿使用腳凳，以免導致產後血栓性靜脈炎
(C)隨時都要有人陪伴產婦
(D)覆蓋產婦身體，只露出會陰
- (D) 29 夏太太因破水至產房診視，有關測試破水之敘述，下列何者正確？
(A)使用nitrazine試紙測試，如破水會變成紅色
(B)使用nitrazine試紙測試，如破水會變成黃色
(C)臨床上較常使用Rubin test
(D)羊齒試驗必須在顯微鏡下觀看，呈現羊齒狀代表已破水
- (D) 30 護理人員評估第三妊娠期的準父親出現下列何種行為時，表示其最可能有適應不良的情形？
(A)擔心自己在太太生產時無法提供合適的支持 (B)購買新生兒用物
(C)擔心自己無法成為好爸爸 (D)懷疑這個孩子不是他的
- (D) 31 林女士，懷孕38週，因子宮規則收縮入院待產，護士詢問她的妊娠史，她回答說生過二胎，4週時人工流產一次，第二胎是雙胞胎，則她的孕產史應記為：
(A)G5 P3 A1 (B)G3 P2 A1
(C)G4 P3 A1 (D)G4 P2 A1
- (A) 32 王小姐，22歲，孕前身高170cm，體重60kg，目前懷孕20週，體重為64kg。她告訴護理人員覺得自己變太胖，決定要減重。護理人員的回應何者較適當？
(A)體重剛好，不需減重 (B)體重增加太多，現在要減重
(C)體重過重，但產後再減 (D)體重增加不足，可增重
- (C) 33 不孕症婦女治療中發生卵巢過度刺激症候群的護理措施，下列何者錯誤？
(A)評估有否下腹部悶痛及少尿等現象 (B)需每天測量體重與腹圍
(C)臥床時下肢勿超過心臟高度 (D)採低鈉高蛋白飲食

(B) 34 孫小姐第一胎，出院前詢問護理人員新生兒一個月內要如何以感官刺激，以利新生兒發展，下列建議何者錯誤？

- (A) 新生兒偏愛黑白對比色，你可以選黑白色吊飾給他看
 (B) 新生兒有遠視，在1公尺以外還看得清楚
 (C) 新生兒有聽的能力，你可以多與他說話
 (D) 新生兒有皮膚觸覺刺激的需要，可以多擁抱及按摩

(B) 35 下列何者表示待產婦有心臟衰竭的前兆？①脈搏>100次/分 ②脈搏<60次/分 ③呼吸速率>24次/分 ④呼吸速率<10次/分 ⑤呼吸困難 ⑥痙攣 ⑦血小板計數減少 ⑧視力模糊
 (A) ①⑤⑧ (B) ①③⑤ (C) ②④⑥ (D) ②⑦⑧

情況：腦下垂體分泌之荷爾蒙，分別為：①濾泡促激素 (FSH) ②黃體促激素 (LH) ③泌乳激素 (Prolactin) ④促甲狀腺素 (TSH) ⑤腎上腺皮質激素 (Adrenotropin) ⑥催產激素 (Oxytocin) ⑦升壓素 (Vasopressin)。依此回答第36題至第37題。

(C) 36 作用於乳腺並能促進乳汁分泌之相關荷爾蒙為：

- (A) ①② (B) ③④ (C) ③⑥ (D) ⑥⑦

(B) 37 影響母親的代謝而滋養胎兒生長的荷爾蒙為：

- (A) ①② (B) ④⑤ (C) ⑤⑦ (D) ②④

情況：李太太G1 P1，很有哺餵母乳的意願，依此回答第38題至第40題。

(A) 38 當李太太問及回家後要如何判斷寶寶吃母乳的量是否足夠時，下列何者為護理人員的正確指導？

- (A) 平均每2~4小時需餵食1次，平均一天餵8次
 (B) 每次餵奶都有少量之大便
 (C) 每次吸吮5分鐘後就安靜睡著了
 (D) 寶寶體重每月至少增加0.2公斤以上

(B) 39 護理人員教導李太太哺餵母乳正確的方法，以避免乳頭疼痛與破皮，下列何者正確？

- (A) 拉長哺餵時間，減少乳頭刺激
 (B) 常更換抱持姿勢，減少造成吸吮點固定而破皮
 (C) 餵奶時若感乳頭疼痛，立即移出乳頭，減少乳頭刺激
 (D) 餵奶前後以酒精消毒乳頭，以保持清潔乾燥

(B) 40 如果李太太想在母乳哺餵6個月後斷奶(離奶)，應如何提供衛教？

- (A) 每天攝取2000~3000c.c.生麥芽水 (B) 避免如熱敷、乳房按摩等刺激乳房之措施
 (C) 離奶前一週開始不要哺餵母乳或擠奶 (D) 若有乳房疼痛情形，可服用止痛劑緩解

(C) 41 有關燒傷兒童復健期返家之護理指導，下列何者不適當？

- (A) 藉由正確的姿勢、夾板固定或運動訓練，預防肢體攣縮
 (B) 已癒合的表層燒傷植皮區，需防日曬，沐浴後以乳液擦拭
 (C) 燒傷的幼兒在傷口癒合後，應24小時穿戴彈性衣，抑制疤痕增生
 (D) 鼓勵家中成員、同儕探視燒傷的兒童，協助其接受新的身體心像

(A) 42 王小妹今年6歲，由媽媽送至醫院急診就診，媽媽主訴王小妹騎腳踏車不慎，摔下來撞到頭。護理人員發現王小妹身上多處瘀傷，臀部及大腿有新舊不一的燙傷。下列護理過程何者不恰當？

- (A) 立即採取隔離保護措施，避免王小妹的媽媽接近王小妹
 (B) 詢問王小妹受傷的時間、地點及事情發生的經過
 (C) 評估王小妹的身心發展及行為態度
 (D) 24小時內向主管機關報備

- (D) 43 有關嬰幼兒呼吸系統的敘述，下列何者錯誤？
(A) 嬰兒喉部與淋巴組織數量較成人多，呼吸道感染時容易有充血、水腫、聲音沙啞等症狀
(B) 嬰幼兒的歐氏管（耳咽管）較成人短、寬且直，故易引發中耳炎
(C) 嬰幼兒的胸腔小，呼吸肌肉尚未成熟，因而呼吸力量較薄弱，呼吸深度較成人表淺
(D) 嬰幼兒會厭軟骨所占的比例比成人小，柔軟且無彈性，易形成呼吸道阻塞
- (D) 44 兒童鉛中毒時，下列那一個系統功能受損最為嚴重？
(A) 腎臟 (B) 血液 (C) 呼吸 (D) 中樞神經
- (B) 45 嬰幼兒的大便訓練通常是在何時完成？
(A) 半歲 (B) 1 歲半 (C) 2 歲半 (D) 3 歲半
- (C) 46 依據艾瑞克森（Erikson）理論，4 歲孩童的發展處於何種階段？
(A) 自主性對羞恥與懷疑（autonomy versus shame and doubt）
(B) 認同感對角色混淆（identity versus role confusion）
(C) 進取性對罪惡感（initiative versus guilt）
(D) 勤奮對自卑（industry versus inferiority）
- (D) 47 小華3 歲因肺炎住院，給予口服藥時，小華拒絕，並大叫「不要！不要！」，下列何項護理措施最合宜？
(A) 請母親協助約束小華，再予灌藥 (B) 告知小華不吃藥就要打針
(C) 告知小華不吃藥就不能回家 (D) 給予小華選擇，要自己服藥或讓母親協助餵藥
- (D) 48 下列何者不是阿帕嘉計分系統（Apgar score system）評分之項目？
(A) 心跳速率 (B) 呼吸狀況 (C) 膚色 (D) 哭泣聲音
- (A) 49 學步期兒童之遊戲特點是：
(A) 平行遊戲 (B) 獨自遊戲 (C) 聯合遊戲 (D) 合作遊戲
- (C) 50 依照丹佛II 嬰幼兒發展篩檢，百分之九十滿4 個月大的嬰兒，其發展應可完成下列何者？
(A) 從臥位拉兒童坐起時，頭不會向後倒 (B) 會發出單音
(C) 會注意自己的手 (D) 能伸手抓物
- (D) 51 新生兒敗血症（Neonatal sepsis）早期的臨床表徵為何？①體溫過高或過低 ②呼吸暫停 ③黃疸 ④嗜睡 ⑤抽搐
(A) ①③⑤ (B) ②③④ (C) ②④⑤ (D) ①②④
- (D) 52 張小弟，4 歲，因肺炎住院一週，接受許多侵入性的檢查及治療，看到醫護人員就感到害怕。此時護理人員進行治療性遊戲之目的為何？
(A) 向張小弟說明其疾病發生的原因 (B) 向張小弟解釋治療檢查的必要性
(C) 評估張小弟的生長發育狀況 (D) 藉由遊戲過程紓解張小弟的害怕情緒
- (B) 53 小慧，12 歲，患有幼年型糖尿病，已開始接受胰島素治療，下列何種情形容易引發酮酸中毒？
(A) 運動量過於劇烈 (B) 發燒、感染 (C) 胰島素注射過量 (D) 正餐的時間延後
- (D) 54 呼吸道窘迫症候群（Respiratory distress syndrome）是因新生兒體內缺乏何種物質？
(A) 黃體素（Progesterone） (B) 睪固酮（Testosterone）
(C) 前列腺素（Prostaglandin） (D) 表面張力素（Surfactant）
- (B) 55 一位妊娠42 週診斷為胎便吸入症候群（Meconium aspiration syndrome）的新生兒，會出現下列何種表徵？
(A) 腸蠕動減少、腹脹 (B) 呼吸窘迫 (C) 過度興奮、抽搐 (D) 體溫不穩
- (D) 56 新生兒因高膽紅素血症接受照光治療，下列何者不是照光時可能產生的副作用？
(A) 綠色軟便 (B) 脫水 (C) 體溫不穩定 (D) 角弓反張

- (D) 57 早產兒因生理機能尚未成熟所引發的合併症，不包括下列何者？
(A)視網膜病變 (B)腦室內出血 (C)開放性動導管 (D)胎便吸入症候群
- (A) 58 按照行政院衛生署疾病管制局之預防接種時間表，15 個月的幼兒應接受下列何項預防注射？
(A)日本腦炎疫苗 (B)小兒麻痺口服疫苗
(C)A 型肝炎疫苗 (D)B 型肝炎疫苗
- (C) 59 克沙奇病毒 (Coxsackie Virus) 的傳播途徑為何？①血液感染 ②呼吸道分泌物 ③糞口途徑 ④病媒傳播
(A)①② (B)①④ (C)②③ (D)②④
- (C) 60 有關氣喘病童居家照護的指導內容，下列何者正確？
(A)家中使用羽毛被、毛毯 (B)採用布質窗簾
(C)運動種類宜以有氧運動為主 (D)運動過程中，隨時補充水分，並以口呼吸
- (C) 61 為兒童進行呼吸系統評估時，聽到喉鳴音 (Stridor)，可能的原因為何？
(A)小孩常有的喉部吵雜音，長大就會自然改善 (B)氣喘即將發作的前兆
(C)上呼吸道發炎或有異物阻塞的情形 (D)呼吸道中有含水分多的分泌物
- (C) 62 兒童充血性心衰竭的症狀不包括那些？①心搏過速 ②呼吸急促 ③心臟擴大 ④高血壓 ⑤肝臟腫大 ⑥低血鉀
(A)①② (B)③⑤ (C)④⑥ (D)②③
- (A) 63 小玲，1 歲半，因心室中隔缺損 (Ventricular Septal Defect)，入院接受心導管檢查，有關護理人員提供之術後護理措施，下列何者錯誤？
(A)情況穩定前，每30 分鐘評估生命徵象一次，心搏速率須測量至少30 秒
(B)以砂袋加壓2~4 小時以止血，並觀察穿刺部位敷料上有無出血現象
(C)導管插入部位的遠端脈搏，必須與另一肢體作對稱性的比較
(D)觀察及比較兩側肢體對稱部位之膚色及溫度
- (D) 64 下列那一種先天性心臟病會引起杵狀指及紅血球增生的情形？
(A)開放性動脈導管 (Patent Ductus Arteriosus；PDA)
(B)心房中隔缺損 (Atrial Septal Defect；ASD)
(C)主動脈狹窄 (Coarctation of Aorta；COA)
(D)法洛氏四重症 (Tetralogy of Fallot；TOF)
- (BD) 65 有關 β 型海洋性貧血 (β -Thalassemia) 的敘述，下列何者錯誤？
(A)屬體染色體隱性遺傳的一種溶血性貧血的疾病
(B)通常在出生後1 年時，會出現貧血現象，如：臉色蒼白、容易疲倦、頭暈等
(C)患童的脾臟因紅血球的破壞而增大，為降低紅血球的破壞可考慮作脾臟切除手術
(D)為預防因血液中過多的鐵質沈著而造成患童器官受損，可服用排鐵劑如 deferoxamine (Desferal)
- (D) 66 有關再生不良性貧血 (Aplastic Anemia) 之敘述，下列何者錯誤？
(A)不可以使用 Aspirin 退燒 (B)仔細觀察皮膚、尿液、糞便有無出血現象
(C)當白血球下降時，需採嚴密的保護隔離 (D)血小板有代償性增生情形
- (B) 67 有關絕對嗜中性白血球 (absolute neutrophil count；ANC) 的敘述，下列何者正確？
(A)ANC 是確立白血病緩解與否之重要依據，需大於500/mm³ 才理想
(B)ANC 數目計算方法是 WBC 數目乘以成熟及未成熟的嗜中性白血球 (segs+bands) 的總百分比
(C)ANC 數目計算方法是 WBC 數目乘以淋巴球 (lymphocytes) 所占百分比
(D)ANC 數目會隨著孩童年齡的增加而自然增高

- (B) 68 珊珊8 歲，診斷為第1 型糖尿病 (type 1 DM)，過去一個月會有下列何種臨床表徵？
(A)精力旺盛，活動增加 (B)常覺得口渴，大量飲水 (C)體重明顯上升 (D)食慾變差
- (C) 69 有關罹患半乳糖血症 (Galactosemia) 新生兒的敘述，下列何者錯誤？
(A)是一種體染色體隱性遺傳疾病
(B)檢驗血液與尿液，發現含有高量的半乳糖
(C)只能哺餵母乳，禁餵牛奶或一般配方奶粉
(D)未及時治療會造成智力受損、視覺感覺障礙及生長遲滯
- (C) 70 小芳今年 5 歲，因發燒、疲倦、刷牙時牙齦出血來院就診，血液檢查呈現血紅素10.6 gm/dL、白血球18000/mm³，血小板31000/mm³，經骨髓穿刺檢查，確定為急性淋巴性白血病，隨後開始緩解誘導的化學治療，下列護理措施何者正確？
(A)預防感染、治療期間禁止所有訪客
(B)避免活動造成出血、採絕對臥床休息
(C)使用軟毛牙刷或棉棒作口腔清潔
(D)建議多補充蓮霧、芭樂、草莓、棗子等新鮮水果
- (D) 71 君君6 歲，罹患神經性尿崩症，目前接受血管收縮素 (DDAVP) 治療，有關出院的居家照顧，需指導家屬注意觀察之藥物過量的症狀，不包括下列何者？
(A)頭痛 (B)噁心 (C)嘔吐 (D)多尿
- (D) 72 6 個月大的嬰兒患有胃食道逆流，對其父母的護理指導，下列何者正確？
(A)暫停哺餵母乳 (B)兩餐之間，多餵食果汁
(C)進食後，嬰兒宜採左側臥 (D)鼓勵及早餵食半流體軟質食物，如麥片糊
- (B) 73 安安9 個月大，因為尿路感染而住院。經檢查後確認為膀胱輸尿管逆流 (vesicoureteral reflux) 第二級，有關檢查結果，護理人員如何向母親解說較適當？
(A)安安的情況只有極輕度逆流，約在1 歲左右可以自行改善
(B)安安的情況可以在適當的抗生素治療及預防尿路感染的措施下改善
(C)安安的情況需要進一步外科處理，但是預後通常都很良好
(D)安安的情況並不是造成尿路感染的主要原因
- (D) 74 唇腭裂修補手術，一般認為最好在兒童2 歲以前完成，其最主要考量的原因為何？
(A)避免影響牙齒排列與發育 (B)可進食固體食物，避免影響生長
(C)避免嗆奶，以降低吸入性肺炎的機率 (D)避免影響發音學習和語言的發展
- (B) 75 陳小弟6 個月，體重8 公斤，因腹瀉入院治療，護理人員評估其臨床表徵，發現其體重現為7.3 公斤、黏膜乾燥、皮膚彈性差、尿量減少，則其脫水程度應屬：
(A)輕度 (B)中度 (C)重度 (D)極重度
- (B) 76 下列何者不是兒童脊柱側彎 (scoliosis) 的徵象？
(A)彎腰時，背部可見到單側突出 (B)兩側手腳之粗細有顯著差異
(C)站立時，兩邊髖部及肩部高度不同 (D)會有背痛不適的主訴
- (A) 77 有關脊髓脊膜膨出 (myelomeningocele) 嬰兒的護理措施，下列何者錯誤？
(A)每日量腹圍 (B)協助嬰兒側臥或垂頭俯臥
(C)以無菌生理食鹽水、綿布敷蓋於膨出囊上 (D)提供嬰兒被動性運動及視聽覺刺激
- (D) 78 小偉8 歲，突然全身性強直—陣攣性發作，診斷為癲癇，醫囑服用抗癲癇藥物，小偉的母親非常擔心小偉的病情及安全。護理人員的指導，下列何者正確？
(A)小偉使用抗癲癇藥物期間可控制病情，不會再發作，故可放心
(B)癲癇會突然發作而發生危險，故不可讓小偉參與戶外活動
(C)癲癇病童通常會合併智能障礙的問題，故在課業上不宜對小偉有所要求
(D)規律服用抗癲癇藥物對小偉很重要，不可突然停藥

- (A) 79 1 歲的小明因股骨骨折，以布萊安特氏 (Bryant) 牽引器牽引，下列敘述何者正確？
- (A) 髖關節屈曲 90° ，臀部微離床面，兩腳向上做牽引
 - (B) 患肢和身體呈直角向上牽引，健肢採舒適臥位
 - (C) 平躺，患肢用外固定器固定後向下牽引
 - (D) 側躺，將患肢固定以砂袋向下牽引
- (B) 80 下列何者為臺灣地區最常見的氣喘過敏原？
- (A) 花粉 (B) 塵蟎 (C) 海鮮 (D) 病毒

高
點
·
建
國

【版權所有，重製必究！】