

# 《內外科護理學概要》

- (A) 1 下列何種癲癇發作後會出現托特氏麻痺 (Todd's paralysis) ?  
(A)運動發作 (B)強直陣攣性發作 (C)失神性發作 (D)複雜性部分發作
- (D) 2 有關洗腎病人動靜脈瘻管的護理指導,下列何者錯誤?  
(A)手術側避免佩戴飾品 (B)手術側避免提重物  
(C)每天須檢查血管通暢性 (D)動靜脈瘻管可抽血,但不可注射藥物
- (A) 3 病人接受開顱手術後,為預防顱內壓上升,應避免下列何項活動?  
(A)等長運動 (B)圓木翻身法  
(C)分散護理活動 (D)助病人移向床頭時,請病人呼氣
- (C) 4 有關糖尿病的診斷標準,下列何者正確? ①出現多喝、多尿與不預期的體重減輕症狀 ②葡萄糖耐受試驗1小時後血糖值超過200 mg/dL ③禁食超過8小時以上,血糖值超過126 mg/dL ④隨機血糖值超過200 mg/dL ⑤糖化血色素 (HbA<sub>1c</sub>) 低於7%  
(A)①②③ (B)①②④ (C)①③④ (D)②④⑤
- (B) 5 通常接受化學治療後多久,病人會開始脫髮?  
(A)1 週內 (B)2~3 週 (C)6~8 週 (D)半年後
- (C) 6 下列何者是糖尿病人失明最主要的原因?  
(A)視神經傳導障礙 (B)眼壓持續上升 (C)視網膜病變 (D)虹彩增生病變
- (B) 7 全身性紅斑性狼瘡病人,接受脈衝式藥物治療的藥物指導,下列何者錯誤?  
(A)注意感染徵象 (B)口服藥物宜於餐前服用  
(C)鼓勵食用高鈣和低鈉飲食 (D)停藥時,應採漸進式停藥
- (C) 8 有關結腸鏡檢查之護理措施,下列何者錯誤?  
(A)檢查前2天,需採用低渣飲食 (B)檢查當天需禁早餐  
(C)檢查中,病人採截石術姿位 (D)檢查後,需觀察有無出血、腹脹現象
- (C) 9 有關「去大腦僵直姿勢 (decerebrate rigidity)」的主要特徵,下列何者正確?  
(A)上肢屈曲,下肢伸展,足部外旋 (B)上肢伸展,下肢屈曲,足部內旋  
(C)上肢伸展,下肢伸展,足部內旋 (D)上肢屈曲,下肢屈曲,足部外旋
- (B) 10 脊髓損傷病人發生自主神經過度反射 (autonomic dysreflexia) 現象時之護理措施,下列何者正確?  
(A)協助病人平躺 (B)找出刺激源並移除  
(C)給與大量點滴補充 (D)停止所有藥物使用
- (A) 11 有關暫時缺血性發作 (TIA) 之敘述,下列何者錯誤?  
(A)所有中風之病人,均會有此經歷 (B)是一種可回復性的神經功能障礙  
(C)可持續數秒至24 小時之久 (D)主因暫時性、局部性之腦部缺血現象所造成
- (D) 12 有關上腸胃道內視鏡檢查前準備與檢查後護理,下列何者錯誤?  
(A)檢查前禁食6~8 小時,並取得同意書  
(B)檢查前給與Atropine,以減少唾液分泌  
(C)檢查前使用喉部局部麻醉劑,以抑制作嘔反射  
(D)檢查後禁食6~8 小時,即可開始嘗試喝水
- (C) 13 下列何種型態之肝炎病毒必須與B 型肝炎病毒共生?  
(A)A 型 (B)C 型 (C)D 型 (D)E 型

- (A) 14 重症肌無力病人的護理措施，下列何者正確？  
(A)教導病人下巴朝向胸部時，才進行吞嚥動作  
(B)觀察病人是否發生藥物劑量過量而發生「肌無力危象 (myasthenic crisis)」  
(C)觀察病人是否發生腹部抽筋及便秘之「膽鹼激素危象 (cholinergic crisis)」  
(D)教導病人可能須長期服用高劑量之腎上腺皮質類固醇，以維持日常生活之活動
- (C) 15 手術後傷口感染容易導致下列何種疝氣？  
(A)股疝氣 (B)臍疝氣 (C)切口疝氣 (D)絞扼性疝氣
- (A) 16 指導病人回家自我照顧肩部人字形石膏的方法，下列何者正確？  
(A)石膏外表弄髒時，可用濕布擦乾淨 (B)石膏有斷裂現象時，可用寬膠布貼起來  
(C)石膏弄濕時，可用烤燈或吹風機加速吹乾 (D)抓住石膏橫把以協助翻身
- (D) 17 下列敘述何者顯示胃食道逆流 (GERD) 病人對護理指導已有正確的了解？  
(A)「吃完飯後，我最好躺下來休息。」  
(B)「就寢前喝熱牛奶，以幫助睡眠。」  
(C)「我可以穿緊一點的衣服，來控制食量。」  
(D)「我最好將床頭抬高15~20 公分左右。」
- (B) 18 有關上石膏病人的護理措施，下列何者錯誤？  
(A)注意肢體感覺的變化 (B)鼓勵執行等張運動  
(C)定時評估膚色 (D)鼓勵多攝取纖維食物
- (A) 19 有關巴金森氏症病人症狀的敘述，下列何者正確？  
(A)震顫常伴有大拇指對手指的「搓藥丸 (pill-rolling) 動作」  
(B)多數個案變成失智症 (dementia)  
(C)剛開始走路時，兩腿僵硬  
(D)病情惡化時，說話變快且大聲
- (D) 20 下列何者不會降低肝昏迷病人的血清氨濃度？  
(A)給與Lactulose藥物治療 (B)限制蛋白質攝取量 (C)避免便秘 (D)限制水分攝取
- (A) 21 下列何者是引發心肌梗塞病人呈現心因性休克的原因？  
(A)心臟收縮力減少 (B)感染導致心輸出量減少  
(C)全身循環血流量減少 (D)低容積導致心輸出量減少
- (A) 22 下列何者是慢性胃炎導致胃癌的原因？  
(A)胃部萎縮性改變 (B)胃酸分泌過多 (C)胃黏膜屏障受損 (D)長期慢性炎症
- (D) 23 有關全胃切除手術後，出現惡性貧血合併症之機轉，下列何者正確？  
(A)胃酸分泌減少 (B)胃蛋白酶分泌減少 (C)迷走神經刺激降低 (D)內在因子分泌減少
- (B) 24 下列何者不是接受全髖關節置換術後發生脫位的徵象？  
(A)疼痛度增加 (B)患肢變長 (C)患肢內外旋 (D)活動度降低
- (C) 25 有關幽門螺旋桿菌感染導致消化性潰瘍之確立性診斷檢查，下列何者錯誤？  
(A)胃鏡組織切片檢查 (B)尿素呼氣試驗 (urea breath test)  
(C)上腸胃道攝影術 (D)血清抗體IgG 檢測
- (D) 26 護理人員建議骨質疏鬆症病人在補充鈣質時，宜同時補充下列何者？  
(A)維生素A (B)維生素B (C)維生素C (D)維生素D
- (C) 27 有關腔隙症候群 (compartment syndrome) 的敘述，下列何者錯誤？  
(A)是嚴重的骨折合併症 (B)主因為出血及水腫的壓迫  
(C)骨切開術可緩解症狀 (D)不作處理，會導致肢體功能喪失
- (B) 28 下列何者不是心肌梗塞病人活動前的適當措施？  
(A)服用硝化甘油 (NTG) (B)飲用酒精 (C)前戲愛撫 (D)溫水淋浴

- (C) 29 使用柺杖輔助行走時，下列何者正確？  
(A)以柺杖支撐身體重量  
(B)柺杖手把的位置，宜使肘部保持屈曲 $15^{\circ}$   
(C)柺杖的長度是站立時腋下2~3 指幅至地面垂直長度  
(D)宜穿著拖鞋，以方便穿脫
- (D) 30 有關脂肪栓塞的臨床表徵，下列何者錯誤？  
(A)呼吸困難 (B)呼吸過速 (C)瘀斑性的皮膚疹 (D)心搏過慢
- (C) 31 有關慢性中耳炎行乳突手術的術後護理指導，下列何者正確？  
(A)術後幾日出現顏面神經麻痺是正常現象  
(B)敷料移除後即可正常洗頭及搭飛機外出旅遊  
(C)術後幾週應避免彎腰、提重物及擤鼻涕  
(D)應以高聲說話的方式，增進溝通
- (B) 32 有關白內障的敘述，下列何者正確？  
(A)因眼內壓異常上升而造成 (B)使用眼底鏡檢查紅光反射扭曲或消失  
(C)出現視力模糊、眼睛疼痛症狀 (D)囊內白內障摘除術是主要治療方式
- (A) 33 有關扁桃腺切除術後之護理指導，下列何者錯誤？  
(A)指導病人冰敷兩側上頸部72 小時，以減輕疼痛及止血  
(B)指導病人每日數次以溫涼的生理食鹽水漱口  
(C)指導病人24 小時後，可開始進食冰冷流質飲食  
(D)指導病人勿用力咳嗽，以防出血
- (B) 34 有關青光眼的臨床表徵，下列何者正確？①眼睛疼痛 ②虹彩光圈視覺 ③閃光幻視 ④周邊視野消失 ⑤視野出現浮動的黑點  
(A)①②③ (B)①②④ (C)②③④ (D)③④⑤
- (C) 35 接受全喉切除術的病人於術後不會喪失下列那種身體功能？  
(A)原有呼吸氣道 (B)正常發聲 (C)味覺 (D)嗅覺
- (A) 36 有關心絞痛臨床表徵的敘述，下列何者錯誤？  
(A)休息時胸痛加劇 (B)運動時胸痛加劇  
(C)激動時胸痛加劇 (D)疲勞時胸痛加劇
- (B) 37 高血壓病人較適合攝取下列何種食物？  
(A)煙燻香腸 (B)西瓜切片 (C)榨菜麵湯 (D)乳酪蛋糕
- (D) 38 下列何者不是腹主動脈瘤破裂的典型臨床表徵？  
(A)腹部腫塊 (B)後背疼痛 (C)血壓下降 (D)尿量增加
- (A) 39 接受鈣離子拮抗劑Adalat (nifedipine) 治療的病人應隨時監測下列那一項變化？  
(A)血壓 (B)尿量 (C)視力 (D)聽力
- (D) 40 下列何者是導致長期接受靜脈輸液病人發生靜脈血栓的主要原因？  
(A)凝血作用增強 (B)靜脈管徑變粗 (C)靜脈血流停滯 (D)靜脈管壁受損
- (B) 41 下列何種脂蛋白具有預防冠狀動脈疾病的功能？  
(A)乳糜微粒 (B)高密度脂蛋白 (C)低密度脂蛋白 (D)極低密度脂蛋白
- (D) 42 鉍 $^{201}\text{TI}$  心肌閃爍圖測試前，下列何者病人需暫停食用？  
(A)海鮮 (B)肉類 (C)牛奶 (D)咖啡
- (C) 43 降低飲食中脂肪的含量，有助於減少下列何種癌症的產生？  
(A)腦癌 (B)胃癌 (C)結腸癌 (D)肝癌
- (D) 44 下列何者對放射線治療最敏感？  
(A)橫紋肌 (B)神經 (C)軟骨 (D)骨髓

- (A) 45 有關缺鐵性貧血之敘述，下列何者正確？  
(A)病因包括胃腸道出血和潰瘍性結腸炎  
(B)又稱為惡性貧血  
(C)血液檢查發現平均血球容積 (MCV) 及全鐵結合能力 (TIBC) 都增加  
(D)常見的症狀為湯匙狀指甲、皮膚瘀斑
- (B) 46 有關慢性阻塞性肺疾病病人使用氧氣療法之敘述，下列何者正確？  
(A)給與FiO<sub>2</sub> 60% 氧氣 (B)維持SaO<sub>2</sub> 大於90%  
(C)使用氧氣流量6 L/min (D)維持PaCO<sub>2</sub> 於35 mmHg
- (A) 47 有關結核菌素皮膚試驗結果之判讀，下列何者正確？  
(A)應記錄皮膚下硬結的直徑大小 (B)應在注射後48 至72 小時之間記錄1次  
(C)皮膚發紅直徑大於2 公分，稱為陽性反應 (D)陽性反應之病人須立即接受呼吸道隔離
- (D) 48 下列那項檢查結果最能代表腎功能狀態？  
(A)尿液分析 (B)血尿素氮 (C)血清肌酸酐 (D)肌酸酐清除率
- (B) 49 有關氣喘的檢查數據，下列何者錯誤？  
(A)尖峰吐氣流速 (PEFR) 下降 (B)功能肺餘容積 (FRC) 下降  
(C)持續惡化時，二氧化碳分壓 (PaCO<sub>2</sub>) 增加 (D)過敏性氣喘會出現嗜伊紅性白血球增加
- (C) 50 有關副甲狀腺功能低下之敘述，下列何者正確？  
(A)因高血鈣出現Chvostek's 徵象，導致肌肉痙攣  
(B)因低血磷出現Trousseau's 徵象，導致手指顫抖  
(C)因急性抽搐，導致咬傷舌頭及呼吸道阻塞  
(D)因身體出現酸中毒，導致手足抽搐症狀惡化
- (A) 51 疑似子宮頸癌病人表示擔心陰道內診檢查，下列回應何者適當？  
(A)「能告訴我您現在的想法嗎？」  
(B)「您不必害怕，每一個人都像您一樣，都會感到不舒服。」  
(C)「您不是擔心醫生的技術吧？您的醫生可是位專家呢！」  
(D)「我們保證會降低您的困窘。」
- (B) 52 有關嚴重腎絞痛的生理反應，下列何者錯誤？  
(A)疼痛輻射至陰囊 (B)持續性悶痛 (C)蒼白 (D)盜汗
- (D) 53 有關甲狀腺功能低下病人之護理措施，下列何者正確？  
(A)採集中護理，密切監測體溫過高和高血壓情況  
(B)鼓勵病人白天少活動，儘可能臥床休息，以免受傷  
(C)採少量多餐的高熱量、高蛋白及高脂肪飲食，以免體重減輕  
(D)病人服用甲狀腺製劑時，要觀察有無心絞痛、呼吸困難等症狀
- (A) 54 有關腎移植病人居家生活預防感染的措施，下列何者錯誤？  
(A)手術後3個月內避免日曬 (B)保持規律排便習慣  
(C)避免接觸生病的親友 (D)注意口腔衛生
- (B) 55 有關尿液收集的敘述，下列何者錯誤？  
(A)若是男病人，需請個案排尿時，將包皮向上拉起  
(B)尿液標本只能在清晨收集  
(C)收集12 小時或24 小時尿液時，需保存於冰箱中  
(D)尿液分析要取中段尿，以減少微生物污染
- (A) 56 收集痰液標本時，若病人無法順利咳出痰液，下列何者是最適當且簡易的輔助方式？  
(A)採高坐臥式，行有效咳嗽 (B)給與氧氣  
(C)立即給與口鼻的抽吸 (D)給與喉部的熱敷

- (D) 57 下列激素中，何者不是由腦下垂體前葉分泌？  
(A)生長激素 (B)泌乳激素 (C)促甲狀腺素 (D)抗利尿激素
- (B) 58 下列何者為酸化尿液的食物？  
(A)牛奶 (B)蔓越莓汁 (C)茶 (D)橘子
- (A) 59 下列何者可以移除泌尿道結石？  
(A)泌尿道內視鏡檢查 (B)尿路動力學檢查 (C)膀胱超音波 (D)尿道攝影術
- (D) 60 有關改良型乳房根除術的敘述，下列何者錯誤？  
(A)此手術將切除全部的乳房組織  
(B)此手術將清除腋下淋巴結  
(C)可保留大部分肩關節運動功能  
(D)術後患側肢體一定會發生嚴重的淋巴水腫
- (A) 61 「只要打噴嚏，褲底就濕濕的」，此現象為下列何種尿失禁？  
(A)壓力性尿失禁 (B)急迫性尿失禁 (C)溢出性尿失禁 (D)心理性尿失禁
- (A) 62 有關愛迪生危機的特徵，下列何者正確？  
(A)高血鉀 (B)高血壓 (C)高血糖 (D)體溫持續過高
- (C) 63 下列那一項不是類風濕性關節炎之診斷標準？  
(A)發生對稱性的關節腫脹 (B)關節X光顯示關節間隙變窄  
(C)連續1星期的早晨出現關節僵硬的情形 (D)切片顯示滑膜細胞與絨毛組織增生
- (B) 64 急性腎衰竭少尿期病人的臨床表徵，下列何者正確？①高血鉀 ②低血磷 ③代謝性鹼中毒  
④低血鈉  
(A)①② (B)①④ (C)②③ (D)③④
- (D) 65 有關燒傷病人的護理指導，下列何者錯誤？  
(A)水療可幫助軟化焦痂 (B)水療時，室溫宜維持26.6~29.4℃  
(C)鼓勵在水療池運動肢體 (D)水療時間愈長，復健效果愈佳
- (A) 66 有關止血帶止血法的敘述，下列何者正確？  
(A)適用於四肢大出血 (B)止血帶是大出血的首選止血法  
(C)止血帶最好綁在出血傷口上，效果佳 (D)止血帶止血應每隔30~40分鐘放鬆30秒
- (B) 67 有關原發性醛固酮過多症之臨床表徵，下列何者正確？  
(A)低血鈉 (B)低血鉀 (C)低血容積 (D)代謝性酸中毒
- (D) 68 有關注射penicillin引發蕁麻疹之敘述，下列何者正確？  
(A)屬於細胞毒性過敏反應 (B)其過敏反應物質和濕疹性及接觸性皮膚炎相同  
(C)會出現亞都司氏反應 (Arthus reaction) (D)屬於IgE所引發之過敏反應
- (A) 69 使用帕克蘭公式 (Parkland formula) 計算燒傷病人的輸液補充量，下列敘述何者正確？①使用乳酸林格氏液來做急救 ②燒傷後第2個8小時給輸液總量的1/4 ③燒傷後第1個24小時給與葡萄糖水2000 mL ④燒傷後第1個24小時需給與膠體 ⑤輸液計算公式為  $4 \text{ c.c.} \times \text{kg (體重)} \times \% \text{BSA}$   
(A)①②⑤ (B)①③④ (C)①③⑤ (D)②③④
- (C) 70 有關肺葉切除術後之護理措施，下列何者錯誤？  
(A)抬高床頭30~40度，促進通氣 (B)鼓勵採用腹式呼吸，預防肺擴張不全  
(C)側臥向患側，促進胸腔引流 (D)協助執行肩部運動，預防關節黏滯
- (B) 71 有關鼻出血的處置，下列何者錯誤？  
(A)平躺且床頭抬高 (B)坐下且頭部往後仰 (C)冷敷鼻部及額頭 (D)坐著且臉部朝下
- (A) 72 下列何者是造成院內感染肺炎最常見的革蘭氏陰性菌？  
(A)綠膿桿菌 (B)金黃色葡萄球菌 (C)肺炎鏈球菌 (D)嗜血性感冒桿菌

- (B) 73 施救者發現溺水獲救者，其呼吸停止但仍有心跳，下列處置何者正確？  
(A)開始進行人工呼吸及心外按摩 (B)作人工呼吸直到溺水者能自行呼吸  
(C)進行哈姆立克急救法，將水壓擠出來 (D)不斷搖動溺水者，刺激其自行呼吸
- (D) 74 心臟移植後出現急性排斥反應之臨床處置，下列何者正確？  
(A)立即手術取出植入的心臟  
(B)併用cyclosporin A，以抑制IL-3 作用  
(C)使用類固醇，以增加抗體的形成  
(D)使用FK506 (tacrolimus)，以抑制T細胞生長因子的產生
- (B) 75 發生代償性休克時，身體會有下列那些變化？①血壓上升或趨於正常 ②心輸出量下降 ③呼吸加快 ④心跳減慢  
(A)①② (B)①③ (C)②④ (D)③④
- (C) 76 有關病人執行支氣管鏡檢查前後的護理措施，下列何者正確？  
(A)檢查前1 小時，給與 $\beta_2$  支氣管擴張劑，可促進氣管擴張  
(B)檢查中，醫師注射2% Xylocaine，可避免聲帶移動  
(C)檢查後，需待嘔吐反射恢復之後，病人才可以進食  
(D)檢查後，若痰中出現血絲，應立即告知醫師，請其開立止血劑
- (B) 77 有關黴菌引起的皮膚傳染病，下列何者是由家中寵物傳染而來？  
(A)髮癬 (B)體癬 (C)股癬 (D)足癬
- (C) 78 有關右肺張力性氣胸護理評估之敘述，下列何者正確？  
(A)右胸燒灼性鈍痛 (B)右肺之擴張度大於左肺  
(C)叩診右邊胸部，會出現過度反響音 (D)聽診右邊胸部，會出現喘鳴音
- (AB) 79 下列何項為診斷全身性紅斑性狼瘡 (SLE) 的重要指標？  
(A)抗DNA 抗體 (B)抗核性抗體 (ANA)  
(C)全血球計數 (CBC) (D)血清中補體和蛋白
- (B) 80 有關類風濕性關節炎之敘述，下列何者正確？  
(A)男性發病率為女性之3 倍  
(B)紅血球沉降速率 (ESR) 於疾病活動期升高  
(C)約75% 病人血清中可查出IgA 類風濕因子  
(D)關節受侵犯通常呈多發性、非對稱性之型態

【版權所有，重製必究！】