

# 《內外科護理學概要》

- (A) 1 有關自發性氣胸 (Spontaneous pneumothorax) 的敘述，下列何者正確？  
(A)因肋膜表面下之肺泡破裂所致 (B)會造成縱膈腔移位  
(C)好發於15 歲以下男性 (D)會影響循環的功能
- (C) 2 下列何者為多發性硬化症 (multiple sclerosis；MS) 的主要治療目標？  
(A)找出病因 (B)減少感染 (C)減輕症狀 (D)治癒疾病
- (B) 3 下列何者不是巴金森氏症的三大主要病徵？  
(A)震顫 (B)流涎 (C)僵直 (D)運動不能
- (B) 4 病患之格拉斯哥 (GCS) 昏迷指數為9 分 (E4M3V2)，其會有下列何種反應？  
(A)對叫喚才能睜開眼睛 (B)發出難以理解的聲音  
(C)能正確算出100 減7 的答案 (D)對痛刺激，肢體會出現異常的伸張姿勢
- (A) 5 病人因癲癇持續發作時，首要之處置為何？  
(A)評估呼吸狀況 (B)給予注射抗痙攣藥物，如Valium  
(C)給予抗癲癇藥物，如Dilantin (D)抽血檢查電解質
- (B) 6 照顧有吞嚥困難的偏癱病患，下列護理措施何者正確？  
(A)儘量與病患說話，以集中注意力 (B)將食物置放在病患健側口腔內  
(C)在病患下巴兩側撫摸肌肉，助其張開嘴巴 (D)請病患將頭部後仰，以防止肺部吸入食物
- (A) 7 臨床上，為預防暫時性缺血症 (TIA) 進展為腦血管意外，常使用下列何種藥物？  
(A)抗凝血劑 (B)利尿劑 (C)鈣離子阻斷劑 (D)巴比妥酸鹽 (barbiturates)
- (A) 8 有關核磁共振攝影的護理指導，下列何者正確？  
(A)協助病患移除身上的金屬物品，如：項鍊、手錶、耳環、胸罩等  
(B)檢查中，勿與病患說話，直到做完檢查為止  
(C)提醒病患在檢查前8 小時，不可以吃東西  
(D)提醒病患在檢查前，應喝約2,000 c.c.的水分
- (B) 9 有關顱內動脈瘤的護理措施，下列何者錯誤？  
(A)降低疼痛、減輕焦慮 (B)鼓勵多下床活動  
(C)提供安靜、無壓力環境 (D)提供軟便劑，以預防便秘
- (B) 10 下列何者為胃潰瘍病患常見之疼痛主訴？  
(A)「肚子餓的時候疼痛發作」 (B)「吃了東西之後痛得更厲害」  
(C)「半夜常常因為胃痛而醒來」 (D)「吃了東西後胃痛就好多了」
- (A) 11 有關消化性潰瘍致病因素之敘述，下列何者正確？  
(A)幽門螺旋桿菌感染 (B)迷走神經活動受抑制  
(C)抽菸引起胃細胞通透性增加 (D)服用aspirin 降低胃黏膜細胞再生能力
- (A) 12 有關消化系統檢查之護理措施，下列何者錯誤？  
(A)鼻胃管抽吸量過多時，應注意病人產生代謝性酸中毒  
(B)肝昏迷病人應監測ammonia 之變化，重製必究！  
(C)急性胰臟炎病人應監測amylase 之變化  
(D)急性上腸胃道出血病人應監測Hct 之變化
- (A) 13 下列何種荷爾蒙與肝硬化病患的腹水有關？  
(A) Aldosterone (B) Estrogen (C) Prolactin (D) Testosterone

- (D) 14 有關腹水的評估方法，下列何項較不準確？  
(A)量腹圍 (B)測體重 (C)叩診腹部有轉移性濁音 (D)記錄輸出入量
- (A) 15 有關消化系統檢查之護理措施，下列敘述何者正確？  
(A)接受經皮穿肝膽道攝影檢查前，應瞭解病人之過敏史  
(B)為緩解病人腹痛，接受上腸胃道攝影檢查前，可繼續給予止痛劑  
(C)胃鏡檢查結束後，告知病人可立即進食  
(D)大腸鏡檢查前，教導病人正常進食
- (B) 16 有關病毒性肝炎的預防重點，下列何者最正確？  
(A) A 型：登錄帶原者 (B) B 型：篩檢捐血者  
(C) C 型：注射疫苗 (D) D 型：監督水源供應
- (A) 17 有關直腸腫瘤手術前後之護理措施，下列何者錯誤？  
(A)術前予靜脈注射neomycin (B)術前三天採低渣及清流飲食  
(C)結腸造瘻灌洗時，灌洗桶內裝500~1000 c.c.溫水 (D)術後教導避免產氣或腹瀉的食物
- (C) 18 下背疼痛患者穿著腰薦區硬背架的目的為何？  
(A)預防骨折發生 (B)減輕急性疼痛 (C)強化背部支持構造 (D)預防發炎症狀
- (B) 19 有關骨骼牽引的護理措施，下列何者正確？  
(A)每日攝取水分1000~1500 c.c. (B)確定秤錘從滑輪自由的垂下  
(C)不可改變臥位，以免影響牽引的力量 (D)牽引過程中每小時需休息10 分鐘
- (B) 20 有關全髖關節置換手術後的出院前護理指導，下列何者錯誤？  
(A)每天做適當運動 (B)選用較低的馬桶座  
(C)坐下時，保持患肢外展 (D)多喝水、攝取低脂肪高纖維食物
- (C) 21 下列何者不是骨折的合併症？  
(A)動脈損傷 (B)感染 (C)低血氧 (D)脂肪栓塞
- (C) 22 因過度伸展造成肌肉拉傷的立即處置，下列何者錯誤？  
(A)給予局部冰敷 (B)抬高受傷部位 (C)協助按摩及關節活動 (D)使用夾板固定
- (D) 23 膝上截肢手術後之出院指導，下列何者錯誤？  
(A)維持適當體重 (B)定時俯臥 (C)教導彈繃殘肢包紮方法 (D)定時用水清洗義肢
- (C) 24 有關白內障接受囊外摘除術之術後護理指導，下列何者正確？  
(A)術後眼睛出現黑影或視力改變是正常現象  
(B)除睡覺，術後一個月內白天皆須戴金屬眼罩  
(C)術後不可以彎腰洗頭，避免咳嗽及用力解便  
(D)術後一星期即可搭飛機出國做長途旅行
- (D) 25 有關鼻咽癌病人接受放射線治療的護理活動，下列何者正確？①鼓勵其張口至最大程度，多做口腔運動 ②照射部位皮膚需加強清潔 ③提供堅果類食物加強其咀嚼功能 ④鼓勵其多進食含水分的食物  
(A)①② (B)②③ (C)③④ (D)①④
- (A) 26 有關扁桃腺切除術後之護理指導，下列何者正確？  
(A)冰敷兩側上頸部，以減輕疼痛及止血 (B)若感覺血水流入咽喉，應持續吞嚥  
(C)應用力咳嗽，以預防呼吸道感染 (D)指導病人24 小時後，可開始進食溫熱流質飲食
- (C) 27 下列何者是全喉切除手術後，最優先的護理措施？  
(A)支托頸部 (B)監測出血情形 (C)維持呼吸道通暢 (D)緩解術後疼痛
- (D) 28 下列何者不是罹患青光眼的危險因子？  
(A)高血壓 (B)嚴重近視 (C)青光眼遺傳史 (D)輻射光傷眼

- (D) 29 下列何者不會造成休克？  
(A)血液與體液流失 (B)心輸出量減少 (C)組織灌流量不足 (D)末梢血管收縮
- (B) 30 有關高血壓病患長期口服利尿劑的居家照護指導，下列何者正確？  
(A)每天監測體重 (B)每天測量血壓  
(C)每週收集尿液送檢 (D)每月測量動脈血液氣體分析
- (D) 31 下列何種患者應避免與手機基地台為鄰？  
(A)行動脈繞道手術者 (B)瓣膜置換術者  
(C)長期服用抗凝血劑者 (D)裝置人工心跳節律器者
- (C) 32 下肢動脈血管阻塞疾病病人會出現何種特徵？  
(A)進食冰冷的食物後，下肢疼痛加劇 (B)平躺且下肢抬高時，下肢疼痛加劇  
(C)步行時下肢疼痛，休息時疼痛消失 (D)抽菸時下肢疼痛，戒菸後疼痛消失
- (C) 33 心臟移植之器官最好來自下列何者？  
(A)配偶 (B)父母 (C)雙胞胎 (D)子女
- (C) 34 暴露在寒冷的環境中會導致心絞痛的病理機轉為何？  
(A)動脈血壓下降 (B)心輸出量下降 (C)心肌的需氧量增加 (D)腎上腺素分泌增加
- (D) 35 病人看到心臟手術傷口，驚叫：「我的傷口怎麼這麼可怕！我會好嗎？」，下列何種回應適宜？  
(A)「當你穿上衣服，就沒人知道你有動過手術。」  
(B)「你想和其他病人聊聊嗎？他們與你一樣但復原很迅速。」  
(C)「不要想太多，你很快就恢復了！」  
(D)「這次手術突然改變你的外觀，你很震驚吧？」
- (C) 36 下列何者對於放射線治療的敏感度最差？  
(A)位於分裂期的細胞 (B)含氧量較高的細胞  
(C)分化良好的細胞 (D)血液供應豐富的細胞
- (A) 37 癌症病患接受化學治療，出現骨髓抑制的副作用，下列護理措施，何者錯誤？  
(A)告知絕對臥床，以防自發性出血 (B)教導使用軟毛牙刷，以免牙齦出血  
(C)給予軟便藥物，以免便秘 (D)教導避免使用aspirin 或灌腸，以免出血
- (C) 38 肝素 (Heparin) 治療，應定期監測下列何者？  
(A) BUN (B) RBC (C) PTT (D) WBC
- (A) 39 使用Oncovin 治療不慎發生藥物外滲時，下列護理措施何者錯誤？  
(A)立即停止藥物注射，並拔除針頭套管 (cannula)  
(B)儘快抽取皮下小疱中藥物及組織液  
(C)局部注射類固醇及生理食鹽水  
(D)於滲漏部位局部熱敷
- (C) 40 有關瀰漫性血管內凝血 (DIC) 的血液檢查結果，下列何者錯誤？  
(A)凝血酶原時間 (PT) 延長  
(B)血小板數減少  
(C)纖維蛋白分解物 (FDP) 降低  
(D)纖維蛋白原濃度 (fibrinogen level) 降低
- (C) 41 有關癌症預防方法之敘述，下列何者錯誤？  
(A)攝取低脂飲食 (B)減少抽菸行為或戒菸  
(C)避免攝取十字花科類蔬菜 (D)定期自我健康檢查
- (B) 42 腫瘤標記AFP 主要用來篩選下列何種腫瘤？  
(A)腦癌 (B)肝癌 (C)胃癌 (D)結腸癌

- (C) 43 有關蜂窩組織炎的敘述，下列何者錯誤？  
(A)因細菌侵犯至真皮及皮下組織而造成 (B)若形成膿瘍，需做切開術或清瘡處理  
(C)只要患部塗抹抗生素藥膏即有療效 (D)衛教患者多臥床休息，患部可冷敷
- (A) 44 有關帶狀疱疹的敘述，下列何者正確？  
(A)免疫受抑制者為高危險群 (B)水疱常出現於身體中線兩側  
(C)水疱結痂掉落後，患者會有神經痛 (D)持續使用抗生素兩星期後即可根治
- (D) 45 有關皮膚癌的敘述，下列何者錯誤？  
(A)紫外線曝曬過量，容易造成皮膚癌 (B)皮膚癌易發生於合成黑色素速度慢者  
(C)惡性黑色素癌轉移快，致死率最高 (D)鱗狀細胞癌最常見，且通常不轉移
- (B) 46 病患因火災造成前軀幹、右手及會陰部全部燒傷，依據「九法則」計算，其燒傷範圍為何？  
(A) 18% (B) 28% (C) 36% (D) 45%
- (D) 47 病患於腎臟移植後18小時，出現發燒及全身不適的情形，是屬於下列何種排斥反應？  
(A)慢性 (B)急性 (C)亞急性 (D)超急性
- (A) 48 有關過敏性休克反應之敘述，下列何者正確？  
(A)接受碘顯影劑檢查患者，可能會發生 (B)此類過敏反應的主要抗體為IgG  
(C)輸血溶血反應為主要的臨床病例 (D)主要參與反應的細胞為嗜酸性細胞
- (D) 49 有關室內環境控制以降低空氣中過敏原之敘述，下列何者正確？  
(A)定期噴灑殺蟲劑 (B)地板採用短毛地毯  
(C)選購羽毛製的枕頭 (D)選購木製材質的玩具
- (B) 50 器官移植後發生慢性排斥反應，與下列何者有關？  
(A) T 細胞 (B) B 細胞 (C) 巨噬細胞 (D) 單核球
- (A) 51 類風濕性關節炎病患受侵犯之關節，何時最易發生僵硬情形？  
(A)清晨起床時 (B)外出散步後 (C)泡澡沐浴後 (D)晚上睡覺前
- (D) 52 護理愛滋病患者時，在下列何種情況下不需戴手套？  
(A)抽血 (B)注射 (C)倒便盆 (D)擁抱患者
- (A) 53 有關胸腔X光檢查之敘述，下列何者錯誤？  
(A)於病人吐氣後閉氣時照相 (B)需取下頸胸部之金屬物品  
(C)常採用後前照 (PA view) (D)可協助判斷胸腔結構組織變化
- (B) 54 動脈血液氣體分析時，下列何者是判斷肺泡換氣的最佳指標？  
(A)PaO<sub>2</sub> (B)PaCO<sub>2</sub> (C)HCO<sub>3</sub><sup>-</sup> (D)pH
- (C) 55 下列何者不是肺結核的傳染途徑？  
(A)排泄物傳染 (B)食具傳染 (C)血液傳染 (D)飛沫傳染
- (BD) 56 有關拔除胸管的敘述，下列何者錯誤？  
(A)引流量每天少於30 c.c.時可拔除 (B)有兩條胸管時先拔除上方胸管  
(C)拔除胸管後需要照X光 (D)胸管在吸氣末或呼氣初時拔除
- (C) 57 教導手術後病患使用誘導性肺活量計 (incentive spirometry) 之敘述，下列何者正確？  
(A)以坐姿採深而快的呼吸 (B)以鼻用力吸氣後，雙唇含住口含器吐氣  
(C)雙唇含住口含器後，用口慢而深的吸氣 (D)每天進行一至二次
- (C) 58 有關肺癌分類之敘述，下列何者正確？  
(A)小細胞肺癌容易早期發現，可完全治癒  
(B)鱗狀細胞肺癌好發於男性，放射線治療效果佳  
(C)肺腺癌好發於女性、不吸菸者，肺臟少有空洞出現  
(D)大細胞肺癌是最惡性的一種癌細胞，生長快速

- (B) 59 有關右肺切除術後的護理措施，下列何者正確？  
(A)協助並教導左右完全側臥，以促進痰液引流  
(B)鼓勵及協助進行右手臂運動，以預防關節黏滯  
(C)教導術後5 天內，儘量平躺，以維持生命徵象穩定  
(D)教導出院後一年內，右手不得提超過3 公斤的物品
- (B) 60 下列何者為膀胱癌最常見的症狀？  
(A)尿量突然減少 (B)無痛性血尿 (C)排尿疼痛 (D)頻尿
- (B) 61 下列何者不是泌尿道感染的徵象？  
(A)排尿時有燒灼感 (B)會出現漏尿 (C)會出現頻尿 (D)會出現血尿
- (A) 62 一般成人正常的膀胱內餘尿應少於：  
(A) 50 c.c. (B) 100 c.c. (C) 150 c.c. (D) 200 c.c.
- (B) 63 梅奶奶看電視時，忽然覺得有尿意感，褲子就濕了，可能屬於下列那一種尿失禁？  
(A)壓力性 (B)急迫性 (C)溢出性 (D)心理性
- (C) 64 下列何種結石不受尿液酸鹼值的影響？  
(A)磷酸鈣結石 (B)胱氨酸結石 (C)草酸鈣結石 (D)尿酸結石
- (A) 65 有關前列腺癌的放射性療法，下列何者是最常用來直接破壞腫瘤？  
(A)碘 ( $^{125}\text{I}$ ) (B)鈷 ( $^{60}\text{Co}$ ) (C)磷 ( $^{32}\text{P}$ ) (D)銫 ( $^{137}\text{Cs}$ )
- (A) 66 有關良性前列腺肥大 (BPH) 之敘述，下列何者錯誤？  
(A)是前列腺細胞增大 (B)好發於40 歲以上的男性  
(C)老化是此疾病最主要的危險因素 (D)潛在合併症為尿路阻塞或逆流
- (C) 67 有關急性腎絲球腎炎的醫療處置，下列何者錯誤？  
(A)使用抗生素，如：penicillin (B)使用利尿劑  
(C)接受腎臟切除術 (D)使用皮質類固醇
- (B) 68 下列何者不是腎臟創傷的徵象？  
(A)血尿 (B)頭痛 (C)下背部瘀血 (D)後腰窩痛
- (C) 69 有關痛風的護理措施，下列何者正確？  
(A)鼓勵多吃海鮮類食物  
(B)熱敷緩解關節的腫脹和疼痛  
(C)教導多喝水，使每日尿量維持在2000 c.c.以上  
(D)於急性發作期間，每天協助做下肢全範圍關節運動
- (B) 70 有關愛迪生氏危象的處理，下列何者錯誤？  
(A)密切監測生命徵象 (B)給予肌肉注射可體松 (Cortisone)  
(C)快速靜脈注射等張生理食鹽水 (D)監測每小時尿量
- (C) 71 有關低血糖之敘述，下列何者正確？  
(A)低血糖是指葡萄糖耐量試驗一小時後之血糖值低於60 mg/dL  
(B)皮膚溫暖、發汗、多尿、失眠及心跳過慢，皆為低血糖症狀  
(C)胰島素注射過多、喝酒或運動過度，皆是低血糖的誘發因素  
(D)失去意識的低血糖患者，可給予柳橙汁或葡萄糖錠之緊急處置
- (C) 72 有關糖化血色素 (HbA<sub>1c</sub>) 之敘述，下列何者正確？  
(A)糖化血色素僅能在糖尿病的患者身上驗出  
(B)空腹8 小時後，抽靜脈血測量葡萄糖和血紅素結合的反應  
(C)檢查結果可反應患者過去3 個月內的血糖控制情形  
(D)糖化血色素 $\geq 12\%$  表示血糖過高，可確定診斷為糖尿病

- (D) 73 有關協助庫欣氏症候群 (Cushing's syndrome) 患者適應身體心像改變之護理措施，下列何者錯誤？  
(A)告訴患者在治療後，身體外觀的改變會逐漸恢復正常  
(B)協助家人瞭解，患者的情緒波動是疾病的症狀之一  
(C)教導患者以衣服或飾物，來遮掩身體外觀的改變  
(D)鼓勵患者參與社交活動，不要在乎他人異樣眼光
- (D) 74 下列那些為腎上腺素 (epinephrine) 的作用？①使支氣管收縮 ②使瞳孔縮小 ③使冠狀血管擴張 ④增加人體代謝作用 ⑤抑制腸胃道活動  
(A)①②④ (B)①③⑤ (C)②③④ (D)③④⑤
- (D) 75 以碘化鉀溶液治療甲狀腺機能亢進之注意事項，下列何者錯誤？  
(A)應以吸管飲用 (B)應與牛奶或果汁合併飲用  
(C)不可以用於孕婦 (D)須持續服用至症狀完全消失才可停藥
- (C) 76 有關甲狀腺功能低下症之敘述，下列何者正確？  
(A)發生於成人時會影響智力  
(B)基礎代謝率降低，導致體溫過高  
(C)甲狀腺激素降低造成男女性慾減退  
(D)眼睛周邊及手腳背會出現凹陷性水腫
- (B) 77 一位車禍傷者倒在路旁，血流滿面，檢查發現有心跳，但是沒有呼吸。下列措施何者正確？  
(A)加壓止血 (B)人工呼吸 (C)胸外按壓 (D)緊急送醫
- (A) 78 國小學童在玩盪鞦韆時，突然倒臥在地，此時應該立即採取下列何種措施？  
(A)輕拍肩膀，確定有無意識 (B)先吹2口氣，再進行 CPR  
(C)電話求救，再通暢呼吸道 (D)固定頸椎，維持脊椎平直
- (D) 79 腹部外傷患者抱怨左肩輻射疼痛，護理人員應懷疑下列何種器官破裂出血？  
(A)胃 (B)小腸 (C)大腸 (D)脾臟
- (C) 80 一位剛滿月嬰兒在喝牛奶時，咳嗽數聲後停止，臉色發青，哭不出聲。此時護理人員應採取下列何項急救措施？  
(A)進行人工呼吸 (B)施行腹部推壓 (C)施行背擊法 (D)速打電話求救

【版權所有，重製必究！】