

# 《產兒科.精神科與社區衛生護理學概要》

- (C) 1 包圍於胎兒最內層的胚胎膜為：  
(A)包蛻膜 (B)絨毛膜 (C)羊膜 (D)基底蛻膜
- (D) 2 生命統計中「孕產婦死亡率 (maternal mortality rate)」的定義是指下列何項？  
(A)一年內每一千名活產中，於懷孕期間或懷孕終止後30 天內死亡之婦女人數  
(B)一年內每一千名活產中，於懷孕期間或懷孕終止後42 天內死亡之婦女人數  
(C)一年內每十萬名活產中，於懷孕期間或懷孕終止後30 天內死亡之婦女人數  
(D)一年內每十萬名活產中，於懷孕期間或懷孕終止後42 天內死亡之婦女人數
- (B) 3 多囊性卵巢症候群 (polycystic ovary syndrome) 的患者體內常發現有分泌過多的？  
(A)雌性素 (B)雄性素 (C)黃體素 (D)促濾泡成熟激素
- (D) 4 拉梅茲生產法所運用的主要原理不包含下列何者？  
(A)練習刺激－反應的制約反射 (B)打破害怕－緊張－疼痛的循環  
(C)集中注意焦點以分散對痛的知覺 (D)冷熱敷以減痛
- (C) 5 王太太為B 型肝炎帶原者，其產前血液檢驗結果為HBsAg(+)效價>2560、HBeAg(+)，為避免垂直感染發生，其新生兒之B 型肝炎預防注射應為：  
(A)B 型肝炎疫苗三劑 (B)B 型肝炎疫苗三劑，於滿一歲時再追加一劑  
(C)B 型肝炎免疫球蛋白一劑與疫苗三劑 (D)B 型肝炎免疫球蛋白與疫苗均為三劑
- (D) 6 陳太太妊娠35 週，因有早產預兆入院安胎，依醫囑使用Ritodrine 靜脈點滴注射。下列有關此藥物之敘述，何者錯誤？  
(A)為β 擬交感神經藥物，可使平滑肌鬆弛 (B)可能使母體心跳加速  
(C)母體血壓可能低於90/60 mmHg (D)不會通過胎盤，故不影響胎兒心跳
- (C) 7 有關基礎體溫 (BBT) 的敘述，下列何者正確？  
(A)基礎體溫是指休息半小時後所測得的體溫 (B)月經週期前期的體溫高於後期  
(C)基礎體溫會呈現高溫期乃因有黃體素之關係 (D)高溫期的長短會因人而異
- (D) 8 史太太的醫師懷疑她右腿有血栓靜脈炎現象，妳可採取下列何種評估來查出結果？  
(A)將膝彎曲並觸摸小腿是否疼痛 (B)請她將腳抬起並畫一個圈  
(C)將腳趾按白並計算幾秒顏色才恢復 (D)將足部向足背彎曲並問她小腿是否疼痛
- (B) 9 將新生兒放在冷的磅秤上造成體熱喪失，是屬於下列何種散熱途徑？  
(A)蒸發 (B)傳導 (C)對流 (D)輻射
- (A) 10 待產婦顯得多話、興奮，言語合乎社交禮儀，這是下列那一產程階段的行為特徵？  
(A)潛伏期 (B)活動期 (C)過渡期 (D)第二產程
- (B) 11 新生兒出生2~5 天間會發生暫時性的凝血機能不足，其導致的原因為：  
(A)血小板功能不成熟 (B)腸胃道缺乏正常菌叢合成維生素K1  
(C)凝血因子種類不夠 (D)紅血球數量多且壽命短
- (D) 12 胺基酸、水溶性維生素和礦物質是藉著何種運輸方式通過胎盤的？  
(A)簡單擴散 (B)促進擴散 (C)胞飲作用 (D)主動運輸
- (A) 13 有關剖腹產後的護理，下列何項敘述不正確？  
(A)接受腰椎硬膜外麻醉的產婦需協助平躺6~8 小時，以預防脊髓性頭痛  
(B)隨時評估疼痛狀況，適時給予止痛劑緩解疼痛  
(C)產後24 小時內，密切監測生命徵象變化  
(D)第一次下床應教導產婦使用束腹帶，以減低傷口之疼痛

- (B) 14 關於產後血液循環系統的變化，下列何者錯誤？  
(A)產後2~6 星期回復到懷孕前的正常體液容積值  
(B)產後血液大量流入心臟，使得脈搏增加  
(C)產後24 小時，大量血液及血漿回流心臟，產婦死亡率最高  
(D)產後10 天血液凝固因子及纖維蛋白原活性增加
- (D) 15 下列有關裝置子宮內避孕器的敘述，何者不正確？  
(A)產後第一次月經結束後，尚未有任何性行為之前裝置  
(B)生產滿月後，尚未有任何性行為之前裝置  
(C)裝置子宮內避孕器後，仍然懷孕的機率少於1~5%  
(D)裝置子宮內避孕器後，不可再哺餵母乳
- (A) 16 王太太第一胎，產後第一天，訴說其生產的過程，並表示感覺很疲倦、肚子餓，此時合宜的護理措施為：  
(A)王太太正處於接受期，護理人員宜傾聽其生產經驗，並協助身體與情緒上的需要  
(B)王太太正處於接受期，應積極教導照顧新生兒的技巧  
(C)王太太正處於緊執期，應協助其認識新生兒的特性  
(D)王太太正處於緊執期，應教導其避孕的方法
- (B) 17 孫太太表示他坐月子期間打算不洗頭，否則怕以後會頭痛。此時護理人員的反應，下列何者最合適？  
(A)這樣你受的了嗎？  
(B)曾聽過這樣的習俗  
(C)你最好考慮清楚再決定  
(D)這是古時代的風俗，現在已經不適用了
- (D) 18 以下何種狀況較易引起胎心音早期減速？  
(A)子癇前症 (B)臍帶脫垂 (C)胎盤早期剝離 (D)胎頭骨盆不對稱
- (B) 19 待產婦主訴手腳有麻刺感且眼前有黑點，此情形可能為下列何者？  
(A)血壓過低 (B)換氣過度 (C)血糖過低 (D)心搏過速
- (C) 20 下列有關分娩徵兆的敘述，何者正確？  
(A)通常初產婦的腹輕感 (lightening) 晚於經產婦  
(B)出現現血表示已進入產程  
(C)引發生產的陣痛通常發生在背部，且走動會增加不適  
(D)只要子宮收縮產生疼痛感，表示子宮頸已擴張、變薄
- (B) 21 初產婦接受無痛分娩最適宜的時間是在子宮頸口呈現何種狀況時？  
(A)未開時 (B)開4 公分時 (C)開8 公分時 (D)全開時
- (C) 22 王太太產後三天，自訴感覺乳房腫脹，隱隱作痛，嬰兒吸母乳時並感覺下腹疼痛。針對此情況，下列敘述何者正確？  
(A)乳房會痛乃因乳腺管阻塞，無法餵奶了  
(B)是腦下垂體後葉釋出泌乳素，造成排乳反射而脹奶  
(C)嬰兒吸吮乳房時，王太太會感覺子宮收縮痛，這是正常的反應  
(D)乳房會疼痛，護理人員應向醫師反應，懷疑是否是乳癌的先兆
- (C) 23 護理人員向孕婦解釋無壓力試驗 (non-stress test)，下列敘述何者正確？  
(A)執行過程中身體採平躺姿勢  
(B)必須先執行小量灌腸，以增加判讀結果的準確度  
(C)主要監測胎動時胎心音的變化  
(D)在妊娠初期就要做此項檢查，以便能早期發現問題

- (D) 24 莊女士懷孕8週，她表示：「現在對性生活一點興趣都沒有，很擔心先生會不諒解。」，護理人員對此較合宜的反應為：
- (A)要不要談談為什麼妳會沒興趣呢？這與大多數人都不相同
  - (B)妳這個問題有多久了？似乎非常嚴重
  - (C)妳先生應該會瞭解這和懷孕有關係，生產完後就好了
  - (D)懷孕初期很多人有這樣的情形，可以多談一些嗎？
- (A) 25 為2歲兒童量耳溫的方法，下列何者正確？
- (A)將耳翼往後往下拉 (B)將耳翼往前往上拉
  - (C)將耳翼往後往上拉 (D)將耳翼往前往下拉
- (B) 26 有關顱內壓升高病童之護理原則，下列何者不適當？
- (A)保持血中PaCO<sub>2</sub>在22~27 mmHg，以降低腦中血流量
  - (B)為保持呼吸道通暢，抽痰時每次抽吸至少15秒
  - (C)病童床頭宜抬高30度
  - (D)病童頭部維持在中線位置，以促進頸靜脈血回流
- (D) 27 服用毛地黃 (Digoxin) 會促使鉀離子流失，需鼓勵病童攝取含鉀高的食物，下列何者除外？
- (A)馬鈴薯及深綠色蔬菜 (B)香蕉、柑橘類水果 (C)瘦肉類食物 (D)洋芋片、鹹餅乾
- (B) 28 有關氧氣帳使用之敘述，下列何者錯誤？
- (A)氧流量宜控制在10 L/min 左右 (B)維持帳內氧濃度在20%
  - (C)維持帳內濕度在40~60%之間 (D)避免在帳內玩含有金屬、電池等易產生火花的玩具
- (D) 29 1歲的小威，因嘔吐、解水樣綠色便、體溫38.5°C而入院，母親主訴小威這二天進食量減少、無尿，整個人瘦了許多，體重由10公斤降到8.7公斤。依上述資料的評估結果為何？
- (A)小威進食量少，故體重下降、無尿是正常現象
  - (B)小威解水樣綠色便、消瘦，表示有輕度脫水現象
  - (C)小威體重僅下降1.3公斤、發燒，表示有中度脫水現象
  - (D)小威無尿、體重下降13%，表示有重度脫水現象
- (B) 30 白血病病童接受化學治療後，當白血球下降至1000/mm<sup>3</sup>時，下列護理措施何者不適當？
- (A)食物必須經過烹煮，忌生食 (B)鼓勵親朋好友多來探視，減少隔離感
  - (C)禁止施打活性疫苗 (D)給予軟毛或海綿牙刷，清潔口腔
- (C) 31 有關急性腎絲球腎炎病童之護理措施，下列何者不適當？
- (A)急性期應臥床休息，至肉眼觀察不到血尿、水腫減退及血壓正常為止
  - (B)急性期合併少尿時，需避免含鈉高及含鉀高之食物
  - (C)水腫時，為促進尿液的排出，鼓勵多攝取小紅莓汁及碳酸飲料
  - (D)病況雖穩定，但在蛋白尿及血尿消失前，需避免劇烈活動
- (B) 32 有關病童痙攣發作時，護理人員緊急處理步驟之敘述，下列何者錯誤？
- (A)除去病童周圍可能造成傷害的物品
  - (B)病童牙關緊閉時，將包紗布之壓舌板或毛巾卷塞入病童口中
  - (C)協助病童側臥，以助分泌物排出
  - (D)觀察並記錄發作的型態與時間
- (D) 33 有關缺鐵性貧血患者補充鐵劑之敘述，下列何者錯誤？
- (A)口服硫酸亞鐵時，可併用維生素C，促進鐵質之吸收
  - (B)口服液體鐵劑時，需用吸管吸食，以防牙齒著色
  - (C)口服鐵劑不可與牛奶或制酸劑一起合用，以免影響鐵質吸收
  - (D)口服鐵劑可完全被吸收，大便若呈黑色，表示可能有腸道出血現象

- (B) 34 婷婷與安安都是2 歲的兒童，她們喜歡找彼此玩，但玩的時候卻各玩各的，請問這是何種遊戲特質？  
(A)單獨遊戲 (B)平行遊戲 (C)聯合遊戲 (D)競賽遊戲
- (A) 35 邱小妹為28 週出生之早產兒，二個月大，尚未接種任何疫苗，目前體重達2300 公克。其現在可接種的疫苗不包括：  
(A)卡介苗 (B)B 型肝炎疫苗  
(C)白喉、百日咳、破傷風三合一疫苗 (D)口服小兒麻痺疫苗
- (B) 36 小偉九個月大，因嚴重脫水有休克前兆，轉入加護病房治療，母親於探病時間進來探視，下列護理措施何者不適當？  
(A)與母親會談，瞭解其關注的事情  
(B)主動向母親詳細解釋腸胃炎脫水、休克的病理機轉  
(C)鼓勵母親參與照顧，甚至只是餵小偉喝水也好  
(D)陪在母親身旁，幫助母親瞭解孩子的現況
- (D) 37 小美5 歲，在幼稚園玩耍時，不慎被生鏽的鐵片割傷前臂，老師緊急將她送至急診室接受破傷風免疫球蛋白的注射，小美所獲得的免疫能力，屬於下列何者？  
(A)天然主動免疫 (B)天然被動免疫  
(C)人工主動免疫 (D)人工被動免疫
- (B) 38 小明住院接受靜脈輸液，使用微點滴 (micro drip)，需要在30 分鐘內滴完稀釋的抗生素 Ampicillin 20 c.c.，則每分鐘應維持多少滴？  
(A)20 滴 (B)40 滴 (C)60 滴 (D)80 滴
- (A) 39 兒童能使用雙字句表達複雜的意思，但句子的結構鬆散，例如：「媽媽，抱」或「媽媽，怕」的電報式語言，其可能的年齡層為：  
(A)1 歲半至2 歲 (B)2 歲半至3 歲 (C)3 歲半至4 歲 (D)4 歲半至5 歲
- (C) 40 有關心臟病童口服毛地黃 (Digoxin) 之敘述，下列何者錯誤？  
(A)水劑必須以空針抽取正確的劑量服用  
(B)服藥15 分鐘內產生嘔吐時，可以再補一次劑量  
(C)最好與食物一起食用，以避免腸胃道的不適  
(D)忘記服藥，可以在6 小時內再補一次劑量
- (D) 41 依娜姬 (Nagy) 理論，有關兒童對死亡概念之敘述，下列何者正確？  
(A)2 歲的兒童會認為死亡是暫時的分離  
(B)3 至5 歲的兒童知道死亡是永遠離開  
(C)6 至9 歲的兒童相信任何人都無法逃避死亡  
(D)9 歲以上的兒童可瞭解死亡是終止，是不可避免的
- (B) 42 小貝貝2 歲半，目前的牙齒狀況應為：  
(A)乳齒約6~8 顆 (B)乳齒已全部長出  
(C)恆齒正要開始長 (D)恆齒已完全長齊
- (D) 43 有關嬰幼兒氣質評估之敘述，下列何者正確？  
(A)反應閾「低」的孩童需要較高的刺激量才能引起反應  
(B)「易養育型」的孩童反應強度「強」(超過平均值)  
(C)「慢吞吞型」的孩童活動量「低」，但適應力「佳」  
(D)「難養育型」的孩童，其趨避性項目是屬於「避性」
- (B) 44 足月新生兒小美，體重3000 公克，依其生長熱量之需求計算，小美每天需要餵食多少全奶？  
(A) 420 c.c. (B) 495 c.c. (C) 585 c.c. (D) 675 c.c.

- (A) 45 3 歲的小均須抽血檢查，抽血前護理人員最佳的溝通解釋為：  
 (A)「會痛一下子，你可以哭，但是手不能動。」 (B)「不會痛，不要亂動。」  
 (C)「男孩子要勇敢喔！一下子就好了。」 (D)不必解釋，但要約束其手腳
- (B) 46 有關兒童發展的原則，下列敘述何者錯誤？  
 (A)發展具有關鍵期 (B)各項發展在同時以同速度進行  
 (C)早期發展是晚期發展的基礎 (D)發展的進行由簡單到複雜
- (D) 47 護理人員協助罹患第一型糖尿病的學齡兒童，規劃其居家自我照顧，下列敘述何者錯誤？  
 (A)協助病童體認血糖過高或血糖過低時之身體反應  
 (B)教導病童當血糖變化時，調整飲食與活動之原則與方法  
 (C)以圖片與實物教導病童胰島素注射之部位與方法  
 (D)告知當血糖控制良好後，可不需固定監測血糖及注射胰島素
- (B) 48 有關氣喘之敘述，下列何者錯誤？  
 (A)氣喘發作時因呼吸道黏膜水腫、平滑肌痙攣而引起呼吸困難  
 (B)監測肺部呼出氣流量，當尖峰呼氣流量 (PEFR) 值為理想值的60%以下，表示其情況屬於綠燈區  
 (C)血液檢查結果，嗜伊紅性白血球 (eosinophilia) 總數增加，表示有外因性誘發因子存在  
 (D)使用Theophylline 之目的是擴張支氣管
- (A) 49 當精神病患的行為可能嚴重到無法自我照顧，甚至有自傷、傷人之虞，予以強制住院，是考量醫學倫理的那項原則？  
 (A)行善原則 (B)知情同意原則 (C)不傷害原則 (D)公平正義原則
- (D) 50 有關治療性溝通的應用原則，下列敘述何者最合宜？  
 (A)應由治療者決定會談主題以收集資料  
 (B)應避免談及個案隱私，以免傷害個案  
 (C)會談中勿改變既定的會談目標，應努力達成  
 (D)營造友善與關懷的溝通環境是治療者的責任
- (B) 51 心神喪失或精神耗弱無法處理自己事務者，可以聲請宣告禁治產，下列何者為最優先考慮的監護人？  
 (A)父母 (B)配偶 (C)手足 (D)子女
- 情況：林先生，慢性精神分裂症合併輕度智能不足，行為退化，自我照顧能力差，身體有異味，常至護理站要求吃零食，需求無法滿足時就躺地大聲哭泣。請回答第52~53 題。
- (C) 52 護理人員採不理睬的方式處理，這是運用行為修正的那一種技巧？  
 (A)增強 (reinforcement) (B)處罰 (punishment)  
 (C)消除 (extinction) (D)模仿 (modeling)
- (A) 53 護理人員與林先生協定，早上9 點洗臉刷牙、下午4 點洗澡洗頭，則各給一份零食，這是運用行為修正的那一種技巧？  
 (A)增強 (reinforcement) (B)處罰 (punishment)  
 (C)消除 (extinction) (D)模仿 (modeling)
- (B) 54 小雯幼年曾遭受鄰居性侵害，最近因男友另結新歡而大受刺激，多次自傷，被醫師診斷為邊緣型人格違常。此案例中，男友另結新歡是影響小雯精神疾病發生的何種因素？  
 (A)潛在因素 (predisposing factor) (B)促發因素 (precipitating factor)  
 (C)續存因素 (prepetuating factor) (D)投射因素 (projecting factor)
- (A) 55 病人話題變化迅速，入院的事講沒幾句，又講到家人衝突、自己的童年及初戀的男友，這是下列何種症狀？  
 (A)意念飛躍 (B)言語迂迴 (C)聯想鬆弛 (D)字句拼湊

- (B) 56 護理評估「認知」項目中，詢問個案「你今天早餐吃什麼？」，主要目的為測試個案的何種功能？  
 (A)判斷力 (B)記憶力 (C)定向力 (D)抽象思考能力
- (D) 57 陳先生有強烈罪惡感，他一直堅信自己殺死雙親。護理人員評估出他相當不安與自責，此時最優先的護理措施為何？  
 (A)注意病患的生理需求 (B)加強病患與家屬互動  
 (C)帶入保護室減少妄想 (D)注意病患避免傷害自己
- (C) 58 呂先生30歲，因急性躁症發作(acute manic episode)而來入院，當妳於早晨巡視病房叫喚病患起床時，呂先生以曖昧的口吻對妳說：「小姐，妳讓我親一下，好嗎？」，此時應如何處理較適當？  
 (A)裝做沒聽見 (B)不予理會，以消除個案的不當行為  
 (C)告訴個案此舉動令妳不舒服 (D)重申護病關係之限制，並交班給主護護士處理
- (D) 59 下列何者最適宜以行為治療處理？  
 (A)改善精神分裂症患者的妄想症狀 (B)調解家庭中複雜的婚姻問題  
 (C)改變憂鬱症患者悲觀的想法 (D)訓練慢性精神病患的自我照顧能力
- (D) 60 有關失智症臨床表徵之敘述，下列何者錯誤？  
 (A)以虛構的故事，填補記憶的缺損 (B)出現學習新技巧能力障礙  
 (C)可能因感官功能退化而出現幻覺、錯覺 (D)定向力障礙以早上醒來最嚴重
- (C) 61 有關阿茲海默氏癡呆症之敘述，下列何者正確？  
 (A)常為物質濫用所引發 (B)與長期暴露於大量含鎘的環境有關  
 (C)腦中之乙醯膽鹼激素分泌減少 (D)臨床表徵在一天之內常有明顯變化
- 情況：王小姐，日前因故和家人衝突，與好友結伴暢遊東台灣，晚上於飯店內突然感覺床舖強烈搖動，王小姐穿著睡衣、光著腳與同事匆忙地遍尋逃生門，驚惶之餘不顧一切地往下衝……。  
 請回答第62~63題。
- (D) 62 王小姐腳底沾血和玻璃碎片、臉色慘白、呆僵無法溝通，請問其經歷何種程度之焦慮？  
 (A)輕度 (B)中度 (C)重度 (D)極度或恐慌
- (B) 63 王小姐被飯店人員緊急送醫治療後，待焦慮程度漸趨緩和，護理人員開始與其進行溝通。請問此時最合適的會談重點為何？  
 (A)討論日前與家人所引起的衝突事件 (B)請王小姐描述剛才焦慮發生的情況  
 (C)請王小姐回想並找出過去類似發生的行為 (D)請問王小姐未來會如何處理類似情境
- (A) 64 暴力行為可能由下列何項「人際互動因素」所引發？  
 (A)個案的身體安全界限遭到侵犯 (B)個案在擁擠的環境中缺乏隱私性  
 (C)個案有明顯的幻聽 (D)個案有反覆住院的病史
- (D) 65 甲社區的依賴人口指數為65，乙社區為40，下列敘述何者正確？  
 (A)甲社區15歲至64歲人口較乙社區為少  
 (B)甲社區14歲以下及65歲以上人口較乙社區為多  
 (C)甲社區14歲以下及65歲以上人口的依賴程度較乙社區為高  
 (D)甲社區15歲至64歲人口所需扶養之無生產力人口比例較乙社區為高
- (B) 66 如果社區評估的過程中發現「融入社區」執行困難，以下何者最可能有直接的幫助？  
 (A)進一步深入分析社區的人口統計資料  
 (B)拜訪非官方的社區領導者，建立夥伴關係  
 (C)選擇使用其他的社區評估架構，重新評估  
 (D)設計問卷，調查居民如何融入社區的方法

情況：唐老先生原以口服藥控制血糖，但因血糖居高不下，而必須改以注射胰島素。請回答第67～68題。

- (C) 67 請問何種教學方法最適合用來教導唐老先生學會胰島素的注射？  
 (A)演講法與討論法 (B)觀摩法與問答法  
 (C)示教與回覆示教法 (D)討論法與問答法
- (C) 68 有關唐老先生學習「胰島素注射」的教學目標，請問下列何者最適當？  
 (A)唐老先生能認識注射胰島素的重要性  
 (B)唐老先生能瞭解注射胰島素的步驟  
 (C)唐老先生能正確執行胰島素注射  
 (D)唐老先生能相信胰島素的注射對疾病的控制是有效的
- (D) 69 下列有關社區衛生護理特性的敘述何者正確？  
 (A)強調以「家庭」為焦點的護理 (B)主要工作目標為限制殘障  
 (C)護理對象須為被動接受者 (D)強調以群體為單位擬定衛生計畫
- (A) 70 社區衛生護理人員每年須對自己負責的地段進行社區評估，其最終目的為：  
 (A)確認社區需要 (B)確認高危險群體  
 (C)完成健康計畫及政策之基礎 (D)決定社區健康服務項目
- (B) 71 在台灣曾經有社區自發性的成立老人會，每位參與的成員每月都繳固定的費用來因應成員社交、文康等費用，當成員有生病、過世時亦提供慰問或喪葬補助。上述活動主要是下列那項社區功能的發揮？  
 (A)社會化 (B)相互支援 (C)社會控制 (D)社會參與
- (C) 72 含汞廢水污染水源，會造成何種疾病？  
 (A)烏腳病 (B)痛痛病 (C)水俣病 (D)威爾遜症
- (A) 73 依據2006年06月14日修正公布的傳染病防治法，對於登革熱的敘述，下列何者正確？  
 (A)屬於第二類法定傳染病  
 (B)須於一週內完成病例通報  
 (C)可分為四型，台灣各地區流行過的僅有其中二型  
 (D)若有二種類型以上登革熱病毒的感染，死亡率高達90%
- (C) 74 由於土地不當使用、過度放牧和森林砍伐等，將使地球環境面臨什麼問題？  
 (A)臭氧層破壞 (B)酸雨 (C)土壤沙漠化 (D)溫室效應
- (B) 75 經常用來衡量一個地區或國家的衛生指標為何？  
 (A)十大死亡原因 (B)新生兒死亡率與嬰兒死亡率  
 (C)國民平均餘命 (D)傳染病發生率
- (D) 76 現階段婦幼衛生個案管理的重點對象為何？①外籍女性配偶 ②未成年懷孕生育 ③第一胎孕產婦 ④一般育齡婦女 ⑤低體重兒  
 (A)①②③ (B)①③④ (C)③④⑤ (D)①②⑤
- (C) 77 公共衛生護士進行TB（肺結核）、pp & new born（產後婦女及新生兒）和DM（糖尿病）個案訪視，請問安排訪視之先後次序以何者最適當？  
 (A)TB → pp & new born → DM  
 (B)TB → DM → pp & new born  
 (C)pp & new born → DM → TB  
 (D)DM → TB → pp & new born
- (C) 78 社區衛生護理人員協助居家慢性病個案疾病控制時，最容易促發個案參與的措施為：①藥物治療②運動或復建 ③社區資源支持 ④日常生活安排 ⑤醫療體系安排 ⑥飲食控制  
 (A)①②④⑤ (B)②③⑤⑥ (C)①②④⑥ (D)①③⑤⑥

- (D) 79 學童健康的行為受那些因素影響最多？①同儕 ②家庭 ③報章雜誌 ④文化  
(A)①②③ (B)②③④ (C)①③④ (D)①②④
- (C) 80 用來評量個案長期照護需求的指標包括：①個案日常生活活動 ②個案家庭功能 ③個案工具性日常生活活動 ④個案疾病殘障程度 ⑤個案認知功能  
(A)①②③ (B)②④⑤ (C)①③⑤ (D)②③④

高  
點  
·  
建  
國

【版權所有，重製必究！】