



《醫學(六)》

- (B) 1 於手術中監測病人的潮氣容積末二氧化碳 (EtCO₂) 時, 在下列那一種情況會上升?
 (A)發生空氣栓塞 (Air embolism) (B)惡性高熱 (Malignant hyperthermia)
 (C)心輸出量減少 (D)血壓降低
- (C) 2 下列何種 Cholinesterase inhibitor 為三級胺 (Tertiary amine)可通過腦血屏障礙(Blood-brain barrier)?
 (A) Neostigmine (B) Edrophonium
 (C) Physostigmine (D) Pyridostigmine
- (B) 3 對一個 ASA class I 的 2 歲 12 公斤小男孩施行門診手術 (Outpatient) 的疝氣修補術, 如果預計實施全身麻醉合併尾椎阻斷術 (Caudal block), 下列何者是最理想的尾椎阻斷術施打藥物組合及劑量?
 (A) 0.5% Bupivacaine 10 ml
 (B) 0.25% Bupivacaine 10 ml
 (C) 0.5% Bupivacaine 6 ml with morphine 2 mg
 (D) 0.2% Bupivacaine 6 ml with morphine 4 mg
- (B) 4 下列那種局部麻醉劑 (Local anesthetics)不屬於 Amides 類?
 (A) Bupivacaine (B) Tetracaine (C) Lidocaine (D) Prilocaine
- (C) 5 下列那一項麻醉劑會增加顱內壓?
 (A) Thiopental (B) Fentanyl (C) Ketamine (D) Etomidate
- (D) 6 在全身麻醉中惡性高熱 (malignant hyperthermia)是一極為罕見但死亡率相當高的遺傳疾病, 請問下列何種麻醉藥物目前認為不會於麻醉中引發惡性高熱?
 (A) Succinylcholine (B) Halothane (C) Thiopental (D) Fentanyl
- (BC) 7 一位 62 歲男性, 患三叉神經下頷支的帶狀疱疹, 目前正處於急性期, 為防止產生 post-herpetic neuralgia, 應做什麼處置?
 (A) Trigeminal nerve block (B) Stellate ganglion block
 (C)服用 Acyclovir (D)服用 Antibiotics
- (A) 8 周邊傷害刺激主要是經由 A 與 C 神經纖維傳入脊髓何區?
 (A)脊板 (lamina) I/II (B)脊板 III/IV (C)脊板 VI (D)脊板 IX/X
- (A) 9 如眼底視網膜照片所示, 此位患者最可能之診斷為何?



- (A)糖尿病視網膜病變 (B)急性視網膜中心動脈阻塞
 (C)急性視網膜中心靜脈阻塞 (D)早產兒視網膜病變

- (BC) 10 承上題，此位患者最適當之處置為何？
 (A) 眼球按摩並降低眼壓
 (B) 積極控制血糖及眼科門診追蹤
 (C) 泛視網膜雷射治療 (panretinal laser photocoagulation; PRP)
 (D) 玻璃體切除術 (vitrectomy)
- (D) 11 有關棘狀阿米巴角膜炎 (Acanthamoeba keratitis) 的敘述，何者錯誤？
 (A) 較好發於隱形眼鏡清潔習慣不良的配戴者
 (B) 病程初期可形成偽樹枝狀 (pseudodendrite) 的病灶，容易與疱疹性角膜炎混淆
 (C) 病程後期角膜可出現環狀浸潤 (ring infiltration)
 (D) 對大多數抗生素有效
- (B) 12 下列那一項儀器，是檢查圓錐角膜 (keratoconus) 早期病變最敏感且有效的儀器？
 (A) 鏡射光顯微鏡 (specular microscope)
 (B) 角膜弧度地形檢查儀 (computerized videokeratoscope)
 (C) 眼底鏡 (ophthalmoscope)
 (D) 眼壓計 (tonometer)
- (A) 13 雷射虹膜穿孔術 (laser iridotomy) 適用於下列那類型的青光眼？
 (A) 瞳孔阻斷 (pupillary block) 之隅角閉鎖型青光眼 (B) 隅角開放性青光眼
 (C) 使用類固醇導致之續發性青光眼 (D) 任何類型的青光眼均適用
- (D) 14 下列有關光波物理性質的敘述，何者錯誤？
 (A) 各種顏色不同波長之光波在真空中的速度是一樣的
 (B) 不同波長之色光在一般介質的速度是不一樣的
 (C) 光線在一般介質的相對折射係數 (refractive index) 均大於 1
 (D) +1D (屈光度, diopter) 透鏡的焦距 (focal length) 訂為一公尺，則 +2D 鏡片的焦距為兩公尺
- (B) 15 下列何者是視神經炎 (optic neuritis) 最常見的視野變化？
 (A) 盲點 (blind spot) 變大 (B) 中心盲點 (central scotoma)
 (C) 雙顳側半盲 (bitemporal hemianopsia) (D) 接觸處盲點 (junctional scotoma)
- (A) 16 一位 4 歲的小弟弟最近走路常不小心撞牆跌倒，家長無意間發現其左眼呈白瞳現象 (white pupil)，故帶至眼科門診檢查。請問下列何者處置較不適當？
 (A) 安排左眼切片檢查 (Surgical biopsy)
 (B) 安排眼部超音波檢查 (B-scan)
 (C) 安排眼窩部斷層掃描檢查 (Orbital CT scan)
 (D) 散瞳後以間接眼底鏡觀察眼底 (Indirect Ophthalmoscopy)
- (C) 17 根據下圖，則左耳骨導 (bone conduction) 的平均聽力閾值 (pure tone average) 為何？



- (A) 2 dB
 (B) 25 Db
 (C) 35 dB
 (D) 55 dB

- (B) 18 以下何者不屬於構成鼻中隔的部分？
 (A)中隔軟骨 (B)鼻骨 (C)犁骨 (D)垂直板
- (B) 19 急性篩竇炎所引起的頭痛，通常位於那一部位？
 (A)枕骨部 (B)眼球深部 (C)牙齒 (D)顳骨部
- (C) 20 做 Radical neck dissection 後，有 Shoulder dysfunction,請問係那一對顱神經受損？
 (A)第九對 (B)第十對 (C)第十一對 (D)第十二對
- (B) 21 右耳進行迷路切除術 (labyrinthectomy) 可見出現何種眼振？
 (A)水平眼振向右 (B)水平眼振向左 (C)垂直眼振向上 (D)垂直眼振向下
- (C) 22 55 歲男性有嚼檳榔、抽菸及喝酒的習慣約 15 年，最近半年在左舌側出現約 1.5 公分的腫瘤，理學檢查發現在同側下頷三角有一 2 公分淋巴腫，舌切片檢查證實為舌部鱗狀上皮細胞癌 (squamous cell carcinoma),請問此病患的癌症臨床分期為第幾期？
 (A)第一期 (stage I) (B)第二期 (stage II) (C)第三期 (stage III) (D)第四期 (stage IV)
- (B) 23 6 歲女童因喉嚨劇烈疼痛、吞嚥疼痛、發燒三日、呼吸困難至急診，經診視病童後，發現口水外流、呼吸有嘯鳴聲 (stridor)，急診科醫師安排頸部 X 光片顯示有 "thumb sign"並會診耳鼻喉科醫師,請問最可能的診斷為何？
 (A)哮吼 (croup) (B)急性會厭炎 (acute epiglottitis)
 (C)急性咽喉炎 (acute pharyngolaryngitis) (D)急性支氣管炎 (acute bronchitis)
- (C) 24 承上題，請問下列處置何者錯誤？
 (A)有上呼吸道阻塞之可能，需儘早建立呼吸道如氣管插管
 (B)此疾病可先給予適當抗生素
 (C)多為病毒感染給予支持性治療
 (D)儘量使病童保持平靜，避免劇烈的哭鬧
- (C) 25 30 歲孕婦，G₂P₁，生產時內診結果如下圖，請問胎位之正確表示法為何？
 (A) ROA
 (B) LOA
 (C) RMA
 (D) LMA



- (B) 26 正常足月產婦分娩時，診斷為延長潛伏期障礙 (prolonged latent phase)之最優先處置為何？
 (A)剖腹產
 (B)休息觀察
 (C)增加腹壓，促進胎兒下降
 (D)高位產鉗生產
- (A) 27 12 週前之早期妊娠流產，最常見的原因為何？
 (A)染色體異常
 (B)感染
 (C)子宮頸閉鎖不全
 (D)黃體素不足
- (B) 28 產程延長，宮口未全開，胎兒頭皮出現水腫鼓起稱為：
 (A) Molding (B) Caput succedaneum
 (C) Subdural hematoma (D) Erythema nodosum

【版權所有，重製必究！】

(B) 29 下圖為檢查胎位之里歐浦 (Leopold) 檢查法。請問其為第幾式？

- (A) 第一式
(B) 第二式
(C) 第三式
(D) 第四式



- (D) 30 20 歲孕婦，G₁P₀，妊娠31 週，主訴：頭痛，視力模糊有一天之久。血壓 200/140 mmHg，下肢水腫 (+++)，蛋白尿 (++++)，深部肌腱反射 (+++)，GOT 上升，血小板下降，有溶血現象。請問最可能的診斷為何？
(A) 肝昏迷 (B) 腎衰竭 (C) 子癇症 (D) HELLP 症候群
- (B) 31 35 歲女性，G₁P₀，妊娠16 週接受羊膜穿刺以檢查染色體，此時唐氏症 (Down syndrome) 發生率為何，請選出下列四者中最可能的發生率？
(A) 百分之四 (B) 千分之四 (C) 萬分之四 (D) 十萬分之四
- (B) 32 35 歲女性，G₂P₂，妊娠40 週生產時曾大量出血，產後 6 個月發現無乳汁，無月經，毛髮脫落，請問最可能的診斷為：
(A) 庫欣症候群 (Cushing' s syndrome) (B) 希漢症候群 (Sheehan' s syndrome)
(C) 強生症候群 (Johnson syndrome) (D) 麥格症候群 (Meige' s syndrome)
- (C) 33 43 歲女性，G₂P₁，妊娠41 週，待產中胎心發生「晚期減速」 (late deceleration)，請問下列診斷中何者最為可能？
(A) 胎頭壓迫 (B) 臍帶壓迫 (C) 子宮胎盤功能不足 (D) 臍繞頸
- (D) 34 下列何者不是更年期婦女血液荷爾蒙之參考檢查？
(A) 雌二醇 (Estradiol) (B) 促濾泡激素 (FSH)
(C) 促黃體激素 (LH) (D) Androstenedione
- (B) 35 41 歲女性，G₁P₀，妊娠 16 週，血液檢查發現胎兒甲型蛋白 (alpha-fetoprotein, AFP) 過高，下列何者為最不可能的診斷？
(A) 無腦兒 (B) 脊柱裂 (C) 唐氏症 (D) 臍膨出
- (C) 36 下列有關肥胖婦女的敘述，何者正確？
(A) 子宮內膜癌症危險降低 (B) 性荷爾蒙結合球蛋白 (sex hormone binding globulin) 降低
(C) 游離雄性素降低 (D) 雌素酮 (estrone) 降低
- (B) 37 下列何者可刺激 GnRH pulses？
(A) Hyperprolactinemia (B) Cushing' s disease (C) Catecholamine (D) Acromegaly
- (D) 38 使用口服避孕藥的絕對禁忌症有：
(A) 骨盆腔炎症 (B) 血栓靜脈炎 (C) 飲酒習慣者 (D) 月經周期不準者
- (C) 39 下列何者不是嚴重型子癇前症 (severe preeclampsia) 之指標？
(A) 頭痛 (B) 上腹痛 (C) 視覺模糊 (D) 多尿
- (B) 40 妊娠時母親心臟血管系統會發生改變。下列項目中，何者會下降？
(A) 心輸出量 (Cardiac output)
(B) 心跳次數 (Heart rate)
(C) 肺血管阻力 (Pulmonary vascular resistance)
(D) 肺微血管楔壓 (Pulmonary capillary wedge pressure)


- (B) 41 促黃體激素潮放 (LH surge)的生理是:
(A)由黃體素正向回饋所引起 (B)引起排卵的必要條件
(C)發生在卵子離開濾泡後 (D)可促進顆粒層細胞合成雌激素
- (A) 42 婦女有微小泌乳激素瘤懷孕時, 下列敘述何者最適當?
(A)終止懷孕 (B)定期追蹤視野有助臨床評估
(C)產後不可哺餵母乳 (D)MRI 評估沒有用處
- (B) 43 下列何者是女性青春期末徵的出現順序(先→後)?
(A)乳房突出→陰毛→身高快速增加→初潮 (B)陰毛→乳房突出→初潮→身高快速增加
(C)乳房突出→初潮→陰毛→身高快速增加 (D)初潮→乳房突出→陰毛→身高快速增加
- (A) 44 早期懷孕婦女的抹片檢查有惡性細胞, 如果陰道鏡檢查及切片檢查無法確定子宮頸侵襲癌的存在, 要施行診斷性圓錐形切片 (conization) 時, 最好在何時?
(A)妊娠第 I 期 (first trimester) (B)妊娠第 II 期 (second trimester)
(C)妊娠第 III 期 (third trimester) (D)產後
- (A) 45 下列那一項不是子宮內膜癌的危險因子?
(A)多胎 (B)肥胖 (C)服用 Tamoxifen (D)服用動情激素
- (B) 46 下列關於子宮頸癌的敘述, 何者正確?
(A)現行子宮頸癌分期採手術分期, 手術是主要治療方式
(B)現行子宮頸癌分期採臨床分期, 治療方法依期別的不同而有不同的選擇
(C)根除性子宮切除 (Radical hysterectomy)是治療子宮頸癌的唯一方法
(D)子宮頸癌對放射線治療的反應差, 所以不考慮放射線治療
- (C) 47 王小姐是子宮頸癌患者, 理學檢查發現她的子宮頸癌病灶大小約 3 公分, 且有侵犯到上 1/3 的陰道和右側子宮旁組織 (parametrium), 但未達到骨盆壁。其他檢查像是膀胱鏡檢查、下消化道攝影以及泌尿道攝影等均無發現腫瘤組織, 則王小姐的子宮頸癌分期為:
(A)子宮頸癌採手術分期, 須手術完才能確定 (B) Stage Iia (C) Stage IIb (D) Stage IIIb
- (D) 48 妊娠滋養層細胞腫瘤 (Gestational trophoblastic tumor)發生轉移(metastasis)時,最常見的轉移部位是:
(A)陰道 (B)骨盆腔 (C)肝 (D)肺
- (D) 49 下列那一種子宮內膜增生 (endometrial hyperplasia)的組織病理最易導致子宮內膜癌?
(A) cystic without atypia (B) adenomatous without atypia
(C) cystic with atypia (D) adenomatous with atypia
- (A) 50 一位 28 歲不孕症婦女在 6 天前接受取卵手術, 共取出 20 顆卵子, 2 天後植入 3 個胚胎。今天來到急診, 主訴呼吸困難、腹脹以及噁心。超音波發現兩側卵巢腫大約 6 公分、有大量腹水。下列那一項處置較不適合?
(A)抽血驗 CA125, CEA, CA199
(B)抽血驗 CBC, electrolytes, GPT(ALT), BUN, creatinine
(C)抽腹水
(D)給予大量 normal saline
- (D) 51 一位 25 歲女性, 訴說常常在月經的前兩天開始就感到劇烈的下腹疼痛, 疼痛並且一直持續到月經結束, 這已經持續有一年的時間。在此之前, 她通常是在月經來的第一天才會感覺到疼痛。她自行吃止痛藥, 但無法改善症狀。因此到婦產科醫院求診, 經超音波檢查後, 發現左側卵巢有個 6 公分的卵巢囊腫。她向來月經週期都很準時是 28 天, 每次都持續約 5 天左右, 經血量也沒什麼特別之處。醫師在診查之後, 心中已有初步臆斷, 因此處方黃體素給予治療。果然, 投藥後疼痛症狀即稍有改善。你覺得最可能的診斷是:
(A)卵巢功能退化 (B)子宮肌瘤 (C)黃體囊腫 (D)子宮內膜異位

- (A) 52 一位 20 歲女孩一向月經很正常，2 個月前接受人工流產手術後月經量突然減少，總共只有 2 天，而且一天只用一片衛生棉，最適當的處置為何？
 (A)子宮鏡檢查 (B)抽血檢查荷爾蒙，包括 FSH, estradiol, prolactin
 (C)給予高劑量雌激素以幫助子宮內膜生長 (D)安排子宮擴刮術 (D&C),並放置避孕器
- (B) 53 下列何種藥物，最不可能縮小子宮肌瘤？
 (A) RU486 (B)黃體素 (progesterone) (C) GnRH (D) GnRH 拮抗劑
- (AD) 54 下列何者不是脊髓損傷直接造成的男性性功能障礙？
 (A)性慾低落 (B)勃起困難 (C)射精困難 (D)沒有性高潮
- (C) 55 下列有關脊髓損傷引起之肌張力 (muscle tone)過強之治療,何者最不適當？
 (A)口服 Baclofen (B)適當的伸展運動 (stretching)
 (C)早期手術治療 (D)正確的擺位
- (D) 56 下列有關肌肉顫動 (fasciculation) 之敘述，何者錯誤？
 (A)肌纖維收縮出自於同一個運動單元 (motor unit)
 (B)生理性肌肉顫動可因緊張或劇烈運動發生
 (C)病理性肌肉顫動常發生於運動神經元病變 (motor neuron disorder)
 (D)肌肉顫動需靠針肌電圖 (needle EMG)檢查作診斷
- (A) 57 圖中病人持右側四足拐杖步行，左肩下垂左足內翻，病人最可能罹患下列何種疾病？
 (A)右側大腦梗塞
 (B)左側大腦出血
 (C)右側小腦出血
 (D)左側腦幹出血




- (D) 58 下列何者不是受傷性腦傷 (traumatic brain injury)常見的併發症？
 (A)認知能力 (cognition) 失常 (B)癲癇 (seizure)
 (C)水腦症 (hydrocephalus) (D)低血壓 (hypotension)
- (B) 59 腦外傷病人於復健過程中可能會發生癲癇 (seizure)，以下敘述何者錯誤？
 (A)好發期約是受傷後 2 年內 (B)為預防癲癇發作而終身給藥是必須的
 (C) Carbamazepine 較不影響認知功能 (D)發生機率與腦傷的嚴重度與部位有關
- (B) 60 一位中風後病患可講句子，對話語句順暢 (fluent)，但內容空洞，常併有亂語 (paraphasia)，無法覆誦 (repetition)，無法命名 (naming)。請問此病患最可能之病變位置為何？
 (A)額葉 (frontal lobe) (B)顳葉 (temporal lobe)
 (C)頂枕葉 (parieto-occipital lobe) (D)角迴 (angular gyrus)
- (D) 61 截肢手術後，下列何者不屬於殘肢端 (stump) 疼痛的常見原因？
 (A)傷口感染 (B)殘肢端骨膜增生或骨刺形成
 (C)殘肢端神經末端受刺激或神經瘤形成 (D)殘肢端血管栓塞

- (B) 62 下列有關腹式呼吸的描述，何者有誤？
 (A)即利用橫膈呼吸 (B)以口吸氣 (C)吸氣時腹部鼓起 (D)吐氣時腹肌用力
- (C) 63 下列有關長期臥床缺乏運動可能出現的生理現象，何者為誤？
 (A)關節攣縮 (B)肌力下降 (C)血鈣濃度下降 (D)姿態性低血壓
- (B) 64 髖關節置換術 (total hip replacement) 後復健過程中，下列敘述何者錯誤？
 (A)避免翹二郎腿 (B)座椅越低越好
 (C)馬桶座墊須提高 (D)手術後三個月內不要騎自行車
- (C) 65 47 歲女性，主訴下肢神經症狀，其腰椎磁振造影 (MRI) 檢查，發現在第四、五節腰椎間後方出現異常 (圖左為 T1W 影像，圖右為 T2W 影像)，最有可能的診斷為：




- (A)腦膜瘤 (Meningioma) (B)神經瘤 (Neurogenic tumor)
 (C)椎間盤凸出 (Herniated intervertebral disc) (D)感染性脊椎炎 (Infectious spondylitis)
- (B) 66 以下何種心臟疾病患者不宜參與心臟復健訓練？
 (A)正位心臟移植 (B)急性不穩定心絞痛
 (C)安裝心臟節律器 (D)已接受心臟瓣膜置換手術之風濕性心臟病
- (A) 67 有關溺水病人之急救，下列何者正確？
 (A)最重要的病理性結果是缺氧
 (B)應儘早清除呼吸道的水分，儘速實施哈姆立克急救
 (C)應使用提下巴法打開呼吸道，且常規使用頸圈於每位溺水病患
 (D)急救溺水的病人，應從水中就開始做 CPR，然後一面游向岸邊
- (B) 68 下列何者並非小兒麻痺後期症候群 (Post-polio syndrome) 的處理方式？
 (A)學習節省能量的技巧 (B)增加運動量避免肌肉無力
 (C)輔具及支架的使用 (D)減輕體重
- (C) 69 下列那種治療對於腦性麻痺患者的肌肉痙攣 (spasticity) 並無證據顯示具有確定療效？
 (A)支架 (orthotics) (B)脊椎腔內 Baclofen 注射
 (C)高壓氧治療 (hyperbaric oxygen therapy) (D)肉毒桿菌毒素 (botulinum toxin) 注射
- (B) 70 一位中風病患併有右側偏癱與吞嚥困難，檢查發現食物會堆積 (pooling) 在右側之咽喉區，則下列何種治療最適當？
 (A)上聲門吞嚥手法 (supraglottic swallow) (B)頭傾斜至左側 (tilting of head to left side)
 (C)下巴內縮 (chin tuck) (D)孟德森吞嚥手法 (Mendelsohn's maneuver)
- (C) 71 下列何種病患不宜使用可傾斜靠背 (recline back support) 輪椅？
 (A)不能獨立移動身體重量 (shift weight) 的病人
 (B)長時間坐立造成腰痛或臀痛的病人
 (C)薦椎部患有壓瘡 (pressure sore) 的病人
 (D)常發生姿勢性低血壓 (postural hypotension) 的病人

- (A) 72 長期臥床會造成各種身體器官產生失動症候群 (immobilization syndrome)。下列何者不屬於其中症狀？
 (A) 休息心跳率減低 (B) 廢用性肌肉萎縮
 (C) 骨質密度下降 (D) 沈積性肺炎 (hyostatic pneumonia)
- (C) 73 43 歲張太太覺得近來常常頻尿，下腹腔有些腹脹而到婦產科求診。醫師為她做腹部超音波檢查發現卵巢腫瘤，進而做電腦斷層攝影 (如圖示)。則她最可能患有何病？



- (A) 卵巢囊腫 (ovarian cyst) (B) 子宮外孕 (ectopic pregnancy)
 (C) 卵巢癌 (ovarian cancer) (D) 卵巢畸胎瘤 (ovarian teratoma)
- (D) 74 51 歲男性，無意間摸到右側頸部腫瘤。根據 MRI 之注射 Gd-DTPA 後的 T1WI with fat-suppression 影像 (如圖一、圖二)，最可能的診斷是：



圖一

圖二


- (A) Tongue carcinoma with neck metastatic lymphadenopathies
 (B) Buccal mucosal carcinoma with neck metastatic lymphadenopathies
 (C) Minor salivary adenocarcinoma with neck metastatic lymphadenopathies
 (D) NPC with neck metastatic lymphadenopathies

- (B) 75 24 歲男性病人主訴左肩部長期疼痛。圖 A 為本次就診之 X 光攝影，圖 B 為三個月前之 X 光攝影。最可能的診斷為：

AP Shoulder(圖 A)



AP Shoulder(圖 B)



- (A) Chronic injury of left supraspinatus tendon
 (B) Chronic anterior dislocation of left shoulder
 (C) Chronic posterior dislocation of left shoulder
 (D) Avascular necrosis of left humeral head
- (A) 76 一位 75 歲男性由家人陪伴入急診就醫。主訴為 30 分鐘前開始出現突發性腹痛以及冒冷汗 (diaphoresis)，無嘔吐與腹瀉症狀。病人有末期腎病，規則做血液透析。2 年前曾經心肌梗塞做過心導管以及支架置放。無腹部開刀史。理學檢查發現體溫為 36.8°C，腸音稍慢，無明顯腹部壓痛，肛門檢查正常。心電圖顯示為心房顫動，心跳約 80~120/min，無明顯缺血變化。腹部超音波與 X 光檢查 (KUB) 皆無發現明顯異常。因病人疼痛難耐經給予多次止痛藥後，腹痛仍無改善。依以上病史與臨床表現，你認為以下何種疾病最有可能？
- (A) 腸繫膜缺血 (mesenteric ischemia)
 (B) 腸阻塞 (intestinal obstruction)
 (C) 急性膽囊炎 (acute cholecystitis)
 (D) 急性腸胃炎 (acute gastroenteritis)
- (B) 77 承上題，以下何者為診斷此疾病的最正確檢查？
- (A) 電腦斷層血管攝影 (computed tomography angiography)
 (B) 傳統血管攝影 (conventional angiography)
 (C) 血液乳酸 (lactate)
 (D) 彩色都卜勒超音波 (color Doppler sonography)
- (D) 78 世界醫學會所制定的赫爾辛基宣言 (Declaration of Helsinki) 中，對人體研究的考量，下列何者除外？
- (A) 唯有在研究目的之重要性大於被實驗主體可能身受的風險時，醫學研究才可以進行
 (B) 唯有被研究的族群，可能從此研究成果中獲益時，此醫學研究才有其執行之價值
 (C) 研究對象必須是志願參加，並充分瞭解研究內容，才得以參與該項研究計畫
 (D) 研究內容並不包括可辨識之人類資料

- (A) 79 眼科張醫師看針眼病人時，常遇到病人很怕痛，但不治療針眼又會持續的擴大，所以他必須用比較間接的方法；趁著做眼睛檢查時，在病人比較不注意的時候，進行麥粒腫切除術。這也是爲了病人好才進行這樣的一個動作，不能怪他沒有跟病人講清楚，這樣的想法對不對？
- (A) 不對，任何醫療行爲都要事先取得病人同意
 - (B) 還好，簡單醫療行爲不用事先取得病人同意
 - (C) 還好，簡單醫療行爲可以事後再取得病人同意
 - (D) 還好，簡單醫療行爲只要事後取得病人口頭同意即可
- (B) 80 林先生幾次進出醫院治療他復發的鼻咽癌，但狀況一直變壞，於是他就跟主治醫師陳醫師多次的討論，有關他最後無法靠他自己的力量維持生命時的狀況，陳醫師當然跟他解釋了各式各樣的可能，林先生跟家人商討，決定如果在最後危急時，他不要做任何的插管，希望能夠安詳的離開人世間，陳醫師也表達會尊重他的意願。此時陳醫師應該建議林先生進行何種程序？
- (A) 簽署安樂死意願書
 - (B) 簽署不施行心肺復甦術意願書
 - (C) 請家屬簽署安樂死意願書
 - (D) 請家屬簽署加工自殺意願書

點
建
國

【版權所有，重製必究！】