

《內外科護理學》

- (B) 1. 陳先生T3~T5脊髓損傷，目前血壓250/140 mmHg，心跳50~55次/分，有大量出汗情形，主訴頭部嚴重疼痛、看東西模糊，超過6小時以上未解尿，陳先生可能發生何種現象？
- 神經性休克
 - 自主神經過度反射
 - 脊髓自動症
 - 脊髓休克
- (B) 2. 有關重症肌無力之敘述，下列何者正確？①屬於自體免疫疾病，體內產生攻擊ACh接受器的抗體 ②第一型僅侵犯眼肌，造成複視和眼瞼下垂 ③四肢肌肉的無力發生在遠端和下肢且為不對稱 ④當侵犯肋間肌，通氣容積會減少，嚴重呼吸困難致死
- ①②③
 - ①②④
 - ①③④
 - ②③④
- (C) 3. 有關腦膜炎病人接受腰椎穿刺檢查，下列敘述何者錯誤？
- 懷疑顱內壓升高時不宜執行腰椎穿刺
 - 腰椎穿刺是將穿刺針由第三與第四腰椎椎間垂直穿入
 - 腦脊髓液分析會出現總蛋白質減少及葡萄糖增加
 - 正常之腦脊髓液壓力為70~180 mmH₂O
- (D) 4. 有關不同類型腦中風發作之比較，下列敘述何者錯誤？
- 暫時性缺血發作是血栓型腦中風之警訊
 - 栓塞型腦中風的臨床症狀會突然發生
 - 出血性腦中風會有劇烈頭痛前驅症狀
 - 缺血性腦中風通常發作於活動時
- (C) 5. 病人跌倒造成腦部枕葉受損時出現的症狀，下列何者正確？
- 無法控制情緒
 - 無法辨識本體感受
 - 無法解析所看見的東西
 - 近、遠期記憶受損
- (A) 6. 有關急性胰臟炎的敘述，下列何者正確？
- 因膽道疾病導致膽汁與胰液逆流而引起
 - 穆菲氏徵象 (Murphy's sign) 是常見表徵
 - 康復期應採高脂飲食
 - 血清中鈣濃度通常會升高
- (A) 7. 有關口服膽囊攝影檢查 (oral cholecystography) 的敘述，下列何者正確？
- 檢查前需採低脂飲食
 - 急性膽囊炎為適應症之一
 - 檢查前30分鐘服下含碘顯影劑
 - 檢查後若排尿有燒灼感代表出現泌尿道感染
- (B) 8. 有關口腔癌的敘述，下列何者正確？
- 發生部位以上顎黏膜最多
 - 以鱗狀上皮細胞癌最常見
 - 咀嚼不順為常見早期徵象
 - 口腔有無痛且不易癒合的潰瘍為常見晚期徵象
- (A) 9. 肝性腦病變可能出現的臨床表徵，下列何者錯誤？
- 深腱反射消失
 - 肌肉僵直、抽搐發作
 - 巴賓斯基反射 (Babinski's sign) 陽性
 - 非昏迷期會出現手掌撲翼樣震顫 (asterixis)
- (A) 10. 因闌尾炎破裂而懷疑有腹膜炎病人之臨床表徵，下列何者正確？
- 觸診腹部僵硬
 - 強烈的反彈痛
 - 腸蠕動音增加
 - 腹部叩診為實音
- ①②
 - ①④
 - ②③
 - ③④
- (D) 11. 病人因左側股骨骨折而接受石膏制動之治療，下列敘述何者錯誤？

- A.上石膏前， 部位皮膚要用石膏襪套及棉墊包覆
 B.石膏乾燥過程中， 左側上石膏處不要覆蓋衣物
 C.左側肢體如果出現6P， 表示可能有腔隙症候群
 D.皮膚如果出現瘀斑， 表示可能有低血容性休克
- (C) 12.有關不同關節炎之比較， 下列何者正確？
 A.類風濕性關節炎是一種與老化有關的疾病
 B.退化性關節炎是一種嘌呤代謝異常的疾病
 C.痛風性關節炎好發於男性四肢遠端關節
 D.退化性關節炎好發於55歲以上女性周邊小關節
- (A) 13.有關急性中耳炎的醫療處置， 下列何者錯誤？
 A.抗生素的使用要持續3~ 5天
 B.疼痛發燒可使用解熱鎮痛劑
 C.鼓膜腫脹時可行鼓膜切開術（ myringotomy）
 D.使用減輕鼻充血藥物， 幫助耳咽管功能恢復
- (A) 14.下列何種病毒與罹患鼻咽癌有關？
 A.EB病毒（ Epstein-Barr virus）
 B.COVID-19病毒（ Coronavirus Disease-2019）
 C.A型流感病毒（ Influenza A virus）
 D.B型流感病毒（ Influenza B virus）
- (A) 15.有關病人使用青光眼用藥Timolol的護理指導， 下列何者錯誤？
 A.是一種縮瞳劑
 B.可減少眼球內房水量
 C.氣喘病人禁止使用
 D.給藥前需評估是否有心搏徐緩
- (A) 16.有關心包膜炎照護之敘述， 下列何者不適宜？
 A.鼓勵病人採平躺及深呼吸， 以減緩胸痛 B.發燒時應臥床休息， 以減少心肌耗氧量
 C.退燒藥可使用阿斯匹靈（ Aspirin） D.提供高蛋白、高醣飲食
- (C) 17.有關血栓性靜脈炎之評估與照護原則， 下列敘述何者錯誤？
 A.病人足背屈曲時， 腓腸肌會產生疼痛
 B.口服Coumadin可預防及治療靜脈血栓
 C.應定期按摩病人患肢， 以促進靜脈循環
 D.協助病人抬高患肢， 可減輕炎症及疼痛
- (A) 18.有關慢性靜脈功能不全引起的鬱滯性潰瘍（ stasis ulcer） 的肢體評估， 下列敘述何者正確？ ①潰瘍部位多發生於足踝內側 ②皮膚出現色素沉著 ③肢體呈現凹陷性水腫 ④趾甲變厚 ⑤腳趾潰瘍
 A.①②③ B.①④⑤ C.②③⑤
 D.③④⑤
- (B) 19.有關心因性休克護理重點之敘述， 下列何者錯誤？
 A.依醫囑使用促進心臟幫浦之藥物
 B.使用溫熱療法（ 如電毯） 提高全身周邊循環血量
 C.為提高心輸出量， 必要時協助放置主動脈內氣球幫浦（ IABP）
 D.給予氧氣使用
- (C) 20.下列何者為右心衰竭的臨床表徵？
 A.呼吸困難
 B.粉紅色泡沫痰
 C.下肢水腫
 D.少尿或無尿
- (C) 21.惡性腫瘤細胞與正常細胞的不同特性之比較， 下列何者正確？ ①細胞缺乏接觸抑制 ②細胞可快速增殖 ③細胞未分化狀態 ④當需要更多細胞時會發生增殖 ⑤黏著性低而活動力高
 A.①②③ B.①③④ C.①③⑤
 D.②④⑤
- (A) 22.王老太太背部骨骼疼痛就醫， 醫生懷疑是多發性骨髓瘤， 請依序回答下列3題。下列何者為確定診斷的主

要標準？

- A.骨髓內漿細胞比例為40%
 - B.血清IgG 為2 gm/dL
 - C.X光檢查發現有骨頭侵蝕現象
 - D.IgA < 0.1 gm/dL
- (B) 23.王老太太因便秘、意識不清，家屬送至急診求治，發現有心律不整的問題，下列何者是王老太太最有可能發生的問題？
- A.高血磷 B.高血鈣 C.高血鉀 D.高尿酸
- (D) 24.王老太太意識恢復後，針對其目前的問題，下列護理措施何者正確？
- A.鼓勵多喝牛奶
 - B.限制水份補充
 - C.給與Allopurinol藥物治療
 - D.給與Zometa藥物治療
- (D) 25.有關病人接受靜脈輸注化學藥物時，若不慎藥物外滲之護理措施，下列何者正確？
- A.停止輸注並立即拔除針頭
 - B.應予以放低注射部位
 - C.以彈繃加壓注射部位
 - D.注射解毒劑於滲漏部位四周
- (A) 26.有關成年惡性淋巴瘤病人接受骨髓穿刺抽吸術檢查之敘述，下列何者錯誤？
- A.穿刺部位宜選擇肋骨、脊椎或脛骨
 - B.檢查結果有助於了解造血組織有無異常
 - C.穿刺部位以紗布敷蓋並至少直接加壓5分鐘以上
 - D.檢查後要注意是否有出血或感染
- (C) 27.王先生常年受過敏所苦，想要知道那種過敏原引起過敏反應，下列何項診斷檢查最合適？
- A.伍氏燈檢查 (Wood's light test)
 - B.免疫螢光試驗 (immunofluorescence test)
 - C.刮畫試驗 (scratch test)
 - D.皮膚切片檢查 (skin biopsy)
- (C) 28.長期臥床病人採仰臥姿勢時，下列何者是皮膚壓力性損傷較不常發生的部位？
- A.肩胛骨 B.尾骶骨 C.坐骨結節 D.腳跟
- (A) 29.吳太太因腫瘤接受化學治療，口腔出現疱疹性齒齦口腔炎 (herpetic gingivostomatitis)，下列敘述何者正確？
- A.由單純性疱疹第一型病毒 (HSV-I) 感染所致
 - B.抗濾過性病毒藥物，如Acyclovir，於症狀嚴重時使用，以免副作用產生
 - C.患處水泡可擠壓排除液體後應立即清潔乾淨
 - D.進食後待口腔潰瘍處不痛後再進行口腔護理
- (B) 30.有關類風濕性關節炎藥物治療之敘述，下列何者正確？
- A.Aspirin能改變疾病的過程或防止關節的破壞
 - B.選擇性COX-2抑制劑適用於有腸胃道潰瘍病史的高危險病人
 - C.疾病調節抗風濕藥 (DMARDs) 為第一線用藥
 - D.抗瘧疾藥物 (奎寧類) 主要副作用在聽力損傷
- (C) 31.有關全身性紅斑性狼瘡 (SLE) 之臨床表徵，下列敘述何者錯誤？
- A.關節症狀包括發炎、疼痛、腫脹、僵硬等
 - B.心肺症狀，如心包炎、肋膜炎的發生，對病人預後影響很大
 - C.中樞神經不受侵犯，不必擔心病人認知問題
 - D.腎功能下降，應限制蛋白質、水分、鹽分的攝取
- (B) 32.王先生剛接受支氣管鏡檢查後返回病室，下列護理措施何者最適當？
- A.在接下來的 8小時內大量補充液體
 - B.進食前須先確認作嘔反射恢復
 - C.協助身體躺向健側以利肺擴張
 - D.靜脈注射Atropine以減少分泌物
- (A) 33.王先生使用呼吸器，突然呼吸器出現壓力過高警報，下列何者為可能的原因？
- A.呼吸器管路積水 B.呼吸器管路鬆脫 C.氣管氣囊漏氣 D.氣胸

- (B) 34. 有關早期氧合不足會出現的徵象或症狀，下列何者最可能？
A. 皮膚發紺 B. 躁動不安 C. 低血壓 D. 心搏過緩
- (A) 35. 李先生因肺結核服用ethambutol (EMB) 治療，下列敘述何者正確？
A. 需注意視力模糊及紅綠色盲等副作用
B. 尿液會呈現橘紅色
C. 補充Vitamin B6可預防藥物副作用
D. 必須與制酸劑併用
- (D) 36. 有關肺栓塞造成的通氣與灌流比失衡 (ventilation and perfusion mismatch) 之敘述，下列何者正確？
A. 肺泡與血管間的隔膜增厚，使得氧氣無法擴散進入血流中
B. 細小氣管內有大量濃稠的痰液，阻礙肺泡的通氣
C. 大部分的肺中有充分的血流灌注，但肺泡中未能有足夠的氣體可進行交換
D. 肺泡中有足夠的通氣，但肺中有部分區域血流灌注受阻下降
- (C) 37. 提供腎絲球過濾率為17 mL/min/1.73 m²的病人之護理指導，下列何者正確？
A. 應攝取高鉀食物，以預防因低血鉀導致肌無力 B. 鼓勵多攝取蛋白質，以維持體力提升免疫力 C. 若皮膚乾燥導致搔癢可用calamine lotion減緩
D. 鼓勵病人每日補充水份3,000 mL，以維持腎臟灌流
- (B) 38. 有關感染性膀胱炎導因之敘述，下列何者最不適當？
A. 常見致病菌之一為大腸桿菌
B. 男性因為尿道較長易致膀胱細菌滋生
C. 膀胱炎導因常見為上行性細菌感染
D. 前列腺肥大影響排尿易致膀胱細菌滋生
- (B) 39. 有關泌尿道檢查之敘述，下列何者正確？
A. 尿流速檢查的病人，須於檢查前禁食
B. 腎動脈攝影術檢查的病人，檢查後應多喝水
C. 靜脈腎盂攝影術檢查的病人，檢查中採俯臥姿勢
D. 經皮腎臟組織切片檢查的病人，檢查中採截石臥姿
- (A) 40. 預防腎功能不全病人血鉀過高之飲食護理指導，下列何者正確？
A. 避免熱量攝取不足或長期饑餓 B. 建議多攝取雞精用來補充營養 C. 需要多使用低鈉鹽或薄鹽醬油 D. 建議多吃水果乾減少水分攝取
- (B) 41. 趙小姐，45歲，無特殊疾病，近來健檢時發現有輸尿管結石約1.8公分，醫師建議行輸尿管鏡碎石術，下列敘述何者錯誤？
A. 沒有傷口但術後要放置導尿管 24~72小時
B. 此為門診手術，但必須接受全身麻醉
C. 若無特殊限制，術後鼓勵多喝水以利碎石排出
D. 術後有嚴重發燒或是嚴重血尿的病人應速回診
- (C) 42. 有關副甲狀腺功能低下之敘述，下列何者正確？
A. 因高血鈣出現沃斯特克氏 (Chvostek's) 徵象，導致肌肉痙攣
B. 因低血磷導致手指顫抖
C. 可能會有急性抽搐，導致咬傷舌頭及呼吸道阻塞
D. 因身體出現酸中毒，導致手足抽搐症狀惡化
- (B) 43. 有關嗜鉻細胞瘤切除手術後之護理措施，下列何者錯誤？ A. 注意有無腎上腺功能不全的徵象，必要時由靜脈輸注皮質醇 B. 監測每小時尿量，維持尿量在20~25 c.c./小時
C. 觀察術後出血情況與腸蠕動狀態
D. 依醫囑給與靜脈輸液，以維持體液容積
- (A) 44. 有關腦下垂體前葉功能低下之敘述，下列何者錯誤？
A. 席漢氏症候群 (Sheehan's syndrome) 發生於腦下垂體切除的病人
B. 以生長素 (growth hormone) 缺乏最常見
C. 病人可能會有軟弱無力、血糖偏低等臨床表徵
D. 病人可能會有黏液水腫症狀
- (C) 45. 劉女士因血糖控制不佳入院，下列病人平日之飲食攝取比例，何者不適宜？ ①碳水化合物類的食物約占每日總熱量的50~60% ②脂肪類的食物約占每日總熱量的5~10% ③飽和脂肪類的食物小於7% ④

蛋白質類的食物約占每日總熱量的30~ 35%

- A.①② B.①③ C.②④
D.③④

- (A) 46. 格雷氏病 (Grave's disease) 會出現下列何種臨床表徵? ①神經質 ②眼球突出 ③怕冷 ④手指顫抖
⑤脛前凹陷性水腫
A.①②④
B.①③⑤
C.②③⑤
D.③④⑤
- (C) 47. 有關過敏性休克之敘述, 下列何者正確?
①接觸的過敏原可能來自藥物、食物、昆蟲叮咬等
②發生嚴重支氣管擴張及呼吸困難
③脈搏次數增快、血壓可能正常或降低
④通常可立即注射 epinephrine改善情況
A.①②③ B.①②④ C.①③④ D.②③④
- (A) 48. 有關有機磷中毒臨床處置之敘述, 下列何者錯誤?
A. 給予Apomorphine是因此藥為有機磷中毒的拮抗劑
B. 進行胃灌洗、應維持呼吸道通暢必要時給與插管
C. 其可從皮膚吸收, 照護者須戴口罩、手套及穿隔離衣
D. 對於沾有嘔吐物的衣物應除去並協助沐浴
- (A) 49. 有關病人誤食強鹼溶液之處置, 下列何者錯誤?
A. 立即給與胃灌洗
B. 不可給與中和劑
C. 疑似胃潰瘍應先採取禁食
D. 注意口腔與食道之灼傷
- (A) 50. 有關H1N1流感之敘述, 下列何者錯誤?
A. 病原菌屬於H型流感病毒
B. 大部分病人症狀輕微, 一週內可痊癒
C. 主要經由飛沫與接觸傳染
D. 治療藥物為Tamiflu及Relenza

【版權所有，翻印必究】