

《產兒科護理學》

- B 1 生產是家庭關係重新開始的重要一環，下列何項醫療院所的政策有助於此理念的推展？
(A)禁止家庭成員參與生產
(B)若沒有合併症，提倡早期出院
(C)為避免感染，嬰兒必須待在嬰兒室
(D)在完成新生兒點眼藥後再進行第一次母乳哺餵

D 2 產科護理師針對護理照顧內容進行討論，並發展及驗證合適的護理措施，藉以提升專業之照護品質，是屬於下列何種角色功能？
(A)支持者 (B)教育者 (C)諮詢者 (D)研究者

B 3 姜女士懷孕 12 週，最後一次月經 (LMP) 為民國 104 年 2 月 25 日，懷孕前月經週期均約 30 天左右，其預產期約在何時？
(A) 104 年 11 月 1 日 (B) 104 年 12 月 2 日 (C) 104 年 10 月 4 日 (D) 105 年 1 月 2 日

D 4 有關精液分析檢查的說明，下列何者錯誤？①禁慾 3~7 天再採檢 ②使用保險套和性交中斷法來收集精液 ③留取精液後 2~3 小時內送至檢查地點 ④精液必須冷凍保存
(A)①② (B)③④ (C)①③ (D)②④

A 5 孕期婦女需增加碘的攝取，主要促進胎兒何部分的發育？
(A)腦部神經發育 (B)肺泡細胞發育 (C)腎上腺發育 (D)腸道細菌叢發育

A 6 有關胚胎與胎兒的發育，下列敘述何者正確？
(A)細胞分裂最繁忙、快速的時期為胚胎期
(B)胚胎發育最容易受外在刺激，而導致畸形的時期為 12~16 週
(C)胎兒愈成熟，皮下脂肪和胎毛愈多
(D)胎兒發育在第 6 個月開始有吞嚥能力，同時也開始產生胎便

A 7 胎兒生理活動評估 (Biophysical profile) 測試內容中以超音波評估的項目包括那些？
(A)胎兒呼吸、胎動、胎兒身體張力、羊水容積
(B)胎兒呼吸、臍帶血流量、胎兒體重、羊水容積
(C)胎兒心跳、胎動、臍帶血流量、胎兒體重
(D)胎兒心跳、胎動、臍帶血流量、胎兒身體張力

C 8 有關無壓力試驗 (Non-stress test) 的敘述，下列何者正確？
(A)胎心音維持在 140 下／分、變異性 < 5bpm，表示胎心音穩定，為反應型
(B)若出現 20 分鐘沒有胎動，則應馬上報告，緊急處理
(C)若 20 分鐘有 2 次以上胎動，胎動時心跳上升 15bpm 持續 15 秒，為反應型
(D)試驗期間約 20~30 分鐘，孕婦必須平躺以確保紀錄正確

- A 9 有關海洋性貧血的敘述，下列何者錯誤？
 (A)是一種體染色體顯性遺傳疾病
 (B)α型海洋性貧血是第16對染色體控制α型血球素製造的基因缺損
 (C)β型海洋性貧血是第11對染色體控制β型血球素製造的基因缺損
 (D)要根治β型海洋性貧血的唯一方法是骨髓移植
- D 10 5歲小美詢問媽媽：「為什麼妹妹會住在媽媽的肚子裡面，妹妹可以出來和我見面嗎？」護理師給予母親的建議，下列何者最適當？
 (A)小美目前對懷孕尚無法理解，可等她上小學後再給予說明
 (B)小美可能很焦慮，需要媽媽多陪伴她
 (C)小美可能想知道生產過程，可帶她參觀產房
 (D)小美可能對懷孕過程好奇，可用圖畫書說明懷孕過程
- D 11 有關護理師進行新生兒抽吸之敘述，下列何者正確？
 (A)新生兒維持仰臥，頭部抬頭15度
 (B)抽吸管放入口腔時，持續保持壓力抽吸
 (C)抽吸壓力為150~200 mmHg
 (D)過度抽吸會造成新生兒心跳速率減低
- C 12 有關生產時會陰消毒原則，下列何者錯誤？
 (A)由陰阜開始往上至下腹部
 (B)由腹股溝內側至大腿前半段
 (C)由肛門口開始至尿道口
 (D)通常採用水溶性優碘
- C 13 下列何者為運用門闈理論來緩解宮縮疼痛不適的措施？
 (A)聽音樂
 (B)溫水淋浴
 (C)尾骶骨按摩
 (D)注意力集中法
- A 14 高女士第一胎，待產時子宮收縮每5~7分鐘一次，持續時間30~40秒，強度為輕微~中度，子宮頸口為2~3公分，少許陰道出血，尚未破水，神情顯得愉快。此時適宜的護理指導為何？
 (A)教導經常記得排空膀胱
 (B)教導禁食以防嘔吐
 (C)建議絕對臥床休息，禁止下床走動
 (D)建議施行人工破水以助於胎頭下降
- A 15 高女士已超過預產期3天，醫師建議入院引產，下列敘述何者正確？
 (A)比夏計分(Bishop score)≥6分，引產較可能成功
 (B)使用催產素(oxytocin)會增加排尿量，需觀察輸出入液量
 (C)前列腺素主要是刺激血管平滑肌，促使子宮規律收縮
 (D)若胎位不正時建議採人工破水引產
- B 16 產婦於第三產程後，依醫囑施打宮縮藥物(Methergine®, Ergonovine)。護理師於下列何種情況需停止給藥？
 (A)主訴全身發熱
 (B)血壓150/100 mmHg
 (C)呼吸不規則
 (D)脈搏68~72次/分
- D 17 胎兒預估體重3200公克，胎位(Fetal Position)為枕後位(OP)，下列敘述何者正確？①子宮收縮力比較弱 ②第一產程時間較長 ③先露部下降較快 ④子宮頸擴張較慢
 (A)①②
 (B)①③
 (C)②③
 (D)②④
- A 18 李女士G₃P₀，已入院待產12小時。她說：「我好想用力哦！」，此時護理師最佳的評估是下列何者？
 (A)先幫妳內診，了解目前狀況是否適合用力
 (B)這是待產正常的感覺，可以側躺比較舒服
 (C)這表示即將要生產了，現在立刻送妳進產房
 (D)現在深吸一口氣，朝著陰道方向用力10秒鐘

- C 19 黃女士 G₁P₁，陰道生產，第一天親子同室時，仔細的觀察新生兒並詢問其外觀特性，此時護理師的反應何者最為適當？
- (A)詢問她對親子同室的看法及新生兒像誰 (B)儘快教導她如何照顧新生兒及哺餵母乳
(C)讓她有充分的時間認識及熟悉新生兒 (D)建議她避免抱新生兒，以免子宮下垂
- A 20 有關母乳哺育的護理指導，下列何者正確？
- (A)成熟乳的後奶較前奶含較多的脂肪內容物 (B)生理性黃疸是哺乳的禁忌
(C)初乳含有很多的脂肪，所以熱量很高 (D)母乳中酪蛋白與乳清蛋白的比例較牛乳高
- A 21 協助產婦產後第一次下床活動，須優先進行何項護理評估？
- (A)生命徵象 (B)子宮收縮 (C)小便自解 (D)乳汁分泌
- B 22 王女士採陰道生產，問護理師：「我什麼時候可以裝子宮內避孕器？」下列回答何者正確？
- (A)產後隨時可以 (B)產後 4~6 週 (C)月經來潮時 (D)月經來前 1 週
- C 23 有關產後腸蠕動功能的評估，下列何者錯誤？
- (A)以聽診器在腹部的四個象限評估 (B)正常的腸蠕動音為每分鐘 5 至 34 次
(C)叩診時出現鼓音表示腸蠕動良好 (D)產後腹壓減少會減緩腸蠕動
- B 24 林女士採陰道生產，會陰四度裂傷。在產後第 2 天可以教導她執行何項產後運動？
- (A)膝胸臥式運動 (B)乳（胸）部運動 (C)抬腿運動 (D)仰臥起坐
- D 25 王女士為第二胎，採陰道生產，新生兒體重 3980 公克，抱怨子宮收縮痛，護理師評估子宮收縮呈堅硬狀態。有關產後痛的說明，下列何者錯誤？
- (A)疼痛是因子宮產生間歇性收縮所致 (B)經產婦會較初產婦子宮收縮疼痛明顯
(C)新生兒較大者子宮收縮痛會較明顯 (D)子宮收縮疼痛感通常會持續 3 週
- C 26 承上題，提供王女士產後痛的護理措施，下列何者為宜？
- (A)教導持續按摩子宮 (B)下腹部冰敷 (C)教導深呼吸 (D)依醫囑給與子宮收縮劑
- B 27 林小妹，出生 2 個月，體重 5 公斤，每 4 小時餵食配方奶一次，請問每次應餵食多少 c.c.？
- (A) 120 (B) 150 (C) 180 (D) 210
- B 28 有關新生兒呼吸系統之敘述，下列何者錯誤？
- (A)因內在刺激影響主動脈與頸動脈之接受器傳導到呼吸中樞引發呼吸
(B)陰道生產較剖腹生產的新生兒易發生短暫的呼吸窘迫
(C)因外在環境溫度刺激傳導到呼吸中樞引發呼吸
(D)表面張力素可預防肺部塌陷
- A 29 有關女性新生兒生殖器之成熟度評估，下列何者最成熟？
- (A)大陰唇覆蓋陰蒂及小陰唇 (B)陰蒂及小陰唇均突出
(C)大陰唇變大及小陰唇變小 (D)陰蒂突出及小陰唇平坦
- C 30 有關新生兒黃疸的敘述，下列何者正確？
- (A)生理性黃疸於出生 24 小時內出現，1 週左右達到高峰，然後逐漸下降
(B)多數新生兒黃疸是屬於母乳性黃疸，建議應停餵母奶，改用母乳代用品
(C)足月兒生理性黃疸發生率低於早產兒發生率
(D)因 Rh 或 ABO 血型不合所發生的溶血，是導致生理性黃疸的主因

- C 31 有關糖尿病婦女於妊娠期間護理措施之敘述，下列何者正確？
(A)監測胰島素的需要量，若需要量未隨孕程增加，表示飲食計畫成效佳
(B)避免夜裡發生高血糖症，睡前點心不可含碳水化合物
(C)妊娠末期可藉由每週一次無壓力試驗，來確認胎盤功能
(D)由羊水中卵磷脂與抱合髓磷脂之比值，確認胎兒有無神經管缺損問題
- B 32 有關孕婦缺鐵性貧血之敘述，下列何者錯誤？
(A)新生兒出生後採延遲斷臍 (B)補充鐵劑應於飯前服用以利吸收
(C)鐵劑可與維生素 C 同時服用以利吸收 (D)鼓勵多攝取紅色肉類及深綠色蔬菜
- C 33 有關妊娠糖尿病的敘述，下列何者錯誤？
(A)採飲食控制或合併 insulin 使用 (B)易發生胎兒畸形或巨嬰
(C)宜控制糖化血色素在 7.5% 以下 (D)孕期高血糖常導致酮酸中毒症
- C 34 下列何者為嚴重產後出血的徵象？
(A)收縮壓與舒張壓均下降 15 mmHg (B)心跳次數為 60 次／分
(C)失血超過 1000 c.c. (D)體溫為 100.6°F
- C 35 下列何者為罹患乳癌的高危險群？①長期使用雌激素及黃體激素 ②母乳親餵 ③維持身體質量指數（BMI）於 23 ④從未懷孕
(A)①② (B)③④ (C)①④ (D)②③
- A 36 有關子宮移位之敘述，下列何者錯誤？
(A)最常見為前傾 (B)因骨盆支持結構無力所致
(C)鼓勵採膝胸臥式 (D)比較不容易受孕
- A 37 最常導致婦女泌尿道感染的病原體為何？
(A)大腸桿菌 (B)白色念珠菌 (C)梅毒螺旋體 (D)陰道鞭毛滴蟲
- B 38 有關生殖器疱疹之敘述，下列何者正確？
(A)大多為第一型單純疱疹病毒 (B)可以哺餵母奶
(C)懷孕 20 週以後感染會造成畸胎 (D)宜採陰道生產
- C 39 晚期子宮頸癌病人接受放射線治療及 Cisplatin 化學治療後感覺耳鳴及聽力喪失，下列敘述何者錯誤？
(A)教導病人使用手套或圍巾避免冷的刺激
(B)嚴重時需降低化學治療藥物劑量
(C)此症狀為放射線治療導致細胞 DNA 鍵斷裂
(D)此症狀為因化學治療而引起的周邊神經性病變
- D 40 有關陰道正常分泌物的敘述，下列何者錯誤？
(A)主要功能是濕潤陰道 (B)反應陰道生態環境平衡的指標
(C)又稱為白帶（leukorrhea） (D)經期前或孕期時量會減少
- C 41 兒科護理師的角色和功能，下列敘述何者錯誤？
(A)了解各年齡層兒童的正常生長發育過程 (B)了解國家對嬰幼兒保健的政策發展
(C)促進 12 歲以下兒童的身體健康為主 (D)依據研究實證結果改善兒童與家庭的照護
- C 42 衛生福利部國民健康署，2013 年提倡嬰幼兒健康促進及保護計畫目標，針對 1~14 歲兒童之目標，期望減少那一項之死亡率？
(A)兒童重症腸病毒 (B)先天代謝性異常 (C)意外事故及傷害 (D)呼吸系統疾病

- A 43 幼兒長期大量接觸鉛，導致鉛中毒所產生的合併症，下列那一項最為嚴重且會造成不可逆的傷害？
 (A)中樞神經系統病變 (B)吞嚥困難、腹瀉 (C)紅血球過多 (D)呼吸衰竭
- A 44 執行嬰兒心肺復甦術時，下列何者錯誤？
 (A)於兩乳頭連線中央按壓 (B)使用兩手指進行按壓
 (C)按壓深度約 4 cm (D)按壓速率約每分鐘 100 次
- B 45 廷廷，4 歲，自前年冬天開始時常出現流鼻血現象，有關流鼻血時的護理指導，下列何者不適合？
 (A)協助維持頭向前傾的姿勢 (B)鼓勵將鼻血吞下而不要擤出
 (C)捏緊鼻樑加壓約 10 分鐘 (D)用冷毛巾敷於鼻樑上協助止血
- C 46 小傑，9 歲，罹患先天性心室中膈缺損（VSD），此次利用暑假期間安排到醫院做心導管檢查，檢查後下列何項是小傑最大的壓力源？
 (A)擔心暑假作業寫不完 (B)擔心不能跟朋友一起玩
 (C)擔心身體受傷及疼痛 (D)擔心禁食及身體活動受限
- D 47 小銘，2 歲 6 個月，在接受丹佛 II 發展測驗（DDST-II）前，護理師向母親解釋進行此測驗的主要目的，除精細及粗動作的評估之外，還包含下列何者？
 (A)氣質及認知發展程度 (B)記憶及環境適應能力
 (C)性別及自我概念的發展 (D)社會適應及語言的發展
- B 48 筱華，5 歲，在幼兒園吃完午餐時，會模仿老師收拾餐盒，此行為表現依據艾瑞克森（Erikson）的理論，她的發展屬於何階段？
 (A)自主性（autonomy） (B)主動進取（initiative） (C)勤勉感（industry） (D)認同感（identity）
- A 49 李小妹，4 歲，在幼兒園上課時，經常是笑口常開，對於新同學與老師、玩具或活動均可以很快地接受，此行為表現為嬰幼兒氣質評估中的那一種項目？
 (A)趨避性 (B)反應閾 (C)堅持度 (D)反應強度
- B 50 為學齡前期兒童執行侵入性治療時，下列護理措施何者錯誤？
 (A)先讓病童認識給予治療的醫護人員
 (B)詳細解釋治療措施或解釋身體功能
 (C)在注射後以膠帶貼住注射部位
 (D)讓病童參與治療措施，給予選擇機會，以增加其自我控制感
- D 51 嬰幼兒疼痛評估，不包括下列那一項？
 (A)臉部表情 (B)呼吸型態 (C)肢體動作 (D)意識程度
- D 52 小維，自然產出生的足月兒。出生後的第二天，小維媽媽親餵母乳時發現小維皮膚呈現深黃色，血液檢驗報告其總膽紅素值（Total Serum Bilirubin）為 12 mg/dL。護理師初步的護理評估及判斷為何？
 (A)小維為嚴重的病理性黃疸，需換血治療 (B)小維可能會有不可逆的核黃疸腦部疾病
 (C)小維有母奶性黃疸，建議停止哺餵母奶 (D)小維有生理性黃疸，為新生兒常見的問題
- A 53 小萱，出生兩天的早產兒，曾有幾次呼吸暫停的現象，現在小萱的呼吸暫停警鈴響了，下列護理措施何者正確？
 (A)以手掌輕揉背部 (B)抽吸小萱的口鼻 (C)提供高濃度氧氣 (D)直接讓小萱俯臥
- D 54 文華，9 歲，罹患淋巴癌末期，目前已轉移至骨頭，主訴右髖骨處很痛，經評估疼痛強度為八分，有關疼痛的護理措施，下列何者較為適當？
 (A)依醫囑給予口服 Tinten，並使用冰枕冰敷右髖骨處
 (B)依醫囑給予口服 Ibuprofen，並使用熱水袋熱敷右髖骨處
 (C)依醫囑給予肌肉注射 Demeral，並按摩右髖骨處
 (D)依醫囑給予靜脈注射 Morphine，並以枕頭支托右髖骨處

- D 55 有關協助雙親面對新生兒死亡，下列護理措施何者最適當？
(A)為避免雙親與新生兒有過度依附，建議雙親在新生兒瀕死前，減少跟新生兒相處時間
(B)向雙親解釋新生兒如果還活著，可能會有發展遲緩的問題，死亡對新生兒而言比較不受苦
(C)確保雙親一定要在新生兒死後看他一眼，以減少父母親否認的情緒
(D)在新生兒瀕死前後，提供雙親機會抱自己的新生兒及鼓勵雙親與新生兒說話
- D 56 鐘小弟，妊娠週數 31 週又 5 天出生，體重 1560 公克，現出生後第三天開始由口餵食，下列何者不是他在進食過程中的壓力性行為線索（feeding stress cues）？
(A)吸不到 5 分鐘就不吸奶，睡著了 (B)呼吸喘，且鼻翼煽動，心跳變慢
(C)嗆奶，咳嗽，膚色改變 (D)會因為呼吸而中止吞嚥
- C 57 小明為小一學生，日前罹患水痘，校護對於小明返校上課的建議，下列何者適當？
(A)出疹後 5~6 天 (B)疹子化膿後 5~6 天
(C)疹子結疤乾燥後 7~8 天 (D)使用抗生素後 7~8 天
- C 58 小明，1 歲半，診斷為川崎氏症而住院治療。醫囑給予小明高劑量 Aspirin 100 mg/kg/day，及靜脈注射免疫球蛋白（intravenous immune globulin）2g/kg。下列護理指導內容，何者不適當？
(A)小明目前服用 Aspirin 為高劑量，目的為抗發炎與抑制血小板凝集
(B)給予病童換上透氣涼爽衣物，保護下肢水腫處，維持皮膚清潔、乾燥
(C)注射免疫球蛋白之後 3 個月，小明就可以接種任何疫苗
(D)小明半年內至少每個月一次宜接受心電圖檢查，以早期發現心臟合併症
- D 59 下列那一種對象是接種麻疹、腮腺炎、德國麻疹混合疫苗（MMR）的禁忌者？
(A)1 年前曾輸過血者 (B)靜脈注射高劑量免疫球蛋白 11 個月以上者
(C)4 個月前肌肉注射 B 型肝炎免疫球蛋白者 (D)預備 3 個月內懷孕的婦女
- B 60 小明，3 歲，發燒 38.5°C，哭鬧不安，胃口不好，活動力差，至小兒急診求治，診斷為急性鼻咽炎，有關小明的照護措施，何者較不適當？
(A)鼓勵病童多喝水或果汁及臥床休息
(B)鼻塞引起的呼吸費力是正常現象，請父母不必擔心
(C)教導父母注意室內環境的通風，避免飛沫傳染
(D)教導兒童少用手摸鼻子、嘴巴、眼睛，以降低感染風險
- D 61 有關兒童罹患黴漿菌性肺炎（mycoplasma pneumonia）的臨床表徵，下列敘述何者正確？
(A)病程進展非常快速，易出現 39°C 以上高溫
(B)常侵犯肺葉及肺小葉，聽診時會有呼氣末期囉音
(C)咳嗽明顯，痰液黏稠、量多，宜儘速痰液培養
(D)血清檢查可發現特定的抗體濃度升高，白血球數值可能正常
- A 62 有關學童發生氣喘會出現病理生理上的變化，下列敘述何者錯誤？
(A)血管通透性下降、細胞浸潤、呼吸道水腫 (B)顆粒性白血球、淋巴球、單核球細胞增加
(C)呼吸急促、新陳代謝增加、呼吸性酸中毒 (D)咳嗽、吐氣時間延長、呼氣末期喘鳴聲
- A 63 廖小妹，2 個月，罹患心室中膈缺損，因肺炎引發鬱血性心衰竭（congestive heart failure）而入院，下列那一項不屬於鬱血性心衰竭的臨床表徵？
(A)心跳過慢 (B)大量流汗 (C)四肢冰冷 (D)呼吸過速

- B 64 凱凱，5 歲，罹患法洛氏四重畸形（tetralogy of fallot;TOF），常出現有缺氧發作（blue spells），有關缺氧發作的臨床表徵，不包括下列何者？
(A)哭泣後出現發紺 (B)皮膚彈性減少呈黃色
(C)鞏膜因血管之鼓大呈灰色 (D)嘴唇口腔黏膜呈現暗藍色
- B 65 小華，5 歲，罹患大血管轉位（transposition of the great arteries;TGA），此次入院準備接受完全矯正手術。基於小華在心臟方面的認知，護理師應採取以下何種解釋方式較為適當？
(A)因小華對心臟認知不足，主要以父母親對心臟的認知為護理指導的範疇
(B)畫出人形和心臟的位置，說明手術後心臟會發出較規律清晰的蹦蹦聲
(C)畫出心臟四個腔室的外形，並解釋手術後心臟會如何把血打出去
(D)採開放式問題，並儘量口語化來討論靜脈、動脈及血液循環的功能
- D 66 盼盼，6 歲，罹患先天性心臟病，依醫囑服用毛地黃，下列何者不是毛地黃中毒的症狀？
(A)心跳變慢 (B)噁心、嘔吐 (C)頭痛、嗜睡 (D)抽搐、痙攣
- B 67 小華，7 歲，罹患重度型 β -海洋性貧血，定期接受輸血治療，有關其外觀的視診結果，下列敘述何者錯誤？
(A)體型矮瘦 (B)膚色蒼白 (C)塌鼻、頭大 (D)腹部腫大
- C 68 有關兒童感染人類免疫缺乏病毒（HIV）的途徑，下列何者錯誤？
(A)由產道接觸到 HIV 帶原母親的血液及分泌物
(B)產後經由 HIV 帶原母親的哺乳
(C)經由 HIV 帶原者親吻兒童的臉頰
(D)輸入被 HIV 感染的凝血因子
- C 69 郭小妹，妊娠週數 39 週又 4 天，自然產娩出，有關健康新生兒篩檢之時間安排，下列敘述何者正確？
(A)於出生滿 24 小時，或已完全由腸道進食 12 小時後
(B)於出生滿 36 小時，或已完全由腸道進食 24 小時後
(C)於出生滿 48 小時，或已完全由腸道進食 24 小時後
(D)於出生滿 72 小時，或已完全由腸道進食 12 小時後
- B 70 新生兒篩檢之代謝性異常疾病，若未及時治療，下列何者較不會影響智力的發展？
(A)苯酮尿症
(B)G-6-PD 缺乏症（Glucose-6-Phosphate Dehydrogenase）
(C)半乳糖血症
(D)先天性甲狀腺功能低下症
- A 71 章小妹，出生 3 天的是月兒，疑似罹患先天性腎上腺增生症，下列敘述何者錯誤？
(A)由檢查血中 19-KS（19-ketosteroids）的含量做診斷
(B)從外生殖器的觀察，不易分辨性別
(C)在早上補充皮質酮治療，以維持正常分泌
(D)皮質酮治療期間容易出現感染之副作用
- B 72 罷患胰島素依賴型糖尿病（IDDM）的 12 歲病童，參加營養衛教課，當病童能說出下列何者，表示護理師此次衛教已經成功？
(A)如果正餐時我不餓，我可以稍後再吃點心
(B)如果我正餐沒吃完，我就必須馬上補充些醣類的食物
(C)如果我正餐沒吃完，我需要注射多一點胰島素
(D)如果我正餐沒吃完，我可以在下一餐時增加些醣類的食物

- B 73 有關嬰兒吞嚥攝食的生理特性，下列敘述何者錯誤？
(A)新生兒是藉由吸吮反射及吞嚥反射來攝食乳汁
(B)嬰兒3~4週大時即會嘗試自主控制吞嚥動作
(C)嬰兒的下食道括約肌較為鬆弛故易有溢奶情形
(D)嬰兒4個月大時，自發性吸吮反射會消失
- B 74 林小妹，9歲，診斷為闌尾炎（Appendicitis）預進行盲腸切除手術。有關手術前後的護理措施，下列何者正確？
(A)術前持續評估疼痛型態，必要時給予口服非類固醇止痛劑（NSAID）
(B)持續腹部評估，若腹部肌肉有不自主收縮而僵硬如木板，疑有腹膜炎的危險
(C)術前宜禁食由靜脈點滴維持體液，術後試喝水無不適即可恢復進食
(D)術後若有引流管留置，需採平躺姿位，以利引流及防止感染逆行向上擴散
- C 75 有關先天性的氣管食道瘻管（Tracheoesophageal fistula）嬰兒，進行瘻管閉鎖及食道吻合術後之照護重點，下列敘述何者錯誤？
(A)需將嬰兒頭部抬高45~60度，以避免胃容物逆流
(B)使用安撫奶嘴，以免嬰兒哭泣造成胃腸壓力上升
(C)若鼻胃管滑脫應立即重新放置，以免胃液損及傷口
(D)抽吸管的長度不可超越傷口吻合處，避免吻合部位受傷
- D 76 有關輪狀病毒（rotavirus）感染引起的兒童急性腸胃炎，下列敘述何者正確？
(A)主要藉由飛沫傳染
(B)糞便棄置前需經漂白水消毒
(C)需使用抗生素治療
(D)常併有上呼吸道感染
- B 77 有關水腦病嬰接受腦室－腹膜分流術（V-P shunt）後的各項護理，下列敘述何者正確？
(A)頭圍測量方式：自枕部隆經耳垂至額頭上方
(B)觀察是否有噴射狀嘔吐或尖銳哭聲的發生
(C)協助病嬰採水平俯臥，以避免傷口受壓
(D)避免抱起病嬰餵奶，以防脊髓液引流通過快
- B 78 小明，7歲，在練習游泳時，被同學推入泳池中，因溺水而窒息，經救生員急救後，送醫院治療，目前懷疑腦幹及延髓受損，有關小明的呼吸型態，下列何者較可能出現？
(A)呼吸深且快速（過度換氣型態）
(B)喘息呼吸與暫停呼吸交替出現（陳施氏呼吸）
(C)呼吸偶而會出現深且聽得到嘔息聲（喟嘆式呼吸）
(D)呼吸會出現不規則的穿插呼吸暫停（運動式呼吸）
- A 79 小玲，出生3天，診斷為脊髓之脊髓膜膨出且合併有水腦症，有關其手術前的護理措施，下列敘述何者錯誤？
(A)維持垂頭俯臥姿勢，以利脊髓液回流
(B)協助其腿部呈外展，以預防髖關節脫位
(C)選擇質軟小孔的奶嘴餵食，以預防吞食過量空氣
(D)維持臀部及會陰部乾淨，以減少糞便污染膨出的囊
- A 80 雷氏症候群（Reye's syndrome）早期病變的主要徵象為何？
(A)嘔吐
(B)去大腦髓質僵直
(C)反射消失
(D)過度換氣