

《產兒科護理學》

- (A) 1 有關分娩期的支持性照護措施，下列何者較不適當？
 (A)提供待產婦女一致性常規醫療照護 (B)教導待產婦女及伴侶生產的相關知識
 (C)維持生產環境的燈光昏暗 (D)允許待產婦女自由選擇下床走動
- (B) 2 下列何種情況之孕婦最需要協助轉介遺傳諮詢？
 (A)姻親通婚者 (B)親妹有血友病
 (C)超音波發現胎兒過大 (D)先生有 B 型肝炎
- (D) 3 有關胎兒發育的描述，下列何者正確？
 (A)胎兒最內層的胚胎膜是羊膜，會與子宮的基底蛻膜形成胎盤
 (B)受孕後囊胚會立即植入子宮內膜，稱為著床，通常部位發生在子宮頸內口
 (C)受精後第 2~3 週由胎盤提供胚胎養分
 (D)黃體退化後，胎盤取代其功能分泌雌性素及黃體素
- (C) 4 有關懷孕時因雌性素增加，造成孕期常見的不適，下列敘述何者正確？
 (A)使膀胱鬆弛，產生頻尿 (B)使腸胃道活動力降低，產生心灼熱感
 (C)使陰道黏膜增生，陰道分泌物會增加 (D)使平滑肌放鬆，導致孕期容易便秘
- (C) 5 陳女士，懷孕 32 週，預計採陰道生產。下列何項為最有效的伸展會陰部肌肉之產前運動？
 (A)腰背伸展運動 (B)腹部強化運動 (C)蹲踞運動 (D)抬腿運動
- (B) 6 蔡女士 30 歲，懷孕 14 週，孕前身體質量指數 (BMI) 30 kg/m²，下列何者為最優先安排的檢查？
 (A)乙型鏈球菌 (B)血糖相關檢驗 (C)胎盤功能評估 (D)無壓力試驗
- (C) 7 李女士懷孕 14 週，產檢時詢問：「我從小就吃素，現在懷孕了，我在飲食上要注意什麼嗎？」下列回應何者較適當？
 (A)素食易缺乏維生素 A，可以多攝取深色蔬菜
 (B)素食易缺乏葉酸，可以多攝取綠色蔬菜
 (C)素食易缺乏維生素 B12，可以多攝取海苔海藻
 (D)素食易缺乏鈣，可以多攝取牛奶起司
- (C) 8 懷孕期愛滋血清試驗中，對於初篩連續兩次陽性反應之個案，衛生單位應聯繫孕婦進行下列那項措施？
 (A)以酵素免疫分析法 (Enzyme Immunoassay, EIA) 及核酸檢驗 (Nucleic Acid Test, NAT) 再次確認
 (B)以顆粒凝集法 (Particle-Agglutination Method, PA) 及抗體免疫層析 (Immunochromatographic Test) 再次確認
 (C)以核酸檢驗 (Nucleic Acid Test, NAT) 及抗體免疫層析 (Immunochromatographic Test) 再次確認
 (D)不須再檢測直接給予藥物治療
- (C) 9 王女士，因卵巢過度刺激症候群 (Ovarian Hyperstimulation Syndrome, OHSS) 住院安胎，腹水嚴重相當不舒服，且住院很多事不方便，但會說這是值得的，會努力配合治療。王女士正進行那些懷孕期發展任務 (maternal task)？①確保自己及胎兒在懷孕中能安全順利 ②使重要家人接受新生兒 ③學習貢獻自己 ④與胎兒連成一體
 (A)①② (B)②③ (C)①③ (D)③④
- (B) 10 有關衛生福利部國民健康署對婦女妊娠期體重增加之建議，下列敘述何者正確？
 (A)孕前身體質量指數 (BMI) < 18.5 的孕婦，總體重增加應控制在 7~11 公斤
 (B)孕前身體質量指數 (BMI) 18.5~24.9 的孕婦，總體重增加需 11.5~16 公斤
 (C)雙胞胎孕婦之建議增加總體重量為單胞胎之 2 倍
 (D)孕前身體質量指數 (BMI) 正常的孕婦，第二、三妊娠期體重宜增加 0.3 公斤/週
- (C) 11 張女士，G2P1，懷孕 40 週，子宮頸口擴張 8 公分，變薄 90%，如果出現宮縮強且胎頭迅速下降想用力，下列護理措施何者較不恰當？
 (A)請採哈氣，喘息呼吸 (B)協助側躺姿勢，減輕疼痛
 (C)指導產婦用力，保護會陰 (D)採跪趴姿勢，減少用力感受
- (B) 12 陰道分娩過程中，胎盤以暗紅色的粗糙面被牽引出陰道。有關此胎盤娩出的敘述，下列何者正確？

①希氏法 (Schultze mechanism) 娩出 ②鄧氏法 (Duncan mechanism) 娩出 ③較容易發生剝離不完全 ④較少發生剝離不完全

(A)①③ (B)②③ (C)①④ (D)②④

(C) 13 有關待產期間施行陰道內診的敘述，下列何者錯誤？

(A)過程中須注意無菌原則 (B)以食指及中指深入陰道內檢查
(C)於子宮收縮時進行檢查 (D)產婦採大腿彎曲且外展的姿勢

(B) 14 有關胎心率變異性減速的敘述，下列何者正確？

(A)胎心率在宮縮高峰時開始變慢，宮縮結束後則恢復到基準
(B)進行陰道內診確認臍帶是否受壓迫，必要時協助左側臥
(C)因子宮胎盤灌注過度導致胎血負荷過重所致
(D)為第二產程期間的正常現象，持續觀察即可

(C) 15 陳女士因陣痛入院待產，目前子宮頸口開 2 公分，Oxytocin 使用，宮縮每 6~7 分鐘一次，每次 20~30 秒，宮縮壓力：40~50 mmHg。主訴陣痛厲害無法忍受，下列措施何者最適當？

(A)向陳女士解釋，連絡醫師給予腰椎硬膜外麻醉止痛
(B)簽同意書，並協助醫師準備腰椎硬膜外麻醉止痛之用物
(C)根據陳女士宮縮壓力情形，給予按摩放鬆技巧以減輕疼痛
(D)向陳女士解釋，目前產程無法採用腰椎硬膜外麻醉止痛，可調快 Oxytocin

(A) 16 第一產程活動期的待產婦，每 3 分鐘宮縮 1 次，每次持續 45 秒，個案在宮縮的休息期，胎心率为 90 bpm，下列何項護理措施較適當？

(A)立即通知醫師 (B)正常，可繼續監測胎心率
(C)鼓勵個案在每次宮縮時繼續用力向下 (D)教導個案呼吸技巧

(C) 17 有關胎心音監測的敘述，下列何者正確？

(A)杜卜勒 (Doppler) 超音波可用來執行連續性監測胎心音
(B) Leopold 四段腹查的第三段觸診為確認胎背位置
(C)持續性的胎心音監測可得知胎心率基準線與週期性變化
(D)高危險待產婦女與胎兒，在第一產程的潛伏期應每 1 小時評估一次胎心率

(B) 18 剖腹產時，為減少藥物對胎兒的副作用，宜採用何種麻醉方式？

(A)靜脈注射麻醉劑法 (B)腰椎硬膜外麻醉法
(C)陰部阻斷法 (D)吸入性麻醉法

(A) 19 丁女士，使用催產素引產，以每小時 9 c.c.靜脈滴注，胎兒監視器顯示變異性減速，此時最優先之處置為何？

(A)停止催產素 (B)協助下床活動
(C)準備剖腹產 (D)密切觀察，不須特別處理

(D) 20 有關母乳中各種營養素對於新生兒成長作用之敘述，下列何者錯誤？

(A)寡糖可避免致病菌黏附在腸胃道用以避免腸胃道疾病
(B)中、長鏈不飽和脂肪酸有助於視網膜的發展
(C)乳鐵蛋白能與鐵結合，避免鐵質被腸道細菌利用
(D)酪蛋白可加強脂溶性維生素在腸胃道吸收的比例

(D) 21 黃女士 G2P2，大寶剛剛滿 2 歲，今天預計出院回家，產婦擔心同時照顧 2 個孩子會心力交瘁，下列何者有關黃女士的親子依附關係出現時，最需要特別關注與持續追蹤？

(A)大寶睡覺時，抱著新生兒目不轉睛盯著看 (B)同時以乳房安撫大寶及新生兒
(C)在新生兒睡覺時，唸書給大寶聽 (D)除了哺餵新生兒，其他時間都請月嫂照顧

(D) 22 坐月子期間純母乳哺餵的母親表示：「為什麼寶寶一喝完奶就解便、大便總是稀稀糊糊的？」下列護理指導何者最適當？

(A)最可能是新生兒對母乳過敏，建議改用水解配方奶
(B)後奶含豐富乳糖，乳糖刺激新生兒胃結腸反射，而產生帶酸味的稀糊便
(C)因坐月子期間母親攝取過多高脂食物而影響奶水成分，間接導致稀糊便
(D)母乳水分含量高，新生兒胃結腸反射明顯，來不及將水分吸收而產生稀糊便

(C) 23 有關剖腹產術前及術後之護理措施，下列何者正確？

- (A)手術前 4 小時禁食固體食物 (B)皮膚剃毛從肚臍往下至大腿上二分之一
(C)如採區域性麻醉，術後不必等排氣即可進食 (D)一般留置導尿管，點滴移除後才移除
- (D) 24 吳女士，G1P1，產後進行親子同室，其先生抱起寶寶，眼神專注凝視寶貝，並輕聲細語說：「我是爸爸，叫爸爸。」下列描述父親與新生兒發展依附之行為，何者最適當？
(A)肌膚接觸 (skin-to-skin contact) (B)袋鼠護理 (kangaroo care)
(C)準父親自信 (confident of expectant father) (D)全神貫注 (engorgement)
- (A) 25 王女士，28 歲第一胎，產後 2 個月，月經尚未來，採純母乳哺餵。下列何項避孕措施最不推薦？
(A)口服避孕藥 (B)子宮內避孕器 (C)保險套 (D)泌乳無月經避孕法
- (A) 26 有關產後泌尿系統的變化，下列何者為正常現象？
(A)尿液中人類絨毛膜促性腺激素 (hCG) 於產後 1 週消失
(B)蛋白尿持續 3 週
(C)血尿持續 3 週
(D)產後利尿現象持續 6 週
- (C) 27 產後 3~10 天，產婦的注意力集中在母親職責的學習及自己身體功能的恢復，這是符合魯賓 (Rubin) 提出的那一期？
(A)調適期 (Adaptative Phase) (B)接受期 (Taking-in Phase)
(C)緊執期 (Taking-hold Phase) (D)釋放期 (Letting-go Phase)
- (A) 28 有關產婦乳腺炎的評估及照護，下列敘述何者錯誤？
(A)常發生於產後 1 週內 (B)通常發生於單側乳房
(C)最常見的致病菌為金黃色葡萄球菌 (D)指導正確的哺餵母乳可預防其發生
- (A) 29 正常新生兒出生 4~6 小時內，最主要的能量來源為何？
(A)葡萄糖 (B)胺基酸 (C)脂肪酸 (D)棕色脂肪
- (D) 30 有關維持新生兒出生即刻體溫穩定的措施，下列何者不適當？
(A)將接觸新生兒的布單事先預熱 (B)擦乾新生兒後進行母嬰肌膚接觸
(C)使用空調或是加溫設備維持室溫 (D)新生兒出生後應立即沐浴維持體溫
- (B) 31 一位懷孕 28 週妊娠糖尿病孕婦接受胰島素治療，其施打的胰島素劑量隨著妊娠週數的增加也逐漸增加。胰島素的需求量與下列何項荷爾蒙的分泌增加有關？
(A)泌乳激素 (Prolactin)
(B)人類胎盤泌乳激素 (human Placental Lactogen, hPL)
(C)人類絨毛膜促性腺激素 (human Chorionic Gonadotropin, hCG)
(D)促腎上腺皮質素 (Andrenocorticotrophic hormone, ACTH)
- (C) 32 有關胎盤碎片殘留所致產後出血的敘述，下列何者正確？
(A)希氏法 (Schultze mechanism) 娩出胎盤者，較易有胎盤小碎片殘留子宮
(B)是指分娩第二產程處理欠妥，使得部分胎盤碎片殘留子宮
(C)胎盤小碎片殘留常是晚期產後出血之主因
(D)應採雙手壓迫子宮法，促使子宮收縮將胎盤碎片排出
- (B) 33 當產科急症造成瀰漫性血管內凝血 (Disseminated Intravascular Coagulation, DIC) 時，下列檢驗數值何者正確？①凝血酶原時間 (PT)、部分凝血酶原時間 (PTT) 延長 ②D-dimer 數值下降 ③血小板數值下降 ④纖維蛋白原 (fibrinogen) 數值上升
(A)①② (B)①③ (C)②③ (D)③④
- (B) 34 張女士，懷孕 8 週，主訴陰道點狀出血、腹部微痛，超音波檢查子宮頸口未開，可能為下列何種情形？
(A)迫切性流產 (Imminent abortion) (B)先兆性流產 (Threatened abortion)
(C)不完全流產 (Incomplete abortion) (D)完全性流產 (Complete abortion)
- (A) 35 承上題，超音波掃描確認胎兒心跳正常，此時最適當的照護措施為何？
(A)臥床休息，給予黃體素 (B)給予安胎藥 Yutopar 服用
(C)建議做子宮頸環紮術 (D)投予抗生素預防感染
- (D) 36 郭先生的精液分析結果如下：精液量約 7 c.c.，精子濃度 800 萬/mL，射精後 42% 的精蟲仍具活動力，正常型態的精蟲為 50%。有關其結果之敘述，下列何者正確？

- (A)結果一切正常 (B)精子畸形症 (C)精液過少症 (D)精蟲減少症
- (D) 37 有關絨毛膜癌的敘述，下列何者錯誤？
 (A)約有 50%由葡萄胎惡性病變衍生而來
 (B)常見轉移之部位為肺臟
 (C)血清 hCG 值升高是診斷絨毛膜癌最重要的依據
 (D)以手術治療為主，放射線治療為輔
- (C) 38 王女士有打噴嚏、咳嗽、大笑所引起無法自主控制膀胱的漏尿，是屬於下列那種尿失禁？
 (A)急迫性尿失禁 (B)姿勢性尿失禁 (C)壓力性尿失禁 (D)滿流性尿失禁
- (A) 39 有關尖型濕疣（菜花）的敘述，下列何者錯誤？
 (A)由人類乳頭瘤病毒（HPV）16 與 18 型所引起
 (B)感染後約在 2 星期至 8 個月內出現症狀
 (C)常發生於生殖器、肛門等部位
 (D)治療方法包含雷射、液態氮、藥物等方法
- (C) 40 李女士 40 歲，因子宮內膜癌進行全子宮和雙側輸卵管卵巢切除術，出院前的護理指導，下列何者正確？①第 1 年每 6 個月回診一次 ②不可抬過重的物品 ③告知可能的更年期症狀 ④術後半生避免性行為
 (A)①② (B)①④ (C)②③ (D)③④
- (B) 41 面對自閉症（Autism）病童住院，下列護理措施何者最適當？
 (A)多與病童溝通互動，以利建立護病關係 (B)採一對一的照護，且避免過度視聽騷擾
 (C)發現病童有重複固著行為時，要出面制止 (D)避免病童有暴怒行為，不須事先告知說明
- (A) 42 以「家庭為中心的照護」應用於加護病房的照顧，下列敘述何者正確？
 (A)鼓勵並支持病童父母或手足有機會時參與共同照顧
 (B)加強管理，嚴格規定父母會客時間，以預防感染
 (C)為減少交互感染之風險，應儘量避免家人探視
 (D)兒童、青少年住院，醫師應以父母作為病情溝通與解釋對象
- (B) 43 李小妹，2 歲 8 個月，屬於李小妹遊戲發展特點，下列敘述何者正確？
 (A)遊戲過程獨自玩弄玩具，自得其樂，不重視玩伴
 (B)遊戲過程與玩伴互換玩具，但各玩各的，無合作行為
 (C)聯合遊戲過程，缺乏遊戲規則，亦無分工合作行為
 (D)遊戲過程與玩伴合作、競爭，訂立遊戲規則與團體目標
- (C) 44 針對嬰幼兒生長發展情況之敘述，下列何者錯誤？
 (A)2 歲身高約成人身高的一半 (B)前囟門約 1 歲半時關閉
 (C)1 歲時腎絲球過濾率達成人標準 (D)觸覺是感覺器官中最早發育的
- (A) 45 嬰幼兒誤食色彩鮮豔的糖果紙、廣告紙、顏料等，容易引起下列何種物質的中毒，造成中樞神經系統的損傷？
 (A)鉛 (B)鐵 (C)銅 (D)塑化劑
- (B) 46 有關兒童性虐待的常見表徵，下列敘述何者錯誤？
 (A)外陰部、肛門、嘴部或喉嚨處有撕裂傷瘀傷腫脹
 (B)肢體瘦小、皮下脂肪不足的營養不良現象
 (C)睡眠紊亂、害怕獨處、同儕關係薄弱
 (D)反覆的尿道感染及解尿困難
- (C) 47 有關兒童氣質評估之敘述，下列何者正確？
 (A)反應閾高的嬰兒，尿布不乾淨就會哭鬧不安
 (B)堅持度高的嬰兒，容易受到外界干擾而影響
 (C)趨避性高的嬰兒，初次接受或拒絕人事物的態度明顯
 (D)反應強度是指引起孩子反應所需最小刺激量
- (D) 48 有關新生兒篩檢的敘述，下列何者錯誤？
 (A)新生兒出生後須滿 48 小時才能採檢 (B)採檢前須熱敷足部 3~10 分鐘
 (C)以 75%酒精棉球消毒穿刺部位 (D)手執濾紙接取穿刺後流出的第一滴血

- (D) 49 強強，3 歲，因車禍住加護病房，剛住院時一直哭泣，對著護理師不斷地哭著說：「走開，我要媽媽……我要媽媽……」。根據兒童早期分離焦慮之反應屬於以下那一個階段？
(A)失望期 (B)去依戀期 (C)關係重建期 (D)抗議期
- (B) 50 有關不同年齡層兒童口服用藥，下列敘述何者正確？
(A)建議嬰兒抱起或協助採半坐臥，每次建議口服量為 5 mL
(B)嬰兒若是服用藥粉，建議將藥粉溶入水中再以餵奶器滴入口中
(C)幼兒服藥反抗時，建議讓其躺下並壓其下巴張開口以利服藥
(D)若 5 歲以下病童選擇吞服藥丸，建議藥丸置舌尖以利吞嚥
- (B) 51 翔翔，9 歲，因妹妹癌末瀕臨死亡住院，以下對翔翔的照護措施何者較不適當？
(A)安排他在適當時機探望妹妹
(B)鼓勵他：「你已經是大孩子了，一切要自己忍耐下來」
(C)請學校老師協助提供他關懷與支持
(D)將他同時納入護理照護計畫
- (D) 52 有關 FLACC (face, legs, activity, cry and consolability) 疼痛量表，下列敘述何者錯誤？
(A)可用來評估 4 個月大的嬰兒 (B)分數越高表示越疼痛
(C)雙腳持續踢動評估分數為 2 (D)每項評估分數分為 1 與 2 二等級
- (C) 53 有關早產兒經口餵食的發展照護原則，下列敘述何者錯誤？
(A)早產兒出現安靜清醒期，並出現飢餓暗示行為，例如尋乳行為、吸吮動作即可開始準備
(B)早產兒出現壓力暗示行為，例如疲倦、嗆奶、呼吸暫停、發紺，需減緩或停止餵食
(C)對於妊娠週數低及低體重的早產兒，餵食時間應延長至 60 分鐘以減少壓力
(D)觀察呼吸及膚色，調整奶瓶位置及流速，視情況暫停餵食並刺激呼吸
- (D) 54 有關早產兒視網膜病變的高危險群與症狀，下列敘述何者不適當？
(A)通常出現在出生體重在 1,500 公克以下
(B)長期使用呼吸器與高濃度氧氣暴露為危險因子
(C)第一、二期為輕度病變，會自行好轉，一般不需治療，少有視力障礙
(D)視網膜完全剝離，可經由鞏膜扣壓術、玻璃體內切除術獲得治癒
- (C) 55 吳小弟血型為 B 型，因血型與 O 型的母親不合而造成溶血，下列敘述何者正確？
(A)「ABO 血型不合」的黃疸會比「Rh 因子不合」者嚴重
(B)「ABO 血型不合」通常發生在第二胎以後的新生兒
(C)有較高機會發生聽力損傷、發展遲緩等後遺症
(D)吳小弟需要換血，使用血品為 B 血型
- (D) 56 有關提供慢性病兒童家庭之持續性及全面性照護的護理措施，下列敘述何者較不適當？
(A)對父母親的反應及潛在需求，要有敏感度
(B)善用傾聽技巧，且採用易於理解的語言，提供醫療訊息
(C)主動提供共享資訊，包含有關社會資源的訊息
(D)為了讓主要照顧者全面了解，應一次提供疾病照護的所有訊息
- (A) 57 人類免疫缺乏病毒 (Human Immunodeficiency Virus, HIV) 帶原的青少年之護理指導，下列敘述何者錯誤？
(A)指導絕對不可以發生性行為，以免傳染給他人
(B)家人協助處理切割的傷口時，應戴手套
(C)提醒感染 HIV 者不要捐血，以避免傳染疾病
(D)教導環境設備污染時，以 0.05% 漂白水擦拭
- (C) 58 有關瀕死病童的生理變化，下列敘述何者錯誤？
(A)尿量漸減 (B)陳施氏呼吸 (Cheyne-Stokes respiration)
(C)視力減退，聽覺最早消失 (D)心跳慢且弱
- (A) 59 有關猩紅熱的臨床表徵，下列敘述何者正確？
(A)突發性高燒，盤尼西林治療 24 小時內體溫降至正常
(B)舌頭最初為紅色乳突狀的紅色草莓樣舌，4~5 天後轉為白色草莓樣舌
(C)皮疹最早出現在軀幹、四肢、前額、臉頰
(D)皮疹為針點狀紅疹，受壓迫時皮疹更明顯

- (D) 60 有關疱疹病毒的感染，下列何者錯誤？
 (A) 嘴唇或嘴部周圍聚集成叢的水泡，常見於第一型疱疹病毒感染
 (B) 疱疹性齦口炎是單純性疱疹初次侵犯兒童最常見的型態
 (C) 使用 Acyclovir 可治療疱疹病毒的感染
 (D) 疱疹性齦口炎的口腔潰瘍常見口腔的後半部，咽喉與咽喉上方
- (D) 61 小華，9 個月，診斷為雙側中耳炎（Otitis Media），有關中耳炎之臨床表徵，下列敘述何者錯誤？
 (A) 頸淋巴結腫大 (B) 抓或拉扯耳朵 (C) 發燒 (D) 吞嚥困難
- (D) 62 小名，3 歲，疑似罹患流行性感冒，有關臨床表徵的敘述，下列何者最不適當？
 (A) 發燒和發冷 (B) 喉嚨痛和黏膜乾燥 (C) 畏光和肌肉痠痛 (D) 紅疹和皮膚搔癢
- (C) 63 下列那種疾病不是由 A 群 β 型溶血性鏈球菌所引起？
 (A) 扁桃腺發炎 (B) 急性風濕熱 (C) 哮喘 (D) 急性腎絲球腎炎
- (A) 64 母親懷孕早期感染下列何種疾病，易導致新生兒罹患先天性心臟病？
 (A) 德國麻疹 (B) 鏈球菌感染 (C) 風濕性關節炎 (D) 急性支氣管炎
- (D) 65 菲菲，2 歲，罹患法洛氏四重症（Tetralogy of Fallot, TOF），出院後仍需每 12 小時服用毛地黃（Digoxin）一次，下列護理指導何者錯誤？
 (A) 給藥前須完整測量心尖脈 1 分鐘 (B) 最好是在飯前 1 小時或飯後 2 小時給藥
 (C) 勿將藥物與果汁混合餵食 (D) 若忘記給藥超過 6 小時應補給一劑
- (A) 66 小宇，10 歲，患有主動脈狹窄（Coarctation of the Aorta, COA），入院時可能出現的臨床表徵，下列敘述何者不適當？
 (A) 下肢比上肢血壓高 20 mmHg (B) 股動脈搏動微弱
 (C) 主訴頭痛、暈眩 (D) 主訴腳部冰冷
- (A) 67 小美，17 歲女性，為 A 型血友病帶因者，到院做遺傳諮詢，下列敘述何者最適當？
 (A) 告知若配偶基因正常，未來每一胎生男嬰有 1/2 機率为血友病者
 (B) 告知若配偶基因正常，則不會生下血友病的孩子
 (C) 告知若配偶基因正常，未來生的男嬰不會發生血友病，女嬰則有機率是帶因者
 (D) 告知若配偶基因正常，未來若生女嬰皆為帶因者但不會發病
- (D) 68 小華，3 歲，在一週前發燒後身上突然出現多處紫斑，經醫師診斷為特發性血小板（Idiopathic Thrombocytopenic Purpura, ITP），下列敘述何者錯誤？
 (A) 這是一種自體免疫的障礙 (B) 使用類固醇治療
 (C) 指導家屬禁止使用阿斯匹靈藥物（Aspirin） (D) 建議 3 歲前施行脾臟切除手術
- (D) 69 小勇，10 歲，罹患急性淋巴性白血病，目前接受化學治療中，有關其護理措施之敘述，下列何者錯誤？
 (A) L-asparaginase 會引起血糖過高，需要監測血糖
 (B) Prednisolone 會增加感染機會，需採保護性隔離
 (C) Vincristine 需監測手脚麻刺感和便秘的現象
 (D) Mycostatin 指導於飯後使用，預防革蘭氏陽性菌感染
- (A) 70 小軒，6 歲，體重 20 公斤，診斷為尿崩症，有關診斷與護理處置，下列何者錯誤？
 (A) 在接受禁水試驗（fluid deprive test）過程中，體重減少至 1 公斤時，繼續試驗
 (B) 24 小時尿液分析之尿比重降低
 (C) 當病況穩定後，可經由鼻腔噴霧法給予血管緊縮素，效果可維持 8~20 小時
 (D) 避免過度給予血管緊縮素，造成尿量減少、體液滯留體內以及頭痛等症狀
- (C) 71 罹患癌症之嬰幼兒，需要接受骨髓穿刺檢查，最常選擇的部位為何？
 (A) 胸骨 (B) 股骨 (C) 脛骨 (D) 腰椎
- (A) 72 有關第 1 型糖尿病（Type 1 diabetes）之敘述，下列何者正確？①主要是因為自體免疫反應，使產生胰島素的 β 細胞受到破壞 ②使用口服降血糖藥物就能治療疾病 ③疾病治療的準則中，血糖監測、藥物、飲食和運動缺一不可 ④好發族群為肥胖之青少年
 (A) ①③ (B) ①④ (C) ②③ (D) ②④
- (C) 73 陳小弟，4 歲，身體瘦弱，因貧血來院檢查，疑似寄生蟲感染，陳小弟喜歡赤腳到田裡玩泥巴，下列何者是最可能感染的寄生蟲？

- (A)蛔蟲 (B)蟯蟲 (C)鉤蟲 (D)廣東住血吸蟲
- (B) 74 姍姍，2 歲 6 個月，因為出現水腫、體重增加而入院，診斷為腎病症候群（Nephrotic Syndrome），有關此疾病的敘述下列何者最適當？
- (A)一種因為 A 群 β 型溶血性鏈球菌感染所導致
(B)腎絲球受破壞，導致腎絲球膜通透性增加，常出現有蛋白尿
(C)主要治療以抗生素為主，應指導勿隨意停藥以免產生抗藥性
(D)容易出現有高血壓及嚴重血尿現象
- (A) 75 小強，14 歲，因慢性腎衰竭進行腹膜透析治療中，有關護理指導的敘述，下列何者較不適當？
- (A)攝取高熱量碳水化合物及脂肪類食物，特別限制蛋白質及鹽的攝取
(B)多攝取富含鐵質、葉酸食物以及提供維生素 D，防止出現貧血現象
(C)腹膜炎是常見的合併症，病童及家屬須學習透析部位正確消毒方法
(D)每次透析液約 30~50 mL/kg 緩慢注入腹內，需停留 20 分鐘再引出
- (C) 76 有關先天性膽道閉鎖的敘述，下列何者正確？
- (A)常出現水溶性維生素缺乏現象 (B)通常執行膽道切開術後，病童一般預後良好
(C)若未治療，易出現肝硬化、脾腫大現象 (D)糞便內經常含有血絲及暗紅色大便
- (C) 77 有關使用格拉斯哥氏昏迷量表（Glasgow Coma Scale, GCS）評估兒童意識程度，下列敘述何者正確？
- (A)評估嬰幼兒時，不需要父母陪同，避免干擾評估正確性
(B)評估兒童對於環境刺激的瞳孔、語言和運動反應
(C)少於或等於 7 分定義為昏迷狀態
(D)最高分 13 分表示正常
- (B) 78 有關雷氏症候群（Reye's syndrome）的臨床表徵，下列敘述何者錯誤？
- (A)肝臟酵素-胺基轉胺酶（AST、ALT）皆升高
(B)高血糖
(C)腦水腫
(D)凝血酶原時間（PT）及部分凝血酶原時間（PTT）延長
- (B) 79 有關早產兒腦室內出血，下列護理處置之敘述，何者最適當？
- (A)抬高床頭 45 度以減少顱內壓 (B)採取集中照護，減少不必要的打擾
(C)提供具聲光刺激的環境，以增加大腦血流 (D)提供高張藥物及溶液，以減低大腦血流量
- (B) 80 李小妹，診斷為痙攣型腦性麻痺（spastic type of cerebral palsy），有關其臨床表徵，下列敘述何者正確？
- (A)不自主的扭動 (B)伸展反射增加 (C)肌腱反射降低 (D)跨大步伐行走

【版權所有，翻印必究】