

# 《產兒科護理學》

- (D) 1 有關嬰兒死亡率之敘述，下列何者正確？  
 (A)一年內未滿4週之嬰兒死亡數÷當年出生活嬰總數×1,000  
 (B)一年內未滿42天之嬰兒死亡數÷當年出生活嬰總數×1,000  
 (C)一年內未滿6個月之嬰兒死亡數÷當年出生活嬰總數×1,000  
 (D)一年內未滿1歲之嬰兒死亡數÷當年出生活嬰總數×1,000
- (C) 2 丁女士30歲，G1P0，懷孕20週，至門診產檢。懷孕前身體質量指數（BMI）為20，懷孕後體重增加3公斤，宮底高肚臍上一橫指，詢問「肚子會不會太小？」護理師最合適的回答為何？  
 (A)目前體重增加太少，所以肚子比較小，可以每天再增加1份300卡的點心  
 (B)目前體重增加太多，肚子不會太小，需要減少一天熱量，有效控制體重  
 (C)目前體重增加和肚子大小符合懷孕週數，繼續維持就可以  
 (D)目前肚子大小符合週數，但體重增加太少，可以每天再增加1份300卡的點心
- (B) 3 趙女士至門診確認懷孕8週，有孕吐現象，詢問有關孕期熱量攝取，下列何者為最適當的回答？  
 (A)孕期熱量需求和體重增加是平均分配於三個孕期  
 (B)第一孕期常有孕吐，體重增加是三個孕期中最少  
 (C)第二孕期熱量主要提供胎兒的生長  
 (D)第三孕期熱量主要提供胎盤的生長
- (A) 4 有關懷孕期的營養指導，下列何者最適當？  
 (A)懷孕前及第一孕期注意葉酸的攝取，可預防胎兒神經管缺損  
 (B)懷孕期絕不可喝咖啡、茶、可樂等含咖啡因的飲料  
 (C)每日水分的攝取應限制在500~1,000毫升  
 (D)第二孕期需特別補充鐵劑及維生素K
- (D) 5 張女士，40歲，懷孕17週，來院進行羊膜穿刺術，下列敘述何者錯誤？  
 (A)告知無需事先喝水漲滿膀胱 (B)協助平躺並鋪設無菌區域  
 (C)可以無需麻醉協助抽取羊水 (D)此時目的在評估胎兒成熟度
- (B) 6 葉女士，懷孕33週，在正常體重增加與胎兒發展的情況下，逐漸膨大的子宮會使她姿勢發生下列何種改變？  
 (A)身體重心往後移增加平衡 (B)腰、背、脊柱向前方凸起  
 (C)腹部肌肉張力逐漸增加 (D)骨盆關節活動性更加緊實
- (C) 7 懷孕婦女抱怨陰道白色分泌物（白帶）增加、呈黏稠狀、無臭味，造成會陰部不適感，此種情況最可能因為？  
 (A)陰道上皮細胞發炎 (B)陰道細胞受到念珠球菌感染  
 (C)陰道細胞受到嗜乳酸桿菌作用 (D)子宮頸黏液塞排出
- (D) 8 懷孕34週婦女接受高層次超音波檢查，血流超音波檢查結果S/D=2.4，對此檢查結果的敘述，下列何者正確？  
 (A)S/D是臍靜脈收縮壓與舒張壓比值 (B)S/D舒張壓變小，表示胎盤血管阻力減少  
 (C)第二孕期後，S/D值隨週數增加而增加 (D)S/D=2.4表示胎盤功能正常
- (D) 9 婦女在懷孕過程中會主動尋求與生產有關之訊息，定期接受產前檢查，並且經常請教親朋好友生產的情形，這符合下列那項魯賓（Rubin）母性任務發展？  
 (A)學習奉獻自己 (B)促使重要他人接受新生兒  
 (C)使自己與胎兒連成一體 (D)確保自己與胎兒在懷孕過程安全順利

- (C) 10 護理師教導孕婦在家每日自行監測胎動，下列何者最適當？  
 (A) 飯前1小時計算胎動，正常應每小時有5次（或以上）  
 (B) 清晨醒來臥床1小時計算胎動，正常應每小時有5次（或以上）  
 (C) 安靜坐或躺，計算胎動發生次數10次時間，正常應在2小時內可達到  
 (D) 散步1小時過程中，計算胎動發生次數，正常應達10次（或以上）
- (A) 11 陳女士G1P1，因前置胎盤採剖腹產，有關產後立即性照護，下列何者錯誤？  
 (A) 至少每4小時監測生命徵象測量一次 (B) 評估傷口出血及惡露量情形  
 (C) 評估子宮底位置及張力 (D) 每15分鐘評估下肢感覺恢復情形
- (C) 12 張女士，G1P0，由先生陪同待產，出現哭叫打罵情形，先生已陪產一天，出現疲憊不堪情形，詢問護理師他該怎麼辦，下列回應何者最不恰當？  
 (A) 接受準爸爸可能有驚慌失措的行為  
 (B) 提供明確產程進展訊息給準爸爸  
 (C) 請準爸爸持續陪伴，以避免產婦失控  
 (D) 讓準爸爸暫時在旁休息，改由其他家人照顧產婦
- (D) 13 陳女士懷孕39週入院待產，體溫36.5°C、心跳74次/分、呼吸24次/分，血壓120/85mmHg。有關待產時使用腰椎硬膜外麻醉（epidural analgesia）時，麻醉前後注意事項，下列何者錯誤？  
 (A) 麻醉前30分鐘應提供靜脈留置針及給予0.9%N/S 500~1,000 mL灌注  
 (B) 麻醉藥注入前20分鐘，應監測母親血壓和胎心音  
 (C) 麻醉後採左側臥，避免低血壓  
 (D) 待產婦血壓為86/50 mmHg，需給予naloxone解毒
- (B) 14 王女士，懷孕41週，觀察其待產期間的胎心率變化。下列何種現象，需要特別處理？  
 (A) 潛伏期時，不論有無宮縮，都維持在128~148 bpm  
 (B) 活動期時，10分鐘內，不論有無宮縮，最高為140 bpm，最低為136 bpm  
 (C) 宮縮開始，加速最高至162 bpm，宮縮結束後回到124 bpm  
 (D) 產檯上用力期間，逐漸減慢到最低至110 bpm，宮縮結束後回到138 bpm
- (D) 15 高女士，G2P0，懷孕38週，因規則陣痛且自然破水而入院待產。待產期間沒有接受硬脊膜外麻醉，已入院待產13小時，目前子宮收縮每2~3分鐘一次，持續50秒，子宮頸口擴張8公分，胎兒高度-1。請問，高女士此時最不可能出現下列何種徵象或行為反應？  
 (A) 現血量會越來越多 (B) 宮縮間歇時，常閉著眼睛休息  
 (C) 對於能否撐過生產，越來越沒信心 (D) 非常希望獨處，大叫「請你們離開！」
- (B) 16 有關初產婦與經產婦於分娩過程的常見變化，下列敘述何者正確？  
 (A) 初產婦子宮頸先擴張，再變薄  
 (B) 經產婦子宮頸軟化變薄及擴張，同時進行  
 (C) 經產婦於分娩前約2週出現腹輕感（lightening）  
 (D) 初產婦腹輕感往往於分娩啟動時才出現
- (D) 17 周女士，G1P0，懷孕39週，因破水且子宮頸口開3公分。以臺灣目前臨床實務最常見的電子胎兒監測方式，下列護理師的說明，何者不適當？  
 (A) 「會先用手觸診腹部，找出聽取胎兒心跳最清楚的位置」  
 (B) 「等一下妳的腹部上會放有兩條固定帶」  
 (C) 「放在宮底位置的這個是感應子宮收縮壓力的傳導器」  
 (D) 「監測宮縮壓力及胎兒心跳的兩個傳導器都會抹上凝膠物質」
- (D) 18 丁女士主訴無法忍受生產疼痛並接受meperidine（Demerol）注射，給藥後護理師監測其呼吸速率低於每分鐘10次，下列何種藥物能改善此情形？

- (A) diazepam (Valium) (B) hydroxyzine (Vistaril)  
 (C) promazine (Sparine) (D) naloxone (Narcan)
- (D) 19 廖女士，41歲，G4P4，在今天早上6點以陰道分娩第四個女兒，現親子同室中，護理師詢問其他家人何時會來醫院，廖女士眼眶泛紅表示：「他們不會來啦，因為這胎又是女兒」，下列回應何者最適當？  
 (A)妳不要難過了，妳更要多與寶寶互動，以免影響日後的親子依附關係建立  
 (B)妳是受到產後荷爾蒙劇烈變化的影響，才會情緒低落下，過兩天就會改善  
 (C)剛生產完，母親及新生兒都需要足夠的時間休息，通常也不會建議此時家人的探視  
 (D)聽起來妳很難過，新生兒的誕生對家庭成員都有影響，妳現在的想法是？
- (C) 20 有關產褥期身心調適的敘述，下列何者錯誤？  
 (A)生殖器官的復舊需要四~六週時間  
 (B)又稱為第四孕期；以強化母嬰一體調整與恢復的概念  
 (C)子宮頸口一週後會趨近閉合，是一種生理上進行性變化  
 (D)子宮體積的減少，與自體溶解有關
- (C) 21 李女士，產後三週，表示產後至今體重增加5公斤，失眠睡不好，動作遲緩且嗜睡，對任何事物及新生兒照護都缺乏興趣，覺得很有罪惡感，加上自己坐月子缺乏幫手，常常出現想死的念頭。針對李女士的情形，下列評估何者最適當？  
 (A)產後荷爾蒙變化的自然現象 (B)產後情緒低落 (Postpartum Blue)  
 (C)產後憂鬱 (Postpartum Depression) (D)產後精神疾患 (Postpartum Psychosis)
- (C) 22 有關乳腺炎用藥治療及哺乳建議，下列何者最適當？  
 (A)最常見的致病菌多為金黃色葡萄球菌，必要時給予ampicillin加上持續哺乳最有效  
 (B)投與抗盤尼西林黴素時，不建議服藥2小時內哺乳  
 (C)可以持續哺乳且用藥後24~48小時，發燒、發紅及硬塊情況通常就會改善  
 (D)可以持續哺乳，但為了降低藥物對嬰兒的影響，症狀消失後即可停藥
- (B) 23 有關初乳的敘述，下列何者不適當？  
 (A)蛋白質和礦物質的含量較成熟乳高 (B)脂肪和醣類的含量較高，少量但熱量足  
 (C)水分含量較成熟乳低，適合新生兒的胃容量 (D)含有豐富促進腸道好菌發展的益生菌
- (B) 24 提供產後飲食衛教，教導暫時性避免食用含酒精性食物，其最主要原因為何？  
 (A)避免影響腸道蠕動 (B)避免影響傷口癒合 (C)避免影響惡露排出 (D)避免影響性生活
- (D) 25 蔡女士，初產婦，新生兒出生體重3,800公克。採完全哺餵母乳，護理師進行產後兩週之出院後電話關懷時發現，新生兒出生兩週體重為下降至3,700公克。下列何者為最優先的處置？  
 (A)肯定個案的堅持母乳哺育，建議增加哺乳的頻率兩天，之後再觀察體重變化  
 (B)說明體重下降過多時對嬰兒成長的危險，應立即補充配方奶  
 (C)了解個案飲食狀態，建議增加高蛋白高熱量飲食攝取，以強化母乳營養及產量  
 (D)鼓勵個案說出自己的感受，告知今日儘快到醫院進行哺乳與新生兒之評估與檢查
- (C) 26 張女士，剖腹產後第一天，表示整個腹部疼痛，全身疲憊無力，不想動，也不要親子同室。下列何項護理措施最適當？  
 (A)告知親子同室是政府推行政策，建議親子同室並由丈夫協助照顧新生兒  
 (B)說明是子宮收縮引起疼痛，協助24小時使用束腹帶並建議長期臥床休息  
 (C)說明活動的益處，依醫囑給予止痛劑，採漸進式活動  
 (D)評估腸蠕動情況，給予腹部按摩及軟便劑，鼓勵多喝水
- (D) 27 有關產後正常紅惡露 (Lochia Rubra) 的敘述，下列何者錯誤？  
 (A)顏色為深紅色 (B)產後1~3天出現  
 (C)內含上皮細胞、蛻膜碎片 (D)會出現有大量紅色血塊

- (B) 28 有關於胎兒與新生兒免疫系統之敘述，下列何者正確？  
 (A) IgM是唯一可以通過胎盤的抗體 (B)胎兒無法自行製造IgA，可由初乳而獲得  
 (C)出生時新生兒體內之抗體主要為IgA (D)當新生兒的IgG值升高，顯示有子宮內感染
- (A) 29 使用New Ballard Score評估足月兒成熟度與妊娠週數的最佳時間為：  
 (A)出生後24小時內 (B)出生後2~3天內 (C)出生後3~7天內 (D)出生後8天至滿月前
- (B) 30 有關新生兒篩檢的檢體採集方式，下列何者正確？  
 (A)早產兒出生週數滿34週即可立即採血  
 (B)採血的穿刺部位應選擇避開蹠神經與跟骨部位的足跟兩側  
 (C)穿刺後若血流不順可以用力擠壓穿刺處讓血液流出  
 (D)穿刺時以45度角將穿刺針刺入採血點
- (B) 31 江女士為百貨公司化妝品銷貨員，因長期久站，懷孕前左腿即有明顯的靜脈曲張情形，產後會陰傷口腫脹疼痛而不願下床活動，產後第三天她試著下床步行，當她站立伸直左右小腿時，左小腿會感覺疼痛，觸摸也會覺得壓痛。依據上述情況，下列何項判斷及處置較適當？  
 (A)為深層血栓靜脈炎，應教導其在左小腿疼痛處多熱敷並按摩  
 (B)霍曼氏徵象 (Homan's sign) 若為陽性反應，依醫囑給予抗凝血劑，並密切觀察出血情形  
 (C)霍夫曼技術 (Hoffman's technique) 評估為陽性，應抬高床尾，避免血栓造成肺栓塞  
 (D)為深層血栓靜脈炎，鼓勵多下床活動以促進血液回流
- (C) 32 王女士使用ritodrine (Yutopar) 安胎，下列照護何者正確？  
 (A)監測高血壓現象 (B)監測低血糖現象  
 (C)需注意胸痛、呼吸困難現象 (D)發生心搏過速，應立即停藥
- (D) 33 有關比夏計分法 (Bishop's score) 之敘述，下列何者正確？  
 (A)比夏計分法之得分愈低，則早產機率愈高  
 (B)評估項目為心跳速率、呼吸能力、肌肉張力、皮膚顏色、反射性刺激反應  
 (C)每一項目評分為-1、0、1、2、3 分五個等級  
 (D)過期妊娠婦女催產前，可用此計分法評估子宮頸的成熟度
- (A) 34 32歲初產婦身高160公分，中午12:00入院時子宮頸變薄50%，擴張為4公分，待產期間僅給予Ringer輸液keep line，但子宮收縮頻率自然變快且強度也增加，10分鐘內平均有5次以上收縮，分娩進展快速於下午14:50娩出1名男嬰，出生體重2,700公克。有關此位初產婦分娩特性的敘述，下列何者最適當？  
 (A)急產，產後應評估子宮頸及產道是否有撕裂傷  
 (B)分娩快速，胎兒易出現感染及失溫的危險  
 (C)產程延滯，是醫療處置不當的結果  
 (D)應注意胎兒是否因腦缺氧，刺激交感神經引發心跳加速
- (A) 35 承上題，該產婦在產後觀察期間，觸診其子宮收縮呈堅硬狀，子宮底位置與臍平並置中，膀胱無漲尿，產婦陰道不斷流出鮮紅血性物，半小時內產後棉片就濕透一半，血壓值為100/65mmHg。下列敘述何者正確？  
 (A)為早期產後出血，因產道撕裂傷所致 (B)為早期產後出血，因子宮收縮乏力所致  
 (C)為晚期產後出血，係胎盤碎片殘留子宮 (D)為晚期產後出血，係異常高張力宮縮
- (A) 36 女性月經來潮時的衛生清潔措施，下列何者不適當？  
 (A)使用清潔液灌洗陰道 (B)可用中性肥皂或清水清潔會陰部  
 (C)採淋浴方式 (D)穿著寬鬆的棉質內褲
- (C) 37 有關血清抗穆氏管荷爾蒙 (Anti-mullerian Hormone, AMH) 檢查之敘述，下列何者錯誤？

- (A)能反映卵子的儲量  
 (B)能準確評估卵巢功能  
 (C)受月經週期影響，需於月經週期第14天進行檢測  
 (D)年輕女性AMH 的平均值在2~4  $\mu\text{g/L}$
- (D) 38 有關人工授精之適應症，下列何者錯誤？  
 (A)精子無法穿透子宮黏液 (B)精子稀少者  
 (C)選擇接受精子捐贈者 (D)輸卵管阻塞者
- (D) 39 有關多囊性卵巢疾病的表徵，下列何者錯誤？  
 (A)雄性素分泌過多 (B)排卵障礙 (C)胰島素阻抗 (D)月經次數過多
- (A) 40 有關子宮肌瘤的術後護理，下列何者正確？  
 (A)若有出血情形，須密切觀察與紀錄出血量、性質、顏色  
 (B)微創手術後，為避免傷口出血，應臥床24小時  
 (C)微創手術後，因恢復時間短，返家可立即恢復性生活  
 (D)肌瘤切除術後，返家後可開始運動，如至健身房進行重訓
- (B) 41 楊小妹，1歲，體重10公斤，有關事故傷害預防之護理指導，下列敘述何者最適當？  
 (A)為了提升楊小妹安全意識，應開始利用玩偶及遊戲進行安全教育  
 (B)為了預防車禍撞擊，乘車時楊小妹應坐在後座之攜帶式嬰兒床或後向式安全座椅  
 (C)為了促進其自主性之發展，應鼓勵母親開始讓楊小妹自己洗澡  
 (D)為了補充優質脂肪酸，鼓勵母親開始讓楊小妹進食堅果類食物
- (C) 42 小澤，8歲，罹患氣喘，有關促進小澤在學校生活適應，下列敘述何者不適當？  
 (A)父母應告知學校老師和校護關於小澤的狀況和健康需求  
 (B)父母應將小澤需在學校服用的藥物標示清楚及藥物相關資訊  
 (C)避免疾病發作，老師需保護和限制小澤參與體育等競賽活動  
 (D)徵得小澤和父母的同意下，對班上同學簡潔說明小澤的疾病和注意事項
- (D) 43 有關預防嬰兒搖晃症候群（Shaken Baby Syndrome）之護理照護措施，下列敘述何者正確？  
 (A)避免劇烈搖晃嬰幼兒，是預防脊柱未成形而造成損害  
 (B)移動嬰幼兒時，雙手務必適當的支撐背部及腰部  
 (C)安全抱持是雙手置於嬰幼兒兩側腋窩或抱起雙臂  
 (D)教導照顧者處於憤怒、焦慮時，先調適自身情緒
- (C) 44 罹患自閉症的學齡期兒童，母親應該如何與之互動最合適？  
 (A)多給與刺激性的活動，以增進其認知功能  
 (B)鼓勵增加與孩子的身體接觸或碰觸，使其感受到關心  
 (C)給予明確且具體的指示，以增進其信任感  
 (D)鼓勵多給予意外的驚喜，以增加其生活色彩
- (D) 45 有關兒童血壓測量，下列敘述何者正確？  
 (A)右臂橈動脈區是最常用基準部位  
 (B)合適的壓脈帶寬度應可以覆蓋所選肢體的1/2  
 (C)小於1 歲兒童的正常血壓範圍為100~110/60~75 mmHg  
 (D)1 歲以上兒童的下肢測量收縮壓會比上肢高約20 mmHg
- (D) 46 有關兒童氣質的相關敘述，下列何者錯誤？  
 (A)氣質無好壞之分，是個人對內在、外在刺激的行為模式  
 (B)氣質和父母教養方式有密切關係，在彼此互動下會產生不同的親子關係  
 (C)瞭解孩子的氣質，可協助父母發展最適合孩子氣質特點的社會適應模式  
 (D)氣質會影響孩子的智力發展與日後的成就

- (A) 47 有關兒童生理的發展，下列敘述何者正確？  
(A)從出生至1歲的嬰兒，其神經系統及附屬器官生長速度最快  
(B)從出生到3歲快速長高，約3歲時的身高為出生時身長的2倍  
(C)出生時頭圍約30公分，每年增加12~15公分，5歲時可達成人90%  
(D)出生時身體中點為肚臍處，3歲時頭約占身長1/3
- (C) 48 小桃，8歲，因氣喘發作住院接受治療，主訴：「因為我愛吃冰，然後出去玩沒戴口罩，也沒穿外套，所以就發作了」，下列何者為小桃此階段「疾病概念」發展的特色？  
(A)生病是兩件事情接近，不可思議發生的  
(B)生病是來自外在但存於身體內部的  
(C)生病是來自外在的人、物或行動對兒童身體不好或有傷害的  
(D)生病是外在原因與自己無關的具體現象
- (C) 49 依據皮亞傑 (Piaget) 認知發展理論，有關具體運思期兒童對疾病的概念，下列敘述何者最適宜？  
(A)認為生病原因是上天的懲罰 (B)認為生病原因是器官功能不良  
(C)認為生病原因是接觸生病的人 (D)能對生病原因提出假設，再進行驗證
- (A) 50 小偉，2歲，入住加護病房的第二天早晨哭喊著要媽媽，拒絕護理師的安撫，且出現身體攻擊行為。此行為屬於分離焦慮的那一期？  
(A)抗議期 (B)否認期 (C)絕望期 (D)關係重建期
- (D) 51 林小弟，妊娠31週，出生一週大，目前體重1,868公克，有關林小弟的營養照護，下列敘述何者最正確？  
(A)為滿足口慾，以經口餵食為主，不足部分以靜脈輸液補充  
(B)為避免吸吮耗費身體能量，以全靜脈營養提供所需熱量  
(C)早產兒配方奶熱量高於母乳，建議餵食早產兒配方奶為主  
(D)口胃管灌食時，反抽量大於灌食量一半時，應暫停餵食
- (B) 52 小凱為26週大的早產兒，有關維持早產兒體溫的照護措施，下列敘述何者不適當？  
(A)毛毯包裹及戴帽子，四肢穿戴手腳套  
(B)保溫箱溫度設定於28~30°C，濕度45~50%  
(C)使用塑膠單或塑膠套覆蓋早產兒的身體  
(D)將早產兒置於預熱過的輻射加溫處理台上，執行醫療處置
- (B) 53 有關慢性疾病兒童與家庭的照護原則，下列敘述何者不適當？  
(A)家庭須發展出融合病童疾病治療與使家庭生活正常化的策略  
(B)強調慢性疾病對病童的影響和限制，允許對其過度保護  
(C)鼓勵家庭儘量讓病童參與治療及照護相關的決策  
(D)鼓勵家庭成員和病童能與同儕或外界互動
- (C) 54 小強，13歲大，罹患骨肉瘤 (Osteosarcoma)，經歷化學治療與手術治療後，癌細胞仍轉移到肺部。當小強在生命末期時，護理師可評估到的生理變化，下列敘述何者正確？  
(A)呼吸呈現深快的庫斯莫爾氏呼吸 (Kussmaul's respiration)  
(B)周邊循環增加，使得四肢末梢脈搏變強  
(C)括約肌控制降低，造成大小便失禁  
(D)痛覺變遲鈍，視力最後消失
- (D) 55 黃小妹為35週出生的早產兒，罹患高膽紅素血症 (Hyperbilirubinemia)，有關傳統照光機執行照光治療的護理措施，下列敘述何者錯誤？  
(A)常出現體溫升高、脫水的副作用  
(B)每日採血前須暫停使用照光

- (C)需戴不透光眼罩和貼隔光紙於生殖器部位  
(D)照光的光源與病童皮膚保持30~40公分距離
- (B) 56 有關評估早產兒的生長發展，下列敘述何者最適當？  
(A)早期應每3個月評估早產兒的生長發展  
(B)早產男嬰睪丸可能尚未下降且陰囊小及無皺褶  
(C)早產兒評估的矯正年齡計算是以其預產期加4週當出生日期  
(D)應用新貝拉度量表 (New Ballard Score) 定期進行評估生長發展
- (C) 57 小章，足月兒，出生即確診為後天免疫缺乏症候群 (AIDS)，若病況穩定需接種疫苗時，下列敘述何者錯誤？  
(A)出生24小時內可接種B型肝炎疫苗 (Hep B) 第1劑  
(B)出生滿2個月可接種流行性感胃嗜血桿菌疫苗 (Hib)  
(C)出生滿5個月可接種卡介苗 (Bacillus Calmette-Guérin, BCG)  
(D)出生滿6個月可接種流行性感胃疫苗 (Influenza vaccine)
- (A) 58 小立，6歲，一週前被三斑家蚊叮咬，之後出現發燒、頭痛、嘔吐、痙攣、頸部僵硬的症狀，其抽取腦脊髓液的檢查結果，下列敘述何者正確？  
(A)蛋白質上升 (B)血小板下降 (C)球蛋白反應為陰性 (D)葡萄糖下降
- (D) 59 有關玫瑰疹 (Roseola Infantum) 的相關敘述，下列何者正確？  
(A)由第1型人類疱疹病毒感染所致  
(B)常見於學齡前期的兒童  
(C)燒退後發疹最先出現在臉上，為玫瑰紅斑點  
(D)常見合併症為熱性痙攣
- (A) 60 有關嬰幼兒「呼吸系統特徵」之敘述，下列何者最不適當？  
(A)嬰幼兒耳咽管較長、窄且垂直，致病菌較不易進入中耳  
(B)嬰兒的會厭軟骨較成人所占的比例大，且無彈性  
(C)嬰兒喉頭位置在頸部較高處，較成人易有吸入性肺炎  
(D)嬰兒鼻腔黏膜富含微血管比成人豐富，易受致病原感染
- (A) 61 傳染力最低的是那種類型的肺炎？  
(A)細菌性肺炎 (B)病毒性肺炎 (C)黴漿菌性肺炎 (D)間質性肺炎
- (A) 62 有關氧氣帳使用之敘述，下列何者正確？  
(A)維持高濃度氧 (40%~60%)，高濕度 (40%~60%) 的帳內環境  
(B)提供電動玩具，增加視聽覺刺激，以免病童有被隔離感  
(C)氧氣濃度分析儀放於病童肢體末端，可測得準確的氧濃度  
(D)採集中護理，限制照護者與病童互動，以免帳內氧氣流失
- (A) 63 小祁，10歲，男童，主訴眼睛發癢、持續打噴嚏但無發燒，診斷為過敏性鼻炎，下列護理措施何者最不適當？  
(A)需長期使用鼻血管收縮噴劑  
(B)勿使用毛毯及絨毛玩具  
(C)提醒小祁咳嗽打噴嚏需用手帕或衛生紙蓋住口鼻的禮節  
(D)依醫囑給予口服Antihistamine緩解過敏性徵兆和症狀
- (C) 64 曹小妹為足月產新生兒，有關其出生後會出現之循環變化，下列何者正確？  
(A)血氧濃度降低，讓動脈導管收縮而關閉  
(B)臍靜脈出生後立即關閉形成靜脈韌帶  
(C)全身血管阻力增加，肺動脈阻力降低  
(D)卵圓孔自然關閉是因為右心房壓力高於左心房壓力

- (C) 65 劉小弟，5歲，因心室中膈缺損長期服用毛地黃，入院行右心導管檢查，有關劉小弟之照護措施，何者最正確？  
 (A)檢查前禁食4~6小時，毛地黃改靜脈注射給與  
 (B)檢查後每15分鐘測量生命徵象，持續4小時  
 (C)檢查後維持穿刺肢體平直，須臥床休息  
 (D)右心導管最常由股動脈進入右心房
- (D) 66 邱小弟，4歲，罹患重度主動脈瓣狹窄（Aortic Stenosis, AS），下列敘述何者錯誤？  
 (A)易發生充血性心衰竭，需要限制水分攝取  
 (B)容易因為活動導致缺氧發作，需進行活動限制  
 (C)觀察心跳與末梢循環，提供足夠休息與睡眠  
 (D)須執行布萊洛-陶西分流術（Blalock-Taussing Shunt）
- (D) 67 王小弟因血紅素值4.1 g/dL須輸血治療，下列敘述何者正確？  
 (A)過敏反應時，依醫囑於血袋中加入Antihistamine滴注，緩和過敏引發的症狀  
 (B)輸血過程中，王小弟抱怨注射部位灼熱感，應立即更換為5%葡萄糖水滴注  
 (C)急性溶血反應通常因輸入的血型不合所引起，大多在輸血後2小時出現症狀  
 (D)輸血過程中使用溫血器，但溫度不可高於37°C
- (C) 68 有關血友病（Hemophilia）兒童的居家照護指導，下列敘述何者最為正確？  
 (A)若出現皮膚或黏膜表層出血，宜局部加壓並於凝血後給與熱敷  
 (B)學齡前期兒童可指導其學習凝血因子之皮下注射  
 (C)可使用軟毛牙刷及口腔保健，預防齲齒  
 (D)家裡需常備acetaminophen、aspirin、codeine等止痛藥物
- (D) 69 小美，5歲，罹患白血病，正處於引導緩解期，對於此階段的護理照護指導，下列敘述何者錯誤？  
 (A)監測小美的血球計數，接觸前後需要洗手，執行侵入性治療嚴守無菌原則  
 (B)依醫囑注射顆粒球生成因子，提高小美的嗜中性白血球數，提升防禦能力  
 (C)此階段會採取密集和積極的治療，主要透過人工血管進行化學治療  
 (D)若接受脊髓腔內（intrathecal）注射化學藥物後，需鼓勵立即下床活動避免血栓產生
- (C) 70 初診斷為急性淋巴性白血病童有發生腫瘤溶解症候群（Tumor Lysis Syndrome）之危機，下列敘述何者錯誤？  
 (A)監測血液尿酸值 (B)針對常見代謝性異常給與相關處置  
 (C)限制水分攝取 (D)給與allopurinol
- (B) 71 有關苯酮尿症病童之臨床症狀，下列敘述何者正確？  
 (A)出生即出現酮酸中毒 (B)一般症狀包括嘔吐、尿、體汗有霉臭味  
 (C)皮膚色澤呈現潮濕紅潤，髮色烏黑 (D)黃疸、生長遲緩、白內障
- (B) 72 小芳，17歲，即將準備接受造血幹細胞移植，下列敘述何者錯誤？  
 (A)移植前高劑量的化學治療是要破壞骨髓及癌細胞，使植入的幹細胞有生長空間  
 (B)急性移植體對抗宿主疾病（GVHD）可能在幹細胞移植後4~6個月之間出現  
 (C)移植過程需採保護性隔離並觀察有無副作用  
 (D)使用Hickman 輸注幹細胞後，約需14~28天才會開始造血
- (B) 73 下列何者為評估病童「重度脫水」時會有的症狀或徵象？  
 (A)頻尿 (B)哭沒有眼淚 (C)體重減輕<5% (D)脈搏下降
- (C) 74 王小弟，6歲，因下腹部疼痛、噁心、嘔吐等現象到急診室求治，懷疑闌尾炎，有關闌尾炎的評估，下列何者最適當？  
 (A)柯林氏徵象（Kernig's sign） (B)布魯伯氏徵象（Blumberg's sign）

- (C)羅氏徵象 (Rovsing's sign) (D)墨菲氏徵象 (Murphy's sign)
- (C) 75 有關病童罹患腸套疊 (Intussusception) 之治療和護理措施，下列敘述何者正確？  
 (A)可採臥睡壓迫腸子促使自動復位  
 (B)若需執行外科手術，可以拉扯方式將嵌入腸道復位避免壞死  
 (C)鉭劑灌腸是以液體和空氣壓力將嵌入腸子推回原位  
 (D)腸套疊治療復位後可立即出院
- (B) 76 吳小弟，5個月大，持續腹瀉，有關護理指導的敘述，下列何者較不適當？  
 (A)以中性溫和肥皂及清水清洗臀部並擦乾  
 (B)需泡兩倍濃度的全奶，防止營養不良  
 (C)建議可改喝無乳糖配方奶粉  
 (D)輕中度腹瀉可給與電解質口服液治療
- (B) 77 有關肌肉失養症 (Muscular Dystrophy) 病童之臨床表徵與處置，下列敘述何者不適當？  
 (A)症狀乃因缺乏肌縮蛋白 (Dystrophin) 導致  
 (B)病童站立時出現巴羅氏徵象 (Barlow's sign)  
 (C)游泳是促進全身肌肉強度最好的運動  
 (D)血液檢查CPK、aldolase、AST數值偏高
- (B) 78 兒童罹患雷氏症候群 (Reye's Syndrome) 常會有複雜性合併症產生，有關其病因和症狀，下列敘述何者正確？  
 (A)為代謝性腦病變合併胰臟病變的疾病 (B)可能與使用含阿斯匹靈 (aspirin) 退燒有關  
 (C)血液中氨 (ammonia) 值下降 (D)血糖濃度增加
- (B) 79 小琪，5歲，診斷為中度腦性麻痺 (Cerebral Palsy)，有咀嚼、吞嚥控制困難問題，有關飲食之居家照顧指導，下列敘述何者錯誤？  
 (A)可以三指下顎控制法 (three-finger jaw control) 協助小琪進食  
 (B)儘量將食物置於舌頭前方，避免哽塞  
 (C)餵食姿勢應維持頭部正中位置，使肩部前屈  
 (D)液態過稀的物質，可用增稠劑以利吞嚥順暢
- (A) 80 小花，3歲，因腦膜炎 (Meningitis) 導致顱內壓升高，不會出現下列何種臨床徵象？  
 (A)前囟門鼓脹或膨出 (B)躁動不安 (C)發燒 (D)嘔吐

【版權所有，翻印必究】