

《內外科護理學》

- (C) 1 腰椎椎間盤突出接受椎板切除術後之護理指導，下列何者錯誤？
 (A)使用中硬度的床墊，維持脊椎正常排列
 (B)背架使用3~6個月，下床時須整天穿著背架，只有洗澡時可取下
 (C)手術後應該採俯臥及睡高枕，臥床時仍應該進行全關節運動
 (D)在可接受的情況下，可以進行俯臥抬頭和俯臥抬腿之運動
- (A) 2 有關重症肌無力病人之藥物使用護理指導，下列敘述何者正確？
 (A)鼓勵進食高蛋白食物，降低prostigmin的副作用
 (B)運動後服用mestinon，避免肌肉無力
 (C)azathioprine不可以與prednisone合併使用，會降低療效
 (D)若口服藥無效時，可以使用放射線I125治療
- (C) 3 有關糖尿病病人運動之護理指導，下列何者正確？①運動可降低細胞對胰島素的敏感性而降低血糖 ②運動最好在飯後1~2小時做 ③運動型態建議使用大肌肉群的有氧運動 ④切勿注射完胰島素後立刻運動，以免發生高血糖現象
 (A)①② (B)①④ (C)②③ (D)③④
- (A) 4 若右眼外旋神經受到血腫壓迫導致複視 (diplopia)，病人在下列那一種指示下，右眼複視最為明顯？
 (A)向右看 (B)向左看 (C)向前看 (D)閉左眼
- (A) 5 有關病人因腦腫瘤引起顱內壓升高的症狀與徵象，下列敘述何者錯誤？
 (A)血壓下降 (B)視力模糊或出現視乳突水腫
 (C)頭痛或出現嘔吐 (D)心跳變慢
- (B) 6 張先生因高處跌下導致脊髓損傷住院，護理師可經由下列何種反射出現，而知張先生已渡過脊髓休克期？
 (A)作嘔反射 (B)肛門反射 (C)頭眼反射 (D)角膜反射
- (A) 7 關於腦瘤伽馬刀 (gamma knife) 立體定位放射線手術之敘述，下列何者正確？①適用於直徑小於3公分腫瘤 ②不會有手術切開傷口 ③治療時間約需半小時 ④使用碘放射線射入腫瘤以破壞腫瘤細胞
 (A)①②③ (B)①②④ (C)①③④ (D)②③④
- (D) 8 重症肌無力病人使用抗膽鹼酯酶藥物的護理指導，下列何者正確？①腹部絞痛可能為劑量不足徵象 ②鼓勵進食高蛋白食物預防副作用 ③血壓上升可能為劑量過量徵象 ④務必準時服藥因延遲服藥可能會喪失吞藥力量
 (A)①② (B)①④ (C)②③ (D)②④
- (B) 9 下列何者可用來做為大腸癌手術後是否復發的參考指標？
 (A) α -胎兒蛋白 (AFP) (B)癌胚胎抗原 (CEA)
 (C)C-反應蛋白 (CRP) (D)腫瘤壞死因子 (TNF)
- (C) 10 李先生因胃癌接受次全胃切除手術 (Billroth II)，術後開始進食稀飯，約20分鐘出現腹脹、噁心嘔吐、心悸、頭暈等現象，下列何者為其最可能造成的原因？
 (A)食糜快速進入腸道，引起細胞內、外液電解質不平衡
 (B)高張性碳水化合物食糜進入腸道，促使Insulin大量分泌
 (C)細胞外液迅速移入腸道，快速液體移位減少了循環血量
 (D)高張性脂肪性食糜進入腸道，促使Amylase大量分泌
- (D) 11 有關消化性潰瘍的治療藥物，下列何者錯誤？

- (A)制酸劑(B)前列腺素合成劑
(C)質子幫浦抑制劑(D)第一型組織胺接受器拮抗劑
- (D) 12 有關潰瘍性結腸炎 (ulcerative colitis) 的敘述，下列何者正確？①易侵犯全腸壁 ②易造成肛門瘻管 ③易有裡急後重感 ④糞便中經常帶血
(A)①② (B)①④ (C)②③ (D)③④
- (D) 13 有關腹膜炎常見的臨床表徵，下列何者錯誤？
(A)嘔吐 (B)持續腹痛 (C)腸蠕動降低 (D)體溫持續上升
- (D) 14 有關病毒性肝炎傳染途徑之敘述，下列何者錯誤？
(A)A型肝炎經由糞口 (B)B型肝炎經由血液 (C)C型肝炎經由血液 (D)D型肝炎經由糞口
- (B) 15 有關急性胃炎之護理措施，下列何者錯誤？
(A)依醫囑給予氫氧化鋁及氫氧化鎂 (B)不需禁食，仍可正常飲食
(C)避免服用水楊酸或類固醇類的藥物 (D)要有常規的作息，避免菸、酒
- (C) 16 有關食道癌的病因，下列何者正確？
(A)好發於食道1/3段 (B)以腺狀細胞癌最常見
(C)喜食過熱、過鹹、刺激性食物者 (D)女性罹病率高於男性
- (A) 17 有關骨質疏鬆症護理指導之敘述，下列何者錯誤？
(A)採取非負重活動比負重活動好，以強化骨骼
(B)下床活動時，可使用骨科支架，以減輕疼痛
(C)每天日曬至少15分鐘增加維生素D合成，以增加鈣質吸收
(D)不可同時使用高纖食物與高鈣食物，以避免影響鈣質吸收
- (B) 18 右小腿上石膏病人，出現下列何項臨床表徵，需要立即給予處理？
(A)右腳大拇趾甲床微血管充填時間2秒 (B)右腳小腿末端出現感覺異常
(C)右小腿石膏內皮膚發癢 (D)右側足背動脈脈搏強度2+
- (D) 19 承上題，下列何者為病人最適當的處置？
(A)將右小腿抬高於心臟 (B)給予右小腿末端冷敷
(C)以彈性繃帶加壓包紮右大腿 (D)去除右小腿石膏
- (A) 20 有關接受關節腔鏡檢查病人的陳述，下列何者顯示需要進一步的護理指導？
(A)「檢查後若無不舒服，我可以立即恢復日常活動」
(B)「我應該要注意關節有無血腫情形的發生」
(C)「我會檢視我的神經、血管功能是否受到影響」
(D)「檢查後我要特別注意有無發燒或是部位有無紅腫」
- (C) 21 有關急性鼻竇炎的處置，下列何者錯誤？
(A)抗生素至少要連續使用7天以上 (B)可以使用解熱鎮痛劑緩解發燒及疼痛
(C)鼻噴劑可以隨時使用以改善鼻塞症狀 (D)使用蒸氣吸入可以促進鼻竇引流
- (B) 22 有關鼻咽癌病人接受放射線治療之護理指導，下列何者錯誤？
(A)避免冰敷或熱敷治療部位皮膚 (B)用含酒精漱口水以保持口腔清潔
(C)治療期間宜多作張口及咀嚼運動 (D)可以多增加水分攝取
- (D) 23 有關喉癌術後放置永久性喉切除管 (Laryngectomy tube) 病人的出院護理指導，下列何者不適宜？
(A)每天以濕毛巾清潔造口周圍皮膚
(B)坐起或翻身時需以手托後頸，避免頸部過度伸張
(C)咳嗽或打噴嚏時，用手帕蓋住造口處，另一手掩住嘴巴
(D)鼓勵採用固定於牆上的壁掛式淋浴設備
- (D) 24 有關美尼爾氏症候群的症狀，下列何者錯誤？

- (A)耳鳴 (B)眩暈 (C)單側耳聽力減退 (D)耳痛
- (D) 25 有關心內膜炎周邊症狀之敘述，下列何者錯誤？
 (A)指甲床上會出現裂紋般的出血 (Splinter hemorrhage)
 (B)手掌或腳底出現無痛性的紅斑，稱為賈尼威病灶 (Janeway's lesions)
 (C)手指或腳趾出現疼痛性的紅色結節，稱為奧斯勒氏結節 (Osler's nodes)
 (D)四肢末梢出現出血點，稱為羅氏斑 (Roth's spots)
- (D) 26 有關心肌病變臨床表徵之敘述，下列何者錯誤？
 (A)心律不整 (B)心搏過速 (C)端坐呼吸 (D)心輸出量增加
- (D) 27 有關第一期心臟復健，下列敘述何者錯誤？
 (A)以新陳代謝當量 (metabolic equivalent, MET) 指標作為活動量的指引
 (B)採漸進方式的增加活動量
 (C)血壓上升不超過正常血壓值25 mmHg
 (D)活動時增加的心跳速率至少要超過休息時的25%
- (C) 28 有關心肌梗塞急性期的治療，下列敘述何者正確？①從鼻套管給10 L/min 氧氣 ②給予麻醉性止痛劑止痛，如morphine ③給予血栓溶解劑治療 ④給予抗凝血劑治療 ⑤補充維生素K
 (A)①②③ (B)①④⑤ (C)②③④ (D)③④⑤
- (A) 29 有關心臟節律器放置術後護理措施之敘述，下列何者不適宜？
 (A)心電圖上出現心室激搏波 (spike) 時，應立即通知醫師
 (B)每日評估植入處傷口有無發炎、血腫情形
 (C)術後隔日，植入側的手臂宜避免抬高的關節運動
 (D)術後第一小時應每15分鐘評估生命徵象
- (D) 30 有關血管產生動脈粥狀硬化 (atherosclerosis) 的病理機轉，下列敘述何者錯誤？
 (A)血管內皮細胞損傷 (B)血小板凝集增加、血塊凝集
 (C)交感神經受刺激分泌兒茶酚胺 (D)周邊血管擴張心肌供氧增加
- (A) 31 有關風濕熱與風濕性心臟病之敘述，下列何者錯誤？
 (A)好發於65歲以上女性病人 (B)主要臨床症狀為心肌炎
 (C)最常侵犯二尖瓣 (D)紅血球沉降速率增加
- (D) 32 有關靜脈曲張之護理指導，下列敘述何者正確？
 (A)建議穿著緊身衣 (B)無需維持理想體重 (C)不宜運動以避免惡化 (D)睡前可抬高患肢
- (D) 33 有關急性移植物對抗宿主疾病 (Graft-versus-host-Disease, GVHD) 之敘述，下列何者正確？
 (A)通常發生在移植後六個月 (B)全身器官皆會侵犯
 (C)不會有發炎反應 (D)大多是表皮組織受到破壞
- (B) 34 張小姐，42歲，診斷為乳癌第二期，日前進行癌症治療，有關腫瘤標記之敘述，下列何者錯誤？
 (A)腫瘤標記為一系列與癌症相關、可測量之特殊化學物質
 (B)CA-15-3為早期鑑別診斷乳癌發生的標記
 (C)腫瘤標記不建議用於篩檢、輔助診斷或預測預後
 (D)對於較早期之癌症敏感度很低
- (A) 35 王先生，67歲，體重90公斤，BMI：30kg/m²，平時菸酒不離手且愛吃醃漬食品，下列護理措施何者不適宜？
 (A)飲食可不用限制 (B)轉介減重門診
 (C)建議增加蔬菜水果攝取，每天至少攝取5份 (D)轉介院內戒菸門診
- (D) 36 下列何者為避免結腸癌的保護因子？①鼓勵食用紅肉 ②不需限制油脂的攝取 ③維持適當

- 的體重 ④維持規律運動 ⑤補充適當的纖維攝取
 (A)①③⑤ (B)②③④ (C)②④⑤ (D)③④⑤
- (C) 37 下列何項處置最能減緩因接受化學治療而發生口腔黏膜損傷所造成的疼痛？
 (A)暫時停止化學治療 (B)監測病人的全血球計數
 (C)持續良好的口腔清潔 (D)定期檢查口腔黏膜炎症狀與徵象
- (A) 38 王小姐最喜歡吃速食，餐餐吃都不膩，最近出現口炎、吞嚥困難且指甲萎縮變薄呈湯匙狀，醫師告知為貧血，王小姐最有可能罹患那一種貧血？
 (A)缺鐵性貧血 (B)惡性貧血 (C)葉酸缺乏性貧血 (D)再生不良性貧血
- (D) 39 有關化學藥物cyclophosphamide (Cytosan) 的副作用或毒性，不包括下列何者？
 (A)出血性膀胱炎 (B)骨髓抑制 (C)心臟毒性 (D)畏光
- (D) 40 王先生因疲倦、蒼白、呼吸困難至醫院求治，檢查發現白血球數值為30 萬/ μL ，骨髓檢查發現費城染色體，最有可能罹患下列何種疾病？
 (A)急性淋巴性白血病 (B)慢性淋巴性白血病 (C)急性骨髓性白血病 (D)慢性骨髓性白血病
- (B) 41 有關上腔靜脈症候群之敘述，下列何者正確？
 (A)以淋巴瘤的病人最常發生
 (B)常見症狀有臉部腫脹、頭痛、呼吸困難等
 (C)協助病人採側臥平躺的姿勢，較能改善此症狀
 (D)非小細胞癌病人可用化學治療來改善此症狀
- (B) 42 有關癌症疼痛處置之敘述，下列何者正確？
 (A)脊椎硬膜外注入止痛藥物後，病人要平躺6~8小時
 (B)病人自控式止痛法可減少藥量使用，延長用藥間隔時間
 (C)冷熱療法會降低疼痛的閾值而減輕疼痛
 (D)冷療法要持續使用不可間斷，以免降低效果
- (D) 43 有關原發性皮膚病變之敘述，下列何者正確？
 (A)結節是由皮膚隆起的堅實性病變，直徑小於1公分
 (B)丘疹為皮膚表面硬塊，侷限於皮下不會有皮膚隆起，直徑大於1公分
 (C)玫瑰疹為一種暫時性、急性、侷限性及無特定大小的表皮浮腫和微血管擴張情形
 (D)紫斑是皮膚組織內出血所致的紫紅色斑塊，壓下不會變色
- (C) 44 有關牛皮癬之敘述，下列何者正確？
 (A)間接性發作，夏天出現冬天消失
 (B)好發部位為頭皮、手肘伸側及膝蓋呈不對稱分布
 (C)皮膚由邊緣明顯的紅斑轉變成易脫落的銀灰色鱗屑
 (D)在病灶表皮的角質層出現微小膿瘍稱為柯納氏現象 (Koebner's phenomenon)
- (B) 45 有關電燒傷所造成的身體損傷，下列敘述何者正確？
 (A)身體所造成的損傷只有在電流入口及出口處
 (B)交流電造成的傷害較直流電嚴重
 (C)對電流阻力越大的組織越不易造成損傷
 (D)骨骼的電流阻力小於血管
- (C) 46 熱燒傷病人進行水療法時之護理措施，下列何者最適宜？
 (A)水溫調配維持32~34°C，以減少傷口疼痛
 (B)水池中加入beta-iodine 30~50ppm，以抑制細菌生長
 (C)水池中每公升加入0.85 公克的食鹽，以補充流失的電解質
 (D)水療時間每次以一小時為宜，使痂皮鬆脫
- (C) 47 下列何者屬於主動性後天免疫？

- (A)由遺傳而來所產生的抵抗力 (B)注射免疫球蛋白而獲得的抗體
(C)接種疫苗使人體產生抗體 (D)母親經由胎盤將IgG傳給胎兒
- (A) 48 有關類風濕性關節炎藥物治療之敘述，下列何者錯誤？
(A)選擇性COX-2抑制劑會抑制血小板凝集，延長出血時間
(B)aspirin降低前列腺素合成，可減輕炎症及關節疼痛
(C)非固醇類抗炎藥（NSAIDs）是第一線用藥
(D)育齡婦女接受疾病調節抗風濕藥物治療時必須避孕
- (C) 49 有關免疫球蛋白特性之敘述，下列何者正確？
(A)IgG含量少，能通過胎盤，提供新生兒抗體
(B)IgD與T淋巴球的分化有關
(C)IgE可附在肥大細胞上，引發過敏反應
(D)IgM是感染細菌或病毒後最後出現的抗體
- (D) 50 有關後天免疫缺乏症候群（AIDS）病人出現營養少於身體需要時之護理措施，下列何者錯誤？
(A)提供高熱量、高蛋白之飲食 (B)口腔念珠菌感染時可使用nystatin含漱
(C)可使用檸檬水或小蘇打水漱口，以促進食慾 (D)提供高纖飲食，以促進腸胃蠕動
- (B) 51 評估一位氣胸且剛接上胸管病人的胸腔水下引流系統裝置，下列何者為不正常現象？
(A)水封瓶內長玻管保持在液面下2~3公分 (B)水封瓶內會出現連續性氣泡
(C)水封瓶中液面在吸氣時上升 (D)水封瓶中液面在呼氣時下降
- (B) 52 下列何者不是肺水腫病人之典型臨床表徵？
(A)動脈氧分壓（PaO₂）48mmHg (B)肺動脈楔壓（PAWP）14mmHg
(C)頸靜脈怒張 (D)中心靜脈壓（CVP）18cmH₂O
- (B) 53 王先生胸壁受到鈍傷入院求治，下列何者表示可能有肺挫傷的情形？
(A)呼吸緩慢 (B)呼吸音降低 (C)桶狀胸 (D)受傷部位有吸吮聲
- (C) 54 葉先生為COPD病人，醫囑為：fenoterol（Berotec）2 puffs INHA BID，下列何者表示其使用正確？
(A)使用前不應搖晃瓶身 (B)連續按壓兩次噴霧劑然後吸入藥物
(C)吸藥後閉氣10秒鐘再緩慢吐氣 (D)使用完後應立即漱口
- (B) 55 陳女士是氣喘病人，過去四週內發生：日間出現氣喘症狀每週一次、因氣喘在夜間醒來兩次、日常活動未因氣喘受影響、需要使用藥物緩解症狀每週超過兩次。依照GINA（Global Initiative for Asthma,2019）對氣喘控制程度，其屬於下列何者？
(A)控制良好 (B)部分控制 (C)控制不佳 (D)控制很差
- (A) 56 下列何者是誘發病人發生急性呼吸窘迫症候群（ARDS）最常見的危險因子？
(A)敗血性休克 (B)慢性阻塞性肺疾病 (C)氣喘 (D)心衰竭
- (D) 57 有關單側自發性氣胸病人之身體檢查評估結果，下列何者錯誤？
(A)吸氣時，胸廓兩側不對稱 (B)患側觸覺震顫減弱
(C)患側叩診為過度反響音 (D)橫膈膜離軌度變大
- (C) 58 下列何者最不可能出現在肺氣腫病人的肺功能檢查結果？
(A)肺總量（TLC）增加
(B)第一秒鐘用力吐氣容積（FEV₁）降低
(C)第一秒鐘用力吐氣容積與用力肺活量之比值（FEV₁/FVC）大於80%
(D)肺餘容積（RV）增加
- (C) 59 有關多重共病腎衰竭病人之服藥注意事項，下列何者錯誤？
(A)糖尿病腎病變病人的胰島素使用量可能需要減量

- (B)毛地黃使用要注意頭痛、心律不整等中毒症狀
 (C)貧血時補充鐵劑要合併制酸劑使用避免腸胃症狀
 (D)腸胃不適避免使用含鎂離子的制酸劑或胃乳制劑
- (D) 60 有關前列腺癌之敘述，下列何者錯誤？
 (A)排尿困難、頻尿、血尿與尿瀦留是常見的症狀
 (B)直腸指診和前列腺特異抗原是篩檢的診斷方法
 (C)轉移時最常出現背痛、腰痛、血鈣異常
 (D)前列腺癌與雄性素有關係，好發於前列腺的中葉
- (C) 61 有關慢性腎絲球腎炎之敘述，下列何者正確？①肌酸酐清除率（CCr.）數值異常上升 ②血尿素氮及血肌酸酐的數值會異常升高 ③可由經皮腎臟組織切片檢查早期確診 ④腎皮質變厚及腎臟變大
 (A)①② (B)①④ (C)②③ (D)③④
- (B) 62 有關腎病症候群之臨床表徵，下列何者正確？①高白蛋白血症 ②出現蛋白尿 ③高血脂症 ④血中膠體滲透壓上升
 (A)①④ (B)②③ (C)①② (D)③④
- (C) 63 有關急迫性尿失禁之照護，下列敘述何者正確？①可給予副交感神經藥物 ②指導膀胱訓練法 ③指導病人使用尿失禁輔助用品如護墊或尿布 ④施行人工尿道括約肌植入術
 (A)①② (B)①④ (C)②③ (D)③④
- (D) 64 下列何者會出現間歇性無痛血尿之症狀？①尿道炎 ②輸尿管結石 ③膀胱癌 ④腎臟癌
 (A)①② (B)①④ (C)②③ (D)③④
- (A) 65 有關腎臟移植之合併症，下列敘述何者不適當？
 (A)最常見的合併症是感染、出血 (B)使用免疫抑制劑常出現肺部感染
 (C)術後高血壓可能因為腎動脈狹窄 (D)出現胃潰瘍是因使用大量類固醇
- (A) 66 黃女士的動脈血液氣體分析結果為完全代償性代謝性酸中毒，下列敘述何者正確？
 (A) pH 7.35、PaCO₂ 30mmHg、HCO₃⁻ 20mmHg、PaO₂ 81mmHg
 (B) pH 7.31、PaCO₂ 28mmHg、HCO₃⁻ 19mmHg、PaO₂ 80mmHg
 (C) pH 7.32、PaCO₂ 47mmHg、HCO₃⁻ 23mmHg、PaO₂ 82mmHg
 (D) pH 7.33、PaCO₂ 36mmHg、HCO₃⁻ 18mmHg、PaO₂ 83mmHg
- (B) 67 有關皮質醇（Cortisol）之敘述，下列何者正確？
 (A)是腎上腺皮質分泌最少的類固醇
 (B)皮質醇在血漿中的濃度以早上起床後6~8點濃度最高
 (C)會降低血糖
 (D)會降低身體對抗壓力及發炎的效果
- (C) 68 有關嗜鉻細胞瘤病人的護理措施，下列何者錯誤？
 (A)注意有無頭痛、視力改變、胸痛、意識混亂等病症
 (B)讓病人充分休息，避免壓力發生
 (C)鼓勵攝取低維他命、低蛋白質、低礦物質及低熱量食物
 (D)避免喝咖啡、茶
- (B) 69 有關愛迪生氏危機病人的護理措施，下列何者錯誤？
 (A)監測生命徵象、輸出入量、電解質 (B)執行限水計畫，每天攝水量少於1,000c.c.
 (C)鼓勵攝取含鈉及高蛋白質食物 (D)指導病人避免攝取香蕉、南瓜
- (C) 70 有關胰島素保存之護理指導，下列何者正確？
 (A)未開罐的胰島素可以在常溫中保存 (B)使用中的胰島素應冷藏2~8°C的環境
 (C)出國旅遊勿將胰島素置於飛機行李艙 (D)開罐前若發現藥瓶內出現顆粒時需搖勻

- (D) 71 有關胰島素注射之敘述，下列何者正確？
(A)吸收胰島素的速率依序是：腹部>臀部>大腿>上臂
(B)建議將胰島素注射於即將運動的肢體上，避免吸收過慢
(C)注射同一部位應隔2~3 週才可重複，以防注射皮膚感染
(D)若糖尿病病人因感染而發燒，會加速胰島素藥效的吸收
- (B) 72 有關升糖指數飲食指導之敘述，下列何者正確？①升糖指數是指人體食用含醣食物後，血中葡萄糖反應的速度和強度 ②糖尿病人要選擇高升糖指數食物，以免造成低血糖 ③乳品類食物升糖指數較高，常見的食物，如：全脂奶 ④全穀類食物升糖指數較低，常見的食物，如：全麥早餐穀類
(A)①② (B)①④ (C)②③ (D)③④
- (C) 73 有關第1 型糖尿病之敘述，下列何者錯誤？
(A)病因與自體免疫反應有關 (B)空腹血清C-勝肽濃度無法偵測
(C)會慢慢出現無症狀的高血糖情形 (D)常見合併症為酮酸中毒 (DKA)
- (C) 74 有關甲狀腺功能低下之臨床表徵，下列何者錯誤？
(A)周邊血管阻力增加 (B)聽診心臟有分裂音 (C)葡萄糖吸收增加 (D)惡性 (巨球性) 貧血
- (A) 75 下列何者為永久性心臟節律器之適應症？
(A)完全房室傳導阻斷 (B)心房早期收縮 (C)心室早期收縮 (D)心房撲動
- (C) 76 選擇鼻咽人工氣道適當尺寸之量測方式，下列何者正確？
(A)嘴角至耳垂之距離 (B)嘴角至下顎角之距離
(C)鼻尖至耳垂之距離 (D)鼻孔至下顎角之距離
- (A) 77 有關敗血症第一小時組合照護 (hour-1 bundle) 之敘述，下列何者正確？①應快給與抗生素使用，但須先做血液培養 ②施打1種或多種廣效抗生素療程約7~10天 ③病人低血壓或血清乳酸值大於2mmol/L，應儘快輸液以40 mL/kg量輸注 ④病人低血壓在輸液後維持平均動脈壓至少大於或等於60mmHg
(A)①② (B)①③ (C)②④ (D)③④
- (B) 78 當車禍造成嚴重創傷的病人送到急診出現：脈搏124次/分、呼吸32次/分胸部起伏明顯，血壓130/100mmHg、皮膚溼且冰冷、尿量減少、呈現呼吸性鹼中毒情形，下列休克階段的分期，何者正確？
(A)早期 (B)代償期 (C)進行期 (D)不可逆期
- (C) 79 有關嚴重特殊傳染性肺炎COVID-19之護理措施，下列何者正確？
(A)無休克證據，仍應給予大量輸液治療
(B)常規性給予全身性皮質類固醇
(C)避免使用Nebulizer 等氣霧式治療
(D)常規使用高流量鼻導管 (High-flow Nasal Oxygen, HFNO) 給氧
- (D) 80 有關流感併發重症的敘述，下列何者錯誤？
(A)第四類法定傳染病，一星期內需通報 (B)高危險群包括精神、氣喘等慢性病病人
(C)發病後，高燒 (39°C) 持續三天以上 (D)淋巴球數目與CRP或LDH持續上升