

《產兒科護理學》

- (A) 1. 有關孕產婦死亡率之敘述，下列何者正確？
- A. 係指一年內每十萬名活產中，於懷孕期間或懷孕終止42天之內之婦女死亡數
 - B. 係指一年內每十萬名活產中，於第三妊娠期或懷孕終止7天之內之婦女死亡數
 - C. 係指一年內每十萬名活產中，於第三妊娠期或懷孕終止30天之內之婦女死亡數
 - D. 係指一年內每十萬名活產中，於懷孕期間或懷孕終止24小時之內之婦女死亡數
- (A) 2. 有關妊娠期血液檢查之敘述，下列何者正確？
- A. 首次產檢需要篩檢人類免疫缺乏病毒
 - B. 第一妊娠期進行母體血液葡萄糖耐受篩檢
 - C. 第二妊娠期進行B群鏈球菌篩檢
 - D. 第三妊娠期進行德國麻疹抗體濃度價數篩檢
- (D) 3. 王先生將成為準父親，有關王先生於配偶孕期之心理變化，下列何者最適當？
- A. 第一孕期最常出現害怕生產的壓力
 - B. 第二孕期最擔憂是否能勝任成為父親的角色
 - C. 第一孕期常因胎動而感覺與胎兒連成一體
 - D. 第二孕期常會想像胎兒模樣及身為父親的形象
- (D) 4. 王女士，32歲，妊娠8週，前一胎因21對染色體異常引產，詢問此次有關唐氏症篩檢之敘述，下列何者最合適？
- A. 建議妊娠16～18週之間，可以接受絨毛膜穿刺，確定胎兒染色體是否正常
 - B. 建議妊娠11～12週之間，可以接受羊膜腔穿刺，確定胎兒染色體是否正常
 - C. 建議妊娠21～24週之間，可以進行母血唐氏症篩檢，確定胎兒染色體是否正常
 - D. 建議妊娠15～20週之間，可以接受頸部透明帶的檢測，確定胎兒染色體是否正常
- (B) 5. 有關妊娠期的心臟血管系統生理變化，下列敘述何者錯誤？
- A. 出現生理性白血球增多症，白血球數量可增加到15,000/mm³
 - B. 妊娠生理性貧血是因紅血球攜鐵蛋白的能力降低所致
 - C. 心輸出量增加30～50%，以供應子宮、胎盤需要血流
 - D. 血漿中白蛋白降低，使得水分易滯留在血管間隙形成水腫
- (C) 6. 有關孕期的營養需求，下列敘述何者錯誤？
- A. 於第三孕期多補充鐵劑
 - B. 整個孕期應多補充碘
 - C. 磷可參與早期的細胞分裂過程
 - D. 鈣質提供胎兒骨骼和牙齒的生長發育
- (B) 7. 葉女士，28歲，G1P0，待產過程中突然自然破水，內診發現子宮頸口開8公分、變薄程度80%、先露部位+1。下列何者為最優先之護理處置？
- A. 提供灌腸
 - B. 監測胎心率變化
 - C. 提供氧氣
 - D. 採平躺增加子宮血流
- (D) 8. 陰道生產過程，下列何種情形表示先露部位胎頭已發生著冠（crowning）？
- A. 當子宮收縮時，胎頭顱頂上出現一圈可見的壓痕
 - B. 當子宮收縮時，胎頭出現於陰道口，宮縮間歇時，胎頭縮回陰道內
 - C. 當子宮收縮時，陰道口膨出可見胎頭，大小呈卵圓形

- D.當宮縮間歇時，胎頭出現於陰道口且不會縮回陰道內
- (A) 9.有關分娩期預防產後出血的措施，下列何者不適當？
- 待產婦在進入第二產程前，開始持續靜脈注射methylergometrine (Methergin)
 - 胎盤娩出後，檢查胎盤以確認胎盤完整娩出
 - 在新生兒及產婦狀況穩定下，協助親子立即肌膚接觸
 - 產後於恢復室觀察，每15分鐘監測產婦的血壓及出血量
- (B) 10.胎兒為頭產式，胎頭呈部分屈曲，其最可能以下列那條徑線通過產道？
- 枕下前囟徑 (SOB)
 - 枕額徑 (OF)
 - 枕頤徑 (OM)
 - 頤下前囟徑 (SMB)
- (A) 11.劉女士，G1P0，子宮頸開4公分，每3分鐘宮縮一次，無胎頭骨盆不對稱 (CPD)，使用硬脊膜外麻醉，持續2小時都未見胎頭下降，此時最優先之處置為何？
- 評估膀胱的情形
 - 評估胎頭大小
 - 給與ritodrine點滴注射，促進子宮收縮
 - 評估羊水量
- (C) 12.王女士，初產婦，陰道生產，採純母乳哺育，產後6週重返職場的一週後，主訴發燒38°C，右側乳房情況如圖所示，觸診溫熱且有痛感。最可能的診斷是？



- 因為剛剛返回工作狀態，所以最可能是壓力性乳腺管阻塞 (blocked ducts)
 - 因為幾乎整個乳房大面積發紅，所以最可能是乳房腫脹 (engorgement)
 - 因為乳頭可見傷口，所以最可能是乳腺炎 (mastitis)
 - 因為乳房3、4點鐘方向有水囊狀感，所以最可能是乳房膿瘍 (breast abscess)
- (B) 13.蔡女士，初產婦，因產程遲滯而行剖腹生產，新生兒出生體重3,800公克。產婦計畫要完全哺餵母乳，擔心自己奶水不足，因為從生產至今已兩天，都沒有脹奶的感覺，而且新生兒幾乎是含著乳房入睡，放下來就哭。有關蔡女士對奶量的擔心，下列措施何者不適當？
- 評估新生兒兩天的排尿及排便情況
 - 告訴產婦產程過長及剖腹生產都會延後脹奶出現的時間，這是正常的
 - 肯定產婦完全母乳哺育的決定，了解這兩天新生兒吃奶及含乳的情況
 - 了解產婦執行手擠乳的情況，討論增加手擠奶頻率的可行性
- (D) 14.何女士，G1P1，採陰道分娩，無任何產後合併症，產後4小時，觸診子宮底時發現位於臍上

一指且偏右，下列何者為首要的護理措施？

- A.子宮按摩
- B.下床活動
- C.多喝開水
- D.如廁解尿

(A) 15.有關產後婦女之情緒照顧，下列護理指導何者不適當？

- A.初產婦出現哭泣不安及缺乏育兒信心為產後憂鬱症，應儘速就醫
- B.在接受期（taking-in phase），鼓勵產婦陳述生產經驗，接受其感受，必要時可澄清其疑慮
- C.在緊執期（taking-hold phase），鼓勵參與及學習新生兒照護
- D.產婦即使進入放手期（letting-go phase），仍可能有不自覺的哀傷情緒

(C) 16.婦女產後痛（after pain）主要是評估下列那一個器官或組織之健康問題？

- A.乳房、乳頭疼痛
- B.會陰、會陰傷口疼痛
- C.子宮、子宮間歇性收縮不適感
- D.肛門、痔瘡痛

(A) 17.抱起新生兒放入磅秤測量體重，新生兒四肢出現對稱性的外展和伸直，大拇指與食指呈C字形，是下列那種反射表現？

- A.擁抱反射（moro reflex）
- B.驚嚇反射（startle reflex）
- C.手掌抓握反射（palmer grasp reflex）
- D.退縮反射（withdrawal reflex）

(D) 18.方小妹，39週頭產式出生，下列何者新生兒身體評估結果為異常發現？

- A.胎頭變形（molding）
- B.結膜下點狀出血
- C.硬腭小白點（艾柏斯坦小珠Epstein's pearls）
- D.耳朵上緣位於內外眼眥連線以下

(D) 19.下列何者為評估男性新生兒皮膚飽和度的最佳部位？

- A.陰囊
- B.四肢末端
- C.眼瞼
- D.腹部

(B) 20.王女士，G1P0，妊娠38週，因早期破水入院待產，待產時宮縮頻率及強度均不好，破水30小時後新生兒才娩出。產後第2天出現下列症狀：體溫38.5~39.5℃、惡露呈紅色有惡臭味、子宮底高度臍平、子宮軟、有頭痛及失眠、下腹部壓痛但無反彈性壓痛。上述王女士的身體狀況，其臨床症狀敘述下列何者正確？

- A.會陰傷口感染
- B.子宮內膜炎
- C.腹膜炎
- D.泌尿道感染

(B) 21.接受子宮頸環紮術（cervical cerclage）之孕婦狀況，下列何者最適合？

- A.上一胎足月產但此胎妊娠16週，子宮頸口擴張4公分
- B.前兩次均在妊娠21週時無痛性流產，此胎在16週子宮頸長度3.3公分
- C.妊娠18週有破水且有規則宮縮痛，內診發現子宮頸口擴張2公分
- D.前胎31週早產，此胎在28週例行性超音波發現子宮頸長度1公分

- (B) 22. 有關妊娠糖尿病之敘述，下列何者正確？
A. 妊娠初期胎盤分泌人類胎盤泌乳激素（hPL）增加，產生胰島素拮抗
B. 容易導致流產及羊水過多
C. 與糖尿病遺傳史無關
D. 口服降血糖藥為主要治療方式
- (D) 23. 李女士以oxytocin 進行引產，胎心音出現變異性減速，下列處置何者最適當？
A. 提高oxytocin滴速
B. 降低oxytocin滴速
C. 維持原來oxytocin滴速
D. 停止oxytocin的滴注
- (D) 24. 有關逆行性射精之敘述，下列何者錯誤？
A. 常見於脊髓損傷或糖尿病合併神經病變之患者
B. 可能為腹腔或骨盆腔手術後之併發症
C. 流至尿道的精液逆流至膀胱
D. 接受精子捐贈進行人工授精為唯一的治療方式
- (D) 25. 王女士罹患梅毒，王女士表示先生如果知道了，他會失去先生，不停掩面哭泣，下列護理措施何者最適當？
A. 告知王女士切勿隱瞞，因先生可能已感染，請他立即連絡先生到院檢查
B. 衛教將以抗生素進行治療，立即協助施打cefazolin
C. 告知王女士哭泣無法解決問題，請王女士堅強面對
D. 傾聽王女士的不安與擔憂，鼓勵其與先生共同面對，接受治療
- (D) 26. 小花因誤食鐵劑而送醫治療，指導小花媽媽之護理措施，下列敘述何者最適當？
A. 鐵劑通常不會沉積在肝臟或造成肝損傷
B. 一週後應注意腸胃不適或出血的症狀
C. 使用活性炭可以幫助鐵劑的吸附
D. 注射去鐵質劑，尿液會呈深褐／紅橙色
- (C) 27. 小明，16歲，高中一年級，在校成績低落、情緒不穩、易怒、缺課，曾表明想從世界消失。就醫後診斷為青少年憂鬱症。媽媽詢問護理師如何幫助小明時，下列敘述何者錯誤？
A. 讓小明知道自己生病了，需要治療
B. 多安排小明的戶外運動
C. 告知小明不要胡思亂想，應致力於課業成就
D. 多陪伴小明，避免小明獨處
- (C) 28. 有關滿15個月大幼兒之動作發展，下列敘述何者正確？
A. 能正確指出身體的一部分
B. 能重疊6塊積木
C. 不需扶持可獨自行走
D. 會自己洗手並擦乾
- (C) 29. 君君，4歲，入院接受靜脈注射和腹部手術，住院期間護理師和君君說話的內容，下列敘述何者最不適當？
A. 跟你的玩偶說你覺得害怕的事
B. 打針時跟護理師一起慢慢吸氣吐氣
C. 切開你的肚子才能把蟲拿出來
D. 你按著拔針的地方才不會流血
- (C) 30. 護理師給與2歲小廷耳滴藥的照護措施，下列敘述何者錯誤？

- A.協助病童躺向健側半側臥
B.將耳朵往下往後輕拉，使耳道變直
C.將耳藥直接滴於鼓膜上
D.滴藥後以手指按摩耳部促進藥物吸收
- (C) 31.當嬰幼兒初次接觸陌生人或新環境，會表現出接受或退縮的態度。此為氣質評估內容中那一個項目？
A.反應閾
B.適應度
C.趨避性
D.堅持度
- (C) 32.小亮，出生後診斷為腭裂（cleft palate），1歲時入院行腭裂修補術，有關術後約束之護理措施，下列敘述何者正確？
A.木乃伊約束法
B.手臂約束法
C.手肘約束法
D.背心式約束法
- (A) 33.有關早產兒發展性照護的敘述，下列何者正確？
A.提供父母與早產兒皮膚對皮膚的袋鼠式護理
B.執行治療時，固定早產兒雙臂與腿呈伸展姿勢的寧握護理
C.採分散護理，以避免早產兒生命徵象不穩定
D.保持環境明亮，早產兒戴上遮光眼罩以促進視覺發展
- (A) 34.小紅，12歲，罹患急性骨髓性白血病，治療後復發，目前處於疾病末期，她向父母發脾氣說：「為什麼生病的人是我，都是你們沒有把我照顧好！」，下列照護措施何者最適合？
A.仔細傾聽其話語，鼓勵小紅表達內心的需要
B.鼓勵接受目前的治療措施，降低治療造成的疼痛
C.鼓勵與同儕聯繫，讓其有歸屬感，並轉移焦點
D.說明父母與醫療團隊已經盡最大努力協助治療
- (D) 35.小敏妊娠週數26週出生，醫師診斷為壞死性腸炎（necrotizing enterocolitis, NEC），有關其護理照護及處置之敘述，下列何者最不適當？
A.為防止腸道受損，應避免測量肛溫
B.初期觀察小敏是否會出現活動力下降、體溫不穩及呼吸窘迫等症狀
C.立即禁食，給與全靜脈營養
D.護理評估發現腸蠕動減慢，嘔吐物不含膽汁
- (D) 36.有關預防造成新生兒猝死之睡眠環境的護理指導，下列敘述何者正確？
A.母親與嬰兒同床以方便母乳哺餵
B.嬰兒應該仰睡且以枕頭抬高頭部
C.嬰兒的枕頭旁擺放絨毛玩具以增加安全感
D.嬰兒應該避免穿過多衣服或用衣物包覆頭部
- (A) 37.有關腮腺炎（mumps）最常見的合併症，下列敘述何者正確？
A.無菌性腦膜炎
B.肺炎
C.熱性痙攣
D.續發性皮膚感染
- (B) 38.陳小弟，5歲，罹患扁桃腺炎（tonsillitis），接受扁桃腺切除手術（tonsillectomy），下列術

後護理何者正確？

- A.預防肺擴張不全，鼓勵深呼吸、用力咳嗽
- B.注意觀察是否有吞嚥或清喉嚨次數增加
- C.局部熱敷或提供熱食，促進傷口血液循環
- D.提供含維生素C飲料（如檸檬汁），促進傷口癒合

(D) 39.有關嬰幼兒呼吸道特性的敘述，下列何者錯誤？

- A.耳咽管較短且水平，較易受感染
- B.舌頭在口腔的比例較大，感染後易出現阻塞
- C.嬰兒喉頭在頸部較高處，較易出現吸入性肺炎
- D.嬰幼兒胸腔順應性較成人低

(B) 40.有關川崎氏症病童的治療及其目的，下列敘述何者正確？

- A.給與阿斯匹靈（aspirin），以促進血小板凝集
- B.給與免疫球蛋白（IVIG）可有效降低冠狀動脈瘤發生
- C.給與苯巴比特魯錠（phenobarbital）治療舞蹈症
- D.給與盤尼西林（penicillin）以預防發炎

(B) 41.有關嬰幼兒缺鐵性貧血（iron deficiency anemia）之敘述，下列何者正確？

- A.屬體染色體隱性遺傳疾病
- B.常發生於6~24個月大的足月兒
- C.紅血球體積比正常紅血球大
- D.長期貧血可能導致心跳過慢之代償反應

(A) 42.小華，6個月，罹患兒童癌症，目前接受化學治療且須治療半年以上，則小華可以接種下列何種疫苗？

- A.四合一疫苗（Tdap-IPV）
- B.水痘疫苗
- C.輪狀病毒疫苗
- D.麻疹腮腺炎德國麻疹混合疫苗

(D) 43.小萍診斷為先天性甲狀腺功能低下症，有關血液檢驗值之敘述，下列何者正確？

- A.甲狀腺素T4高於正常值、甲狀腺刺激素TSH高於正常值
- B.甲狀腺素T4高於正常值、甲狀腺刺激素TSH低於正常值
- C.甲狀腺素T4低於正常值、甲狀腺刺激素TSH低於正常值
- D.甲狀腺素T4低於正常值、甲狀腺刺激素TSH高於正常值

(C) 44.有關性早熟（precocious puberty）的敘述，下列何者正確？

- A.男孩在12歲以前、女孩在11歲以前出現第二性徵，即為性早熟
- B.血清中的LH、FSH、estrogen、testosterone皆正常
- C.中樞性性早熟可給與leuprolide acetate，以抑制促性腺激素釋放荷爾蒙（GnRH）的分泌
- D.可以腹部斷層掃描確認是否有中樞性性早熟

(B) 45.膽道閉鎖（biliary atresia）是嬰兒先天性疾病之一，下列敘述何者錯誤？

- A.常出現灰白色的大便、暗茶色的尿液
- B.容易影響脂肪的消化吸收，導致水溶性維生素缺乏
- C.膽管炎是手術後常見的合併症之一
- D.提供不需要膽汁消化的中鏈脂肪酸配方奶、高蛋白牛奶為主

(A) 46.小強罹患先天性巨結腸症（congenital megacolon），有關照護和手術之護理指導敘述，下列何者正確？

- A.保守療法應採低渣、高熱量、高蛋白飲食

- B.手術前需採肥皂水進行腸道清潔灌腸
C.術後若有造瘻口腫脹情形，則是異常現象，須立即通報醫師
D.結腸造口的黏膜並無神經，且會比周圍皮膚低
- (C) 47.有關兒童急性腹瀉時，下列護理處置何者最適當？
A.給與腸道吸附劑（kaolin-pectin），與食物一起服用
B.以雞湯取代配方奶
C.水分的補充可給與口服葡萄糖電解質水
D.配方奶泡濃一些，減少水瀉的次數
- (C) 48.有關兒童腦神經疾病導致的顱內壓升高（IICP），若無適切介入措施，常會造成兒童生命危險，下列護理措施何者正確？
A.可過度換氣讓動脈血中氧氣濃度（PaO₂）維持在27~30 mmHg
B.應維持病童房間光線明亮，避免病童因頭昏跌倒
C.協助抬高床頭約30度，維持頭頸部自然平直
D.若有痰液，教導常做深呼吸咳嗽，避免積痰而缺氧
- (A) 49.小英，6歲，罹患重症肌無力（myasthenia gravis），下列護理措施何者不適當？
A.鼓勵加強費力的活動，有助改善肌肉力量
B.若出現複視情形，需預防跌倒
C.觀察是否有呼吸困難或痰液不易咳出情形
D.眼瞼下垂是最早出現的症狀
- (A) 50.有關熱性痙攣（febrile convulsion）的敘述，下列何者最不適當？
A.發燒介於37~38°C之間，且出現單側性的全身性僵直
B.為引起幼兒抽筋或痙攣最常見的原因之一
C.發燒是誘發因素，其基礎疾病為感染性病原，如上呼吸道感染
D.發作時，若出現牙關緊閉，不可強行將兒童嘴巴打開

【版權所有，翻印必究】