《內外科護理學概要》

（D）1 下列何者不是顱內壓升高（IICP）的臨床表徵？
(A)意識程度降低 (B)躁動不安 (C)頭痛 (D)暈眩

（B）2 有關巴金森氏症（Parkinson's disease）病人之敘述，下列何者錯誤？
(A)第一階段時，單側肢體受影響 (B)第二階段時，會有智力減退現象
(C)第三階段時，反應緩慢但反射正常 (D)第四階段時，產生嚴重殘障

（C）3 下列何項不是顱底骨折的病人常見的臨床症狀？
(A)熊貓眼（Racoon eyes） (B)巴特爾氏徵象（Battle's sign）
(C)斜視 (D)半邊臉輕癱

（B）4 有關中風後知覺障礙之護理措施，下列何者正確？
(A)由患側接近病人 (B)教導病人擺動頭部，以擴大視野
(C)將環境複雜化，讓病人接受較多的知覺刺激 (D)讓病人練習做複雜性工作

（A）5 病人做腦波圖檢查時，請其放輕鬆以免下列何種腦波受到干擾？
(A) α (B) β_1 (C) β_2 (D) γ

（B）6 下列何者不會導致癲癇病人抽搐發作？
(A)喝酒 (B)咳嗽 (C)發燒 (D)缺氧

（D）7 應用格拉斯寇昏迷量表（GCS）評估使用氣管內管病人的意識程度時，下列何者爲語言反應的計分符號？
(A) 0 (B) 1 (C) T (D) E

（D）8 下列何者是確定重症肌無力症（Myasthenia gravis）最主要的診斷檢查？
(A)核磁共振顯像（MRI） (B)肌電圖（Electromyography）
(C)血液蛋白質電泳檢查 (D) Tensilon（Edrophonium）試驗

（A）9 有關口腔癌之早期徵象，下列何者正確？
(A)長久不癒的口腔潰瘍 (B)無法順利咀嚼 (C)吞嚥困難 (D)說話困難

（D）10 有關經皮肝臟切片檢查（Percutaneous liver biopsy）後之護理措施，下列何者正確？①凝血酶原時間延長，對檢查不會有任何影響 ②教導病人於穿刺前做數個深呼吸，最後作一大吐氣，摒住呼吸5-10 秒鐘 ③檢查後教導病人維持平躺2 小時，然後臥床休息24 小時 ④檢查後病人主訴右上腹疼痛，應懷疑膽汁滲漏
(A)①② (B)①③ (C)③④ (D)②④

（A）11 下列何者不是鋇劑灌腸的適應症？
(A)大腸穿孔 (B)大腸腫瘤 (C)結腸潰瘍 (D)大腸憩室

（D）12 肝硬化病人臉及腹部常出現蜘蛛狀血管痣，其主要原因爲何？
(A)脾臟腫大破壞紅血球
(B)門脈高壓引起血管擴張
(C)凝血酶原時間延長，血小板過低症
(D)肝臟荷爾蒙代謝減少，導致動情素（Estrogen）過多

【版權所有，翻印必究！】

（C）13 經由糞-口途徑傳染的病毒性肝炎爲下列那兩型？
(A) A 型與D 型 (B) C 型與E 型 (C) A 型與E 型 (D) C 型與D 型

（A）14 監測原發性肝臟腫瘤病人的治療成效，下列那一項指標最重要？
(A) AFP（α-胎兒蛋白） (B) CEA（癌胚胎抗原）
(C) CRP（C-反應蛋白） (D) TNF（腫瘤壞死因子）

（A）15 江先生，170 cm，80 kg，從事搬運工，因腹股溝疝氣接受手術治療，下列有關疝氣手術後護理指導，何者正確？①冰敷傷口區以預防陰囊水腫 ②不需要特別減重以免營養不良 ③出院後可立即上班工作 ④平時應多吃蔬果以預防便秘
(A)①④ (B)②③ (C)①③ (D)②④

（C）16 經由下列何項病人主訴，可以推測病人最可能患有十二指腸潰瘍？
(A)「吃了東西之後痛得更厲害。」 (B)「疼痛很少發生在半夜。」
(C)「吃了東西後，疼痛就改善多了！」 (D)「把吃的東西吐出來之後就舒服多了！」

（D）17 痛風最常侵犯下列那個關節？
(A)頸椎關節 (B)腰椎關節 (C)髖關節 (D)掌趾關節

（C）18 下列何者不屬於評估肢體神經血管功能的6P 徵象？
(A) Pain (B) Paresthesia (C) Pink (D) Pulselessness

（D）19 下列何者是維持肌力最有效之方法？
(A)被動性關節活動 (B)主動性關節活動 (C)傾斜床的訓練 (D)等長肌肉收縮

（C）20 有關右臂石膏固定之敘述，下列何者正確？
(A)上完石膏的最初15 分鐘，右手會有發冷現象 (B)包紮時，右手應伸直並保持自然下垂
(C)包紮後，使用枕頭適當支托右手 (D)移動時，以手指支托石膏肢體

（D）21 下列何項檢查是診斷骨髓炎最準確的方法？
(A)骨掃描 (B)電腦斷層攝影（CT） (C)核磁共振顯像（MRI） (D)骨切片

（C）22 有關外傷性骨折之緊急處置，下列何者錯誤？
(A)移除骨折部位衣物，以利觀察 (B)評估遠端肢體的溫度、感覺及活動度
(C)試著推回已斷裂的骨頭，使其復位 (D)固定骨折部位之上下二個關節

（B）23 鼻部手術後之護理指導，下列何者正確？
(A)欲打噴嚏時，應用手將嘴巴蓋起來
(B)爲預防鼻出血，2 週內應避免性生活
(C)爲避免鼻子流出太多滲出液，應儘量維持平躺
(D)術後3 天若無出血，即可自行將鼻內之填塞紗條取出

（B）24 白內障手術後宜教導病人預防眼壓上升的方法，下列何者錯誤？
(A)避免用力擤鼻涕、咳嗽 (B)儘量睡向手術側
(C)洗頭時最好到美容院躺著洗 (D)避免穿衣領太緊的衣服

（C）25 下列何者不是視網膜剝離的臨床表徵？
(A)突然看到閃光 (B)浮動的黑點 (C)疼痛畏光 (D)視野喪失

（B）26 有關梅尼爾氏症候群（Meniere’s syndrome）病人的飲食衛教，下列何者較適當？
(A)高蛋白 (B)低鈉 (C)低脂 (D)高碳水化合物

（B）27 下列何種耳朵疾病可能與遺傳有關？
(A)中耳炎 (B)耳硬化症 (C)失聰 (D)梅尼爾氏症候群

（B）28 心臟病病人服用Digoxin 的治療作用爲何？
(A)使心跳速率更加快，以增加心輸出量 (B)使心臟的收縮更強而有力，以增加心輸出量
(C)減少靜脈回血量，以降低心臟負荷 (D)降低心臟收縮對抗的阻力，以降低心臟負荷

（A）29 有關急性心肌梗塞之醫療處置，下列何者錯誤？
(A)給予舌下含服硝酸甘油脂（NTG），以緩解疼痛
(B)臥床休息，以降低心肌的氧氣消耗量
(C)給予軟便劑，以避免用力導致心搏過緩
(D)給予氧氣，以防止組織的缺氧情形惡化

【版權所有 翻印必究！】

（B）30 爲促進肺部氣體交換，左心衰竭的病人最好採用下列何種姿位？
(A)平躺俯臥 (B)高坐臥 (C)右側臥 (D)垂頭仰臥

（A）31 頸靜脈壓的數值最主要是呈現下列何處的壓力？
(A)右心房 (B)右心室 (C)左心房 (D)左心室

（A）32 有關動脈阻塞性疾病之臨床表徵，下列何者錯誤？
(A)皮膚溫熱 (B)間歇性跛行 (C)趾甲變厚，無毛髮 (D)感覺麻木

（D）33 下列何處爲靜脈鬱滯性潰瘍（Venous stasis ulcer）最常發生的部位？
(A)足底 (B)足縫 (C)足跟 (D)足踝

（C）34 高血壓的病人需要避免下列何種運動？
(A)散步 (B)游泳 (C)舉重 (D)騎腳踏車

（A）35 有關右心衰竭之臨床表徵，下列何者錯誤？
(A)咳嗽有痰 (B)體重增加 (C)頸靜脈怒張 (D)下垂性水腫

（A）36 根據流行病學資料顯示，長期攝入高脂肪食品與下列那種癌症有關？
(A)乳癌 (B)肺癌 (C)肝癌 (D)食道癌

（A）37 肺癌病人血小板至少低於多少時，應注射血小板以免引發自發性出血？
(A) 20,000/mm^3 (B) 30,000/mm^3 (C) 40,000/mm^3 (D) 50,000/mm^3

（D）38 組織配對抗原（Histocompatability antigen）鑑定，主要與下列何種療法有關？
(A)手術療法 (B)化學療法 (C)免疫療法 (D)骨髓移植

（C）39 下列那項生活型態與大腸癌形成有關？
(A)飲食中缺乏維生素A (B)三餐不定時 (C)偏好高脂、低纖維飲食 (D)長期咀嚼檳榔

（D）40 眼睛不慎被化學抗癌藥物濺到的處理方式，下列何者正確？
(A)以紗布覆蓋速向眼科求治 (B)戴上眼罩避免化學藥劑外漏
(C)快速眨眼以刺激淚腺分泌 (D)以大量清水清洗

（A）41 下列何處爲化學療法Port-A 最常植入的位置？
(A)鎖骨下靜脈 (B)股靜脈 (C)貴要靜脈 (D)肺靜脈

（C）42 給予子宮頸癌病人止痛劑，最優先考量的給藥途徑爲：
(A)陰道栓劑 (B)靜脈注射 (C)口服 (D)肌肉注射

（B）43 下列何種皮膚疾病爲寄生蟲感染？
(A)丹毒 (B)疥瘡 (C)痤瘡 (D)牛皮癬

（C）44 林太太因自宅火災造成前胸、腹處及右手全部燒傷，入院診斷爲三度燒傷，依九法則（Rule of Nines）估計其燒傷面積占多少百分比？
(A) 9 (B) 18 (C) 27 (D) 36

（B）45 有關電擊傷之敘述，下列何者錯誤？
(A)皮膚外觀可看見電流入口及出口 (B)可造成皮膚外觀大面積燒燙傷
(C)爲重度燒傷 (D)可能造成骨骼、肌肉的損傷

（A）46 有關皮膚癌之敘述，下列何者正確？①基底細胞癌是最常見的種類 ②黑色素瘤最容易轉移 ③很少曬太陽者是高危險群 ④黑人較容易罹患皮膚癌
(A)①② (B)②③ (C)③④ (D)①④

（D）47 下列何部位對人類免疫缺乏病毒（HIV）之易感性較低？
(A)陰道黏膜 (B)肛門黏膜 (C)口腔黏膜 (D)皮膚

（A）48 全身性紅斑狼瘡（SLE）病人已出現腎衰竭徵象時，應限制下列何種營養素？
(A)鉀 (B)鐵 (C)纖維質 (D)維生素

（B）49 下列何者不屬於愛滋病高危險群？
(A)血友病患者 (B)酒精濫用者 (C)藥物成癮者 (D)雙性戀者

（A）50 類風濕性關節炎病人受侵犯之關節，通常在何時最易發生僵硬情形？
(A)清晨起床時 (B)晚上睡覺前 (C)外出散步後 (D)泡澡沐浴後
（D）51 下列何者爲注射含抗體之抗血清後所產生的免疫？
(A)主動性天然免疫 (B)主動性人工免疫 (C)被動性天然免疫 (D)被動性人工免疫
（B）52 吸入花粉引發氣喘發作，是屬於下列那一類型之過敏反應？
(A)細胞毒性 (B)立即性 (C)免疫複合性 (D)延遲過度敏感性
（D）53 有關進行性系統性硬化症（Progressive systemic sclerosis）之敘述，下列何者錯誤？
(A)絕大多數病人會出現皮膚病變 (B)體內許多器官間隙出現發炎與纖維化特徵
(C)會侵犯內臟而有生命威脅 (D)好發於30-40 歲，男性罹病率爲女性3 倍
（B）54 促進肺部疾病病人有效換氣的護理措施，下列何者正確？
(A)鼓勵胸式呼吸 (B)教導噘嘴式呼吸 (C)提供平躺側臥 (D)予以痰液稀釋
（B）55 下列何種臨床表徵不會出現在胸腔手術後造成的急性肺水腫？
(A)呼吸速率增加 (B)胸部X 光檢查呈現心室擴大 (C)泡沫痰 (D)持續咳嗽
（C）56 有關氣喘病人使用之藥物治療，下列何者具有抑制炎症反應的作用？
(A)支氣管擴張劑 (B)祛痰劑 (C)類固醇 (D)抗生素
（A）57 由股動脈抽血做動脈血液氣體分析檢查的護理措施，下列何者錯誤？
(A)抽血前，必須執行亞倫測試（Allen test） (B)抽血後，至少加壓10 分鐘
(C)抽血後，觀察有無血腫情形 (D)抽血後，儘速送檢
（C）58 下列何者不是肺癌的警訊？
(A)無法解釋的呼吸困難 (B)持續咳嗽 (C)血胸 (D)痰中帶血
（C）59 有關氣切造口氣囊充氣之敘述，下列何者錯誤？
(A)氣囊壓力維持20 cmH_2O (B)使用高容積低壓力型爲宜
(C)主要目的是擴張氣管 (D)壓力過小容易造成漏氣現象
（B）60 肺栓塞病人使用Heparin 治療的主要目的爲何？
(A)促進肺部血流通暢 (B)減少肺部血栓形成
(C)溶解已形成之血栓 (D)促進肺部血管擴張
（A）61 下列何者是發現肺部可疑病兆最簡便的方法？
(A)胸部X 光 (B)電腦斷層 (C)痰液檢查 (D)核磁共振顯像
（C）62 慢性腎衰竭病人的腎絲球過濾率降低造成肌酸酐增加時，會引起下列何種徵象？
(A)心律不整 (B)凝血時間延長 (C)厭食、噁心及嘔吐 (D)休克
（C）63 下列何者是膀胱癌病人的早期臨床表徵？
(A)頻尿 (B)解尿困難 (C)無痛性血尿 (D)噁心與嘔吐
（D）64 下列何者是早期腎細胞癌最有效的治療方式？
(A)化學治療 (B)免疫療法 (C)放射治療 (D)根除性腎切除術
（B）65 下列何者不是腎病症候群的典型症狀？
(A)水腫 (B)高血壓 (C)蛋白尿 (D)低白蛋白血症
（D）66 下列何者有助於前列腺癌的診斷？
(A) AFP (B) CA15-3 (C) CEA (D) PSA
（C）67 預防腎結石復發的護理措施，下列何者錯誤？
(A)每日攝水量至少3000-4000 c.c. (B)經結石分析採取適度飲食控制
(C)藥物控制方面，以抗利尿激素爲主 (D)控制潛在問題，如泌尿道感染
（B）68 血液透析病人因貧血問題，需接受紅血球生成素（EPO）治療，下列何者正確？
(A)血液透析前靜脈注射EPO (B)血液透析後靜脈注射EPO
(C)血液透析前口服EPO (D)血液透析後口服EPO

【版權所有 翻製必究！】

（C）69 停經前婦女每月乳房自我檢查的最佳時機爲何？
(A)月經來潮前一星期 (B)排卵期 (C)月經來潮後一星期內 (D)月經來潮後二星期

（C）70 有關低血糖的發生與治療，下列何者錯誤？
(A)當血糖≤ 60 mg/dL，病人即會出現症狀
(B)胰島素過量或運動過度皆可引起低血糖
(C)低血糖的症狀有皮膚出汗、心搏過緩、噁心及意識改變等
(D)低血糖症狀發生後，可立即給予50 c.c.的50%葡萄糖溶液（Dextrose）治療

（A）71 有關甲狀腺功能低下症之敘述，下列何者錯誤？
(A)可發生於任何年齡層的惡性疾病
(B)可由甲狀腺炎、腦下垂體或下視丘功能不良所引起
(C)可導致血中甲狀腺素及三碘甲狀腺素下降、促甲狀腺素上升
(D)會引起甲狀腺漸進性萎縮，直至功能完全喪失

（D）72 有關肢端肥大症之敘述，下列何者正確？
(A)是一種續發的腦下垂體功能低下症 (B)通常發生於青春期前
(C)病人的生長激素濃度低於正常值 (D)出現軟組織、骨骼及內臟器官增大的臨床表徵

（A）73 下列那些是慢性糖尿病病人會出現的長期併發症？①視網膜病變 ②腎衰竭 ③動脈粥狀硬化 ④酮酸中毒 ⑤糖尿病足 ⑥高血糖高滲透性非酮酸性昏迷
(A)①②③⑤ (B)①②⑤⑥ (C)①③④⑤ (D)①④⑤⑥

（C）74 下列何者不是胰島素治療後的合併症？
(A)低血糖 (B)胰島素抗藥性 (C)乳酸性酸中毒 (D)注射部位皮下組織增厚或萎縮

（C）75 有關愛迪生氏症（Addison’s disease）之敘述，下列何者正確？
(A)與腎上腺腫瘤併發有關 (B)早晨病人血中的可體松（Cortisone）值升高
(C)病人會出現低血壓、低血糖和高血鉀 (D)輕微的腎上腺皮質破壞即會出現明顯症狀

（D）76 有關甲狀腺術後之護理措施，下列何者正確？
(A)建議病人攝取高熱量、高蛋白質及低碳水化合物的食物
(B)評估病人有無肌肉抽搐的甲狀腺功能低下表徵
(C)協助病人採平躺臥姿，以避免牽拉傷口縫線
(D)鼓勵飲用冰涼液狀食物，以減輕傷口水腫不適

（A）77 蔡先生，遭紅火蟻攻擊，引起全身搔癢、蕁麻疹、臉部燥紅腫脹、呼吸困難、胸痛及心跳加快等症狀，進而導致休克現象。下列敘述何者正確？
(A)蔡先生可能出現過敏性休克 (B)蔡先生體內會釋放血管收縮物質，如抗組織胺
(C)讓蔡先生舌下含服NTG 緩解其胸痛 (D)須儘速給蔡先生施打抗生素及補充液體

（A）78 下列何種藥物有助於診斷、治療疑似有機磷中毒？
(A) Atropine (B) Morphine (C) Prostigmin (D) $MgSO_4$

（D）79 李太太懷孕30 週，因異物梗塞而喪失意識後給予緊急處理，下列敘述何者正確？
(A)用手指至舌根深部將異物取出 (B)進行腹部推壓法將異物擠出
(C)於兩肩胛骨間連續拍打五次 (D)雙手置於劍突下進行胸戳法

（A）80 有關急診室檢傷分類之敘述，下列何者正確？①可依病人嚴重程度建立就診先後順序 ②連續性癲癇狀態屬於應立即救治者 ③擔任檢傷分類的人員通常爲醫師 ④目前常使用三類法做檢傷分類
(A)①② (B)②③ (C)③④ (D)①④

【版權所有 重製必究！】