

《內外科護理學概要》

- (C) 1 當二側大腦半球有瀰漫性損傷，但腦幹功能完整，個案會出現下列何種呼吸型態？
 (A)叢積性呼吸 (B)中樞神經性過度換氣 (C)陳施氏呼吸 (D)共濟失調性呼吸
- (BD) 2 有關顱內壓上升病人的護理措施，下列何者正確？
 (A)教導病患練習伐爾沙瓦氏操作法 (Valsalva's maneuver)，如用力排便、咳嗽
 (B)將床頭搖高45°，促進靜脈回流
 (C)採集中式護理，提供充分休息時間
 (D)宜協助被動式關節運動，以免因運動增加腹內壓與胸內壓
- (C) 3 周小姐騎摩托車被後方車輛撞倒在地，經119 送到醫院時發現：叫名字時會張開眼，在手臂刺激時會將手臂縮回，對人、時、地的對話混淆不清，以Glasgow 昏迷量表評估結果為幾分？
 (A) 15 (B) 13 (C) 11 (D) 9
- (A) 4 前顱底骨折病患的鼻腔有透明澄清液體不斷流出時，下列護理措施何者正確？
 (A)以尿糖試紙檢驗此分泌物是否為腦脊髓液 (CSF) (B)給予鼻道抽吸，以維持氣道通暢
 (C)鼓勵病患將鼻腔分泌物擤出 (D)協助病患採絕對平躺姿勢
- (B) 5 護士為左側偏癱的中風病人餵食時，下列動作何項錯誤？
 (A)進食時，應協助病人坐起或搖高床頭 (B)將食物放於病人左側口腔內
 (C)餵食時，病人頭部不宜採後仰姿勢 (D)用手撫摸下巴肌肉，以刺激患者張嘴
- (A) 6 有關「經蝶骨腦下垂體切除術」後的護理措施，下列何者錯誤？
 (A)須預防高容積性休克的合併症 (B)注意是否有體溫升高、大量排尿及口渴現象
 (C)注意是否有流鼻水的情形 (D)禁止使用牙刷刷牙
- (C) 7 失智症患者若發生妄想、幻覺症狀，下列處理方法何者最適當？
 (A)告訴他沒這回事 (B)增加知覺刺激，讓他的妄想或幻覺消失
 (C)勿與之爭辯，順勢而為 (D)給予鎮靜劑或精神藥物 (psychotropic agents)
- (D) 8 有關癲癇病人的出院衛教，下列何者正確？
 (A)服用Dilantin 常會導致牙齦組織過度增生，應避免使用牙線清潔牙縫
 (B)若已不再發作，可暫停服藥，以避免副作用產生
 (C)感冒時需暫停使用癲癇藥，以免引起發作
 (D)服藥期間，應避免游泳、登山或開車

情況：孫女士接受畢羅氏第II 型 (Billroth's II) 次全胃切除術，開始進食後半小時內，感到頭暈、心悸、冒汗、面色蒼白、上腹脹不適，請回答第9~10 題。

- (C) 9 造成上述症狀的機轉為何？
 (A)大量高張性食糜進入十二指腸，使細胞外液迅速移入腸道，導致循環血量降低
 (B)大量高張性食糜進入十二指腸，使體液電解質急速改變，導致不平衡
 (C)大量高張性食糜進入空腸，使細胞外液迅速移入腸道，導致循環血量降低
 (D)大量高張性食糜進入空腸，使體液電解質急速改變，導致不平衡
- (B) 10 下列何項孫女士的陳述是正確的？
 (A)「吃飯時，我最好多喝些湯。」
 (B)「我應該多吃些蛋白質豐富的食物。」
 (C)「吃飯時我最好坐直，才能吃得較多。」
 (D)「吃完飯後最好適度走動，以免消化不良。」

- (D) 11 有關右側與左側結腸腫瘤臨床表徵的比較，下列敘述何者正確？①前者較常出現排便型態改變 ②前者較常出現體重減輕 ③後者較常出現貧血 ④後者較常出現糞便變細
(A)①② (B)③④ (C)①③ (D)②④
- (D) 12 指導病人學習結腸造瘻灌洗，下列病人陳述何項正確？
(A)「灌洗桶懸掛的高度最好超過病人造瘻口上約20 cm。」
(B)「灌洗時有頭暈軟弱的感覺是正常的。」
(C)「當腹瀉或身體虛弱時，為以免前功盡棄，仍應繼續灌洗。」
(D)「最好的灌洗時間是病人以往每日的排便時間。」

情況：王先生56歲，初次診斷罹患肝癌，即將接受經皮肝臟活體組織切片檢查（Percutaneous Liver Biopsy），請回答第13~14題。

- (C) 13 主護護士應於檢查前確定相關的檢驗，下列那兩項結果最重要？
(A)白血球計數，血小板計數 (B)白血球計數，出血時間
(C)血小板計數，凝血酶原時間 (D)AST (SGOT)，ALT (SGPT)
- (B) 14 有關王先生的護理指導，下列何者最正確？①整個檢查過程自開始至結束均保持正常呼吸 ②檢查後教導病患右側臥，並在肋骨緣處以砂袋加壓2小時 ③檢查後病患主訴右肩疼痛，應懷疑橫膈下積血 ④檢查後病患主訴右上腹疼痛，應懷疑膽囊炎
(A)①④ (B)②③ (C)①③ (D)②④
- (D) 15 有關骨性關節炎及類風濕性關節炎之比較，下列何者錯誤？
(A)前者為非全身性、非炎症性關節變化，後者為全身性、炎症性的關節變化
(B)前者好發於膝關節、脊柱，後者好發於周邊關節
(C)前者關節滑液呈清黃色、黏性高，後者呈綠色混濁、黏性低
(D)前者紅血球沉降率 (ESR) 正常，後者ESR 下降

情況：安先生因肝性腦病變初次住院，醫囑 Neomycin 留置灌腸，請回答第16~17題。

- (B) 16 家屬詢問灌腸目的時，下列回答何者正確？
(A)「預防便秘，減少氨的製造。」
(B)「可減少腸道內蛋白質被分解，降低氨的製造。」
(C)「使腸道內滲透壓上升，加速氨的排除。」
(D)「降低腸道pH值，使氨維持離子化。」
- (C) 17 安先生精神較激昂 (agitation)，家屬要求護士給予鎮靜劑幫助病人入睡，下列回應何者最適當？
(A)「安先生是因為病情的關係，一定會有這種情形，只要觀察就好。」
(B)「可以幫助入睡的方法還有很多，我們先試一試其他方法，最後再考慮用藥。」
(C)「鎮靜劑會誘發昏迷，且藥物經肝臟代謝，肝功能不良的病人不宜使用。」
(D)「鎮靜劑使用過多會成癮，最好還是不要輕易使用。」
- (A) 18 全膝關節置換術後之護理措施，下列何者正確？
(A)臥床時保持患肢平直伸展 (B)手術後，待傷口消腫才可開始做股四頭肌等長收縮
(C)患肢僅能採取被動性關節活動 (D)預防發生脫位的合併症
- (B) 19 有關全髖關節置換術後之護理措施，下列何者錯誤？
(A)患肢可執行等長收縮運動 (B)患肢不可執行等張收縮運動
(C)可使用輔具下床活動 (D)患肢採外展之擺位
- (C) 20 有關視網膜剝離病患的術後護理指導，下列何者錯誤？
(A)手術後應採俯臥4-5天，以助視網膜平貼復位 (B)術後三個月始可更換眼鏡
(C)手術後2-3週即可做日常活動 (D)避免噁心、嘔吐、便秘等情形發生

- (B) 21 下列何者可預防骨折所引起之脂肪栓塞症候群？
(A)使用預防性抗凝劑 (B)適當的制動骨折部位 (C)抬高肢體 (D)熱敷
- (A) 22 有關角膜移植術後的護理指導，下列何者正確？
(A)減少眼瞼活動以促進角膜上皮癒合 (B)儘可能躺向手術側，以促進血液循環
(C)多做眼球運動，以增加血液循環 (D)定時移除眼罩以接受光線刺激
- (B) 23 截肢後之居家護理指導，下列何者正確？①殘肢需套上棉襪，不可直接與義肢接觸 ②穿義肢前，殘肢皮膚需塗抹油脂或乳液 ③傷口癒合後，可採用枕頭按壓殘肢以增強皮膚韌性 ④穿義肢前，先用酒精拍打殘肢以保持乾燥
(A)①② (B)①③ (C)②④ (D)③④
- (C) 24 有關美尼爾氏症候群 (Meniere's syndrome) 之敘述，下列何者錯誤？
(A)發作時必須躺下來、閉上眼睛 (B)應避免增加壓力 (stress) 的活動
(C)依醫囑使用血管收縮劑 (D)應限鹽飲食、服用利尿劑
- (B) 25 右下肢長腿石膏拆除後，病患下床活動時，右下肢有腫脹的情形，下列處置何者正確？
(A)建議病患臥床休息 (B)行走時於右下肢綁上彈性繃帶或穿彈性襪
(C)積極執行右下肢關節及肌肉運動 (D)需再重新打上石膏
- (D) 26 全喉切除術後之護理措施，下列何者正確？
(A)鼓勵病人多做頸部伸張運動
(B)病人清醒後，可開始試著吞開水
(C)恢復正常呼吸後，氣切套管可立即拔除
(D)病人會失去嗅覺，可增加食物的色、味來增進食慾
- (B) 27 當白內障摘除晶體手術後病人發生視網膜剝離時，不會出現下列何項症狀？
(A)突然看到閃光 (B)看街燈產生虹輪視覺 (C)看到浮動之黑點 (D)部分視野喪失
- (D) 28 使用呼吸器的個案應在何時測量中心靜脈壓 (CVP) 的數值最準確？
(A)吸氣初期 (B)吸氣末期 (C)呼氣初期 (D)呼氣末期
- (C) 29 運動有助於降低罹患冠狀動脈疾病的危險因子，以下何項不包括在內？
(A)減輕體重 (B)降低血壓 (C)提高低密度脂蛋白濃度 (D)促進心臟氧氣使用效率
- (D) 30 有關經皮穿腔冠狀動脈成形術 (PTCA) 術後之護理處置，下列何者適當？
(A)評估穿刺部位近心端的脈搏強度並與對側比較
(B)告知動脈導管拔除後，須立即下床活動以防栓塞
(C)待腸胃恢復蠕動後，才能由口進食
(D)教導若有胸痛症狀應立即舌下含服NTG 並告知醫護人員
- (C) 31 有關心絞痛個案舌下含服硝酸甘油 (NTG) 的護理指導，下列何者錯誤？
(A)從事已知會導致心絞痛的活動前，先服用一顆
(B)服用時舌頭或口腔內出現刺痛感，表示藥效正常
(C)服用後應站立或來回走動，增進藥效
(D)連續服用三顆後症狀仍無改善，需要立即就醫
- (B) 32 心肌梗塞急性發作6小時內，由靜脈滴注含胰島素及鉀離子的葡萄糖溶液，其主要的目的為何？
(A)鉀離子可以矯正體內鹼中毒的狀態，重製必究！
(B)胰島素可增加心肌血流灌注及收縮力
(C)葡萄糖液可以增加血液容積
(D)胰島素可協助降低血糖
- (D) 33 右側股靜脈血栓性靜脈炎的個案突然抱怨胸痛與呼吸困難，最可能出現下列何種合併症？
(A)心肌炎 (B)心肌梗塞 (C)肋膜炎 (D)肺栓塞

- (B) 34 病人因右下肢水腫、發熱與疼痛入院，診斷為深層血栓靜脈炎，下列護理措施何者錯誤？
 (A) 監測有無肺部栓塞 (B) 鼓勵早期下床活動
 (C) 協助雙側下肢抬高 (D) 教導雙腿避免交叉
- (A) 35 有關急性心衰竭個案的護理措施，下列何者錯誤？
 (A) 避免給予高濃度氧氣吸入 (B) 鼓勵多深呼吸、咳嗽
 (C) 協助採高位半坐臥姿 (D) 給予低鈉高鉀飲食
- (D) 36 有關心臟瓣膜疾病的病理變化，下列何者正確？
 (A) 二尖瓣脫垂會在心臟收縮時，使血液從右心室逆流到右心房，導致右心房擴大
 (B) 主動脈閉鎖不全會在心臟收縮時，使血液從主動脈逆流到左心室，導致左心室擴大
 (C) 二尖瓣狹窄會在心臟舒張時，使血液回流到肺動脈，導致肺高壓
 (D) 主動脈狹窄會在心臟收縮時，使左心室壓力升高，導致左心室肥厚
- (B) 37 頭頸部放射線治療的皮膚護理，下列何者正確？
 (A) 保持照射部位濕潤，避免乾燥 (B) 用清水清洗照射部位
 (C) 熱敷照射部位以減輕疼痛 (D) 每次需清洗照射部位之記號，以防發炎
- (D) 38 有關腫瘤分期的TNM 系統，不包括下列那項？
 (A) 原發病灶大小 (B) 轉移程度 (C) 波及淋巴結範圍 (D) 臨床症狀嚴重度
- (B) 39 有關放射線治療腫瘤的敘述，下列何者正確？
 (A) 分裂生長快速或含氧低的細胞對放射線敏感
 (B) 臨床上將治療總劑量分成數次及不同時間給予之目的，是可改善腫瘤周圍組織缺氧狀態
 (C) 早期的何杰金氏病 (Stage I Hodgkin's Disease) 需合併化學治療
 (D) ^{60}Co 為體內放射治療，病人體內會殘留放射線而影響他人
- (C) 40 有關骨髓移植的敘述，下列何者正確？
 (A) 輸入骨髓須用18 號之靜脈留置針
 (B) 骨髓輸入時須使用含有濾網之導管
 (C) 自體移植個案於骨髓輸入時，易出現噁心感
 (D) 捐贈者與受髓者之ABO 血型一定要相配
- (B) 41 植入式的Port-A 導管裝置部位呈現局部疼痛、麻刺感、皮膚發紅，最可能原因為：
 (A) 植入部位受壓 (B) 藥物滲漏 (C) 過敏反應 (D) 靜脈發炎
- (A) 42 有關化學治療的敘述，下列何者正確？
 (A) 會影響體內正在分裂或準備分裂的細胞 (B) 主要改變RNA 結構
 (C) 每次給藥能殺死所有存在癌細胞 (D) 根除在特定區域之癌細胞
- 情況：李小姐，體重60Kg，於KTV 火場中被救出送至醫院，其臉部、胸腹部、右手、右腿二~三度全身36% 燒傷，回答第43~45 題。
- (C) 43 將李小姐送至急診室後，護理人員應即刻做下列何種處理？
 (A) 小心地移除其身上的衣物 (B) 以生理食鹽水濕敷燒傷部位
 (C) 評估是否出現吸入性灼傷 (D) 計算燒傷體表面積
- (C) 44 依照伊文斯公式 (Evans formula)，第一個24 小時需給予李小姐補充下列何種液體？
 (A) 乳酸林格氏液4320c.c.
 (B) 乳酸林格氏液8640c.c.
 (C) 膠質溶液 2160c.c. + 生理食鹽水2160c.c. + 5%葡萄糖溶液2000c.c.
 (D) 膠質溶液 1080c.c. + 生理食鹽水3240c.c. + 5%葡萄糖溶液2000c.c.
- (B) 45 護理人員以精密輸液套提供輸液，在治療李小姐的第一個8 小時每分鐘輸液滴數為何？
 (A) 270 (B) 395 (C) 540 (D) 790

- (A) 46 感染人類免疫缺乏病毒者，其體內含病毒濃度較高的體液為何？
(A)精液 (B)眼淚 (C)唾液 (D)尿液
- (B) 47 處理愛滋病患者之血清檢體時，下列何項措施錯誤？
(A)裝檢體前，先檢查容器有無裂痕 (B)若容器沾有血跡，應用清水擦拭乾淨
(C)在檢體容器外，貼上「血清危險」的標誌 (D)裝好血液檢體後，將容器裝入袋子內
- (A) 48 有關愛滋病雞尾酒療法之敘述，下列何者正確？
(A)併用反轉錄酶抑制劑及蛋白質分解酶抑制劑
(B)治療愛滋病藥物需與雞尾酒一起服用
(C)比單一藥物療法的副作用輕
(D)病人的伺機感染率增加，應加強保護
- (C) 49 為增強類風濕性關節炎患者之關節活動度與肌肉力量，下列護理措施何者正確？
(A)急性發炎期由醫護人員協助患者執行被動全關節運動
(B)急性期過後，教導患者冷水療浴後，執行主動運動
(C)教導患者訂定活動計畫，協助執行肌肉等長和阻力性運動
(D)鼓勵患者儘量執行運動，以避免殘障
- (A) 50 會引起燒傷病人嚴重體液電解質不平衡的主因為何？
(A)微血管通透性增加 (B)血鉀增加而鈉流失
(C)大量肌球蛋白釋放 (D)碳酸根離子排出
- (C) 51 有關全身性紅斑狼瘡 (SLE) 患者之居家自我照顧指導，下列何項正確？
(A)月經週期紊亂時，可服用避孕藥避孕 (B)身體無不適症狀時，可停止服用類固醇
(C)眼睛乾澀時，可使用人工淚液潤滑眼睛 (D)出現發燒、關節痛時，可服用Aspirin 改善
- (A) 52 病患接受腎臟移植後24 小時，開始出現全身不適及發燒的超急性排斥反應。下列處理方式，何者正確？
(A)移除移植的腎臟 (B)為病患注射Solu-Medrol
(C)為病患緊急輸血 (D)為病患注射抗胸腺球蛋白
- (B) 53 慢性阻塞性肺部疾病患者因病情惡化接受肺功能檢查，會呈現下列何項數據？
(A)肺活量 (VC) 增加 (B)肺餘容積 (RV) 增加
(C)第一秒用力呼氣容積 (FEV1) 增加 (D)肺總量 (TLC) 降低
- (C) 54 對於氣管內插管病患的護理措施，下列何者正確？
(A)不宜固定E-T tube，以免牽扯 (B)減少口腔護理，以免管路滑脫
(C)鼓勵深呼吸，以免肺擴張不全 (D)不宜給予濕化氧氣，以免造成感染
- (B) 55 有關密閉式胸腔水下引流的敘述，下列何者錯誤？
(A)更換胸瓶時，可暫時夾住胸管
(B)呼氣時水封瓶內出現氣泡，表示有漏氣現象
(C)深呼吸或咳嗽時，水封瓶長玻璃管內之液面會浮動
(D)鼓勵個案經常變換姿勢，並可採坐姿
- (D) 56 有關氣切造口手術後之護理措施，下列何者正確？
(A)每天更換氣切套管以避免感染 (B)氣囊不宜充氣以避免刺激氣管
(C)不可進行氣切造口護理以避免出血 (D)若吞嚥反射正常，可由口進食
- (A) 57 下列何者是肺部感染造成肋膜積水的主要原因？
(A)血管通透性增加 (B)液體靜力壓增加 (C)血漿滲透壓下降 (D)淋巴吸收受阻
- (C) 58 有關氣喘病患的護理指導，下列何者錯誤？
(A)監測空氣品質 (B)定期測量肺功能
(C)避免各項戶外活動 (D)辨識氣喘發作早期症狀

- (D) 59 下列何種檢查方法可早期診斷慢性腎絲球腎炎？
 (A)KUB X-ray 攝影 (B)超音波檢查 (C)電腦斷層攝影 (D)腎臟穿刺
- (C) 60 有關尿瀦留的護理措施，下列何者錯誤？
 (A)協助病患採取坐姿或站姿解尿 (B)將廁所水龍頭打開，讓病患聽流水聲
 (C)用冷水沖洗會陰部位 (D)戴手套給予肛門刺激
- (D) 61 針對慢性腎臟衰竭患者常出現的貧血現象，下列何項是最常見的醫療處置？
 (A)給予鐵劑補充 (B)給予輸血矯正貧血
 (C)給予高生理價值的蛋白質 (D)給予紅血球生成素
- (C) 62 下列何項陳述表示肺結核病患對其疾病有正確認識？
 (A)按時服藥無法治癒肺結核 (B)咳出的痰液沒有傳染性
 (C)遵從服藥2~4 週後，就不需要與其他人隔離 (D)施打卡介苗絕對可以預防肺結核
- (A) 63 有關腎病症候群的護理措施，下列何者正確？
 (A)每日測量體重、腹圍，以監測體液平衡 (B)嚴格限制水分攝取，以防尿量過多
 (C)採取低蛋白質飲食，以防蛋白尿 (D)絕對臥床休息，以改善嚴重疲憊感
- (C) 64 下列何者與預防因抽吸所導致的心律不整無關？
 (A)抽吸前給予 100%氧氣 (B)抽吸時間控制為10 秒
 (C)抽吸過程嚴守無菌技術 (D)成人抽吸壓力維持120mmHg
- (D) 65 有關經尿道攝護腺切除 (TURP) 術後的急性期護理措施，下列何者錯誤？
 (A)經由三叉導尿管給予膀胱沖洗 (B)觀察有無水中毒症狀
 (C)預防泌尿道感染發生 (D)教導執行會陰運動

情況：王老太太因末期腎病須接受血液透析，醫師建議施予動靜脈瘻管術，請回答第66~68 題。

- (C) 66 有關動靜脈瘻管術後之護理原則，下列何者錯誤？
 (A)將瘻管肢體抬高 (B)術後鼓勵患者做握球運動
 (C)手術後瘻管肢體避免提重物但可以戴手錶 (D)勿在瘻管肢體測量血壓及抽血
- (B) 67 下列何種血管不是執行動靜脈瘻管的優先考量？
 (A)上肢血管 (B)慣用手的血管 (C)手部較遠端的血管 (D)腕部橈動脈及頭靜脈
- (D) 68 王老太太在第一次血液透析後出現頭痛、噁心、嘔吐、抽搐等不適時，其與下列何種情況有關？
 (A)代謝性鹼中毒 (B)出血 (C)感染 (D)透析不平衡症候群
- (B) 69 有關糖尿病的血糖檢查，下列何者錯誤？
 (A)空腹血糖的正常值在80-120 mg/dL
 (B)檢查前須禁食12 小時，中間絕對禁止喝水
 (C)飯後兩小時，血糖值超過235 mg/dL，表示控制不佳
 (D)糖化血色素 (HbA_{1c}) 10%，表示控制良好
- (C) 70 有關糖尿病的足部護理指導，下列何者正確？
 (A)每日以熱水泡腳 (B)以中性肥皂清洗後，以乳液徹底塗抹足部及足趾間皮膚
 (C)剪趾甲時應順著趾甲曲度修剪 (D)選擇透氣佳的尖頭鞋
- (D) 71 下列何者是甲狀腺功能亢進與甲狀腺功能低下患者皆會出現的症狀？
 (A)貧血 (B)便秘 (C)尿量增加 (D)性慾減低
- (C) 72 有關甲狀腺手術的敘述，下列何者錯誤？
 (A)手術後體溫升高，可能是甲狀腺風暴的徵象
 (B)行次全甲狀腺切除術的病人，可維持正常的甲狀腺功能
 (C)手術後應禁止病人行深呼吸、咳嗽運動，以防牽拉傷口
 (D)病人手術前持續服用抗甲狀腺藥物，可預防術後的甲狀腺風暴

- (B) 73 有關格雷氏症 (Grave's Disease) 患者的突眼照護，下列何者錯誤？
(A) 限制鹽分的攝取，以減輕眼部水腫
(B) 教導病人做頭部轉動運動，以避免複視
(C) 睡覺時搖高床頭，以減輕眼眶四周的水腫
(D) 出門時可配戴太陽眼鏡，以減少畏光的不適
- (A) 74 有關庫欣氏症候群患者的護理指導，下列何者錯誤？
(A) 每日測量體重及腹圍 (B) 監測血壓
(C) 多攝取高鈣及富含維生素D 的食物 (D) 避免接觸壓力情境
- (B) 75 有關副甲狀腺功能低下症的生理病理機轉，下列何者正確？
(A) 副甲狀腺素下降，造成尿磷增加
(B) 血鈣下降，會造成神經及肌肉應激性增加
(C) 副甲狀腺素下降，造成破骨細胞活動增加
(D) 副甲狀腺素下降，使血清磷酸鹽濃度下降
- (A) 76 有關中毒的敘述，下列何者正確？
(A) 一氧化碳中毒會出現組織缺氧
(B) 強酸對食道造成的傷害比強鹼嚴重
(C) 臘腸中毒會嚴重影響周邊神經系統的功能
(D) 眼鏡蛇咬傷是一種出血性毒素中毒
- (C) 77 有關抗利尿荷爾蒙分泌不當症候群 (SIADH) 病人的護理措施，下列何者適當？
(A) 每日測量病人體重與腹圍
(B) 若病人出現便秘，可建議給予小量甘油灌腸
(C) 密切監測病人血壓、中心靜脈壓及血漿滲透壓的變化
(D) 密切監測每日攝水量、排尿量、血鈉與血鈣值
- (D) 78 李小姐與朋友到餐廳吃飯，飯後被發現倒在廁所，面無血色，呼叫無反應，亦無呼吸，下列施救順序，何者正確？①捏鼻、吹兩口氣行人工呼吸 ②心外按摩 ③測頸動脈 ④平躺、頭部向後仰、下巴上提
(A) ①→④→③→② (B) ①→④→②→③ (C) ④→①→②→③ (D) ④→①→③→②
- (B) 79 有關有機磷中毒的敘述，下列何者錯誤？
(A) 典型症狀是縮瞳、氣管分泌物增多
(B) 有機磷濃度過高可採用透析治療
(C) 有機磷中毒常出現類似大蒜的味道
(D) 中毒治療可使用拮抗劑如：Atropine
- (A) 80 有關休克的治療，下列敘述何者正確？
(A) 過敏性休克須給予腎上腺素治療
(B) 神經性休克通常給予抗生素治療
(C) 低血容性休克須給予 β 藥物治療
(D) 心因性休克須給予周邊血管收縮劑

【版權所有，重製必究！】