

# 《產兒科護理學》

- (A) 1 現行的產科護理住院天數縮減，使正常生產的母親和小孩能夠早期出院，這種變革對護理人員的意義，下列何者正確？  
(A)促使產婦能自我照顧，早日回復正常的家庭功能  
(B)產前需協助指導配偶使其產後能取代醫護人員照顧產婦與小孩  
(C)對缺乏知識與經驗的產婦，促其出院後參與產後門診衛教  
(D)生產是產婦個人的事，醫療團隊應早期介入，但產後宜儘早撤離
- (B) 2 下列何者為民國96 年行政院衛生署「母嬰親善醫院」認證的要項？  
(A)醫院生產率多寡 (B)產後純母乳哺育率多寡  
(C)新生兒存活率多寡 (D)醫院周產期醫療網制度
- (A) 3 一對基因中有一個基因出現問題就會表現出症狀，此在遺傳疾病中是屬於何者？  
(A)顯性遺傳 (B)隱性遺傳 (C)性聯遺傳 (D)併聯遺傳
- (A) 4 下列何者是由胚胎的中胚層所演變而來的？  
(A)紅血球 (B)汗腺 (C)內耳 (D)指甲
- (B) 5 何者是用來篩檢胎兒的開放性神經管缺損？  
(A)母體血清卵磷脂 (lecithin)  
(B)母體血清  $\alpha$  胎兒蛋白  
(C)羊水中L/S (卵磷脂／抱合髓磷脂) 比  
(D)人類胎盤催乳素 (human placental lactogen; hPL)
- (C) 6 尹太太目前懷孕9 週，下列何種檢查可監測出胎兒心跳？  
(A)杜卜勒 (Doppler) (B)胎心筒 (C)超音波 (D)胎兒監測器
- (D) 7 劉太太懷孕8 個月，她告訴護士：「最近幾週來排便很不順，以前每天都很規律排便，現在2、3 天才解一次，而且有幾次解便時，肛門還流血」，請問以下建議何者較適當？  
(A)補充維生素D (B)每天固定用軟便劑直到生產為止  
(C)多做凱格爾氏運動 (D)多攝取蔬菜及水分，每天規律的運動
- (B) 8 人類胎盤催乳素 (hPL) 對懷孕的影響是下列何者？  
(A)增加肝醣的消耗 (B)降低蛋白質分解  
(C)降低循環的脂肪酸 (D)促胰島素的作用
- (C) 9 劉太太，G2 P1，目前懷孕29 週，因早期破水並伴有宮縮情形，醫囑入院治療。劉太太住院期間不斷地詢問有關自己與胎兒情形，如「我白血球為7600，有沒有感染？」、「小孩1 天要動幾次才算正常？」劉太太上述行為的目的是什麼？  
(A)對於醫療照顧有疑慮 (B)了解安胎期間新的生活方式  
(C)確保母子生命安全的徵象 (D)滿足母子身體的基本需求
- (D) 10 懷孕初期，補充葉酸最好的食物來源為：  
(A)牛奶 (B)馬鈴薯 (C)豬肉 (D)新鮮葉菜類
- (B) 11 陳太太自然分娩第1 天，問護理人員為什麼嬰兒頭形不對稱，且在頭頂處可以摸到一長條突起硬塊，需不需要作進一步的腦部檢查，此時護理人員正確的回答應為：  
(A)妳為什麼會有這種想法  
(B)這是胎兒從產道分娩出來時，需順應產道所造成的頭變形，是正常現象  
(C)這是生產時胎頭受到擠壓所造成的胎頭血腫，我們會小心觀察其變化  
(D)這是生產時胎頭受到擠壓所造成的產瘤，兩三天後會消失，是正常的現象

- (D) 12 真陣痛的特徵為下列何項？  
(A)沒有子宮頸變薄發生 (B)爬樓梯時，肚子緊縮感就消失  
(C)使用止痛藥時，收縮就消失 (D)上腹部變硬，宮縮規則且間隔愈來愈短
- (C) 13 李太太，27 歲，G1 P0，當胎兒娩出時，發現性別與先前產檢時超音波檢查的結果不一致，李太太獲知她生的是女孩時，即在產枱上咆哮著說：「不要！不要！我要的是男孩，我的孩子是男的！」此時護理人員應：  
(A)請醫師給李太太注射鎮靜劑 (B)安慰她，男孩女孩一樣好  
(C)讓她說出她的期待及不滿 (D)立即哺餵母乳，以促進親子關係
- (A) 14 胎心率早期減速所顯示胎心率與宮縮圖形表現，下列敘述何者正確？  
(A)波形統一，胎心率如宮縮的倒影 (B)波形統一，胎心率形狀反映宮縮  
(C)波形不定，胎心率如宮縮的倒影 (D)波形不定，胎心率形狀反映宮縮
- (D) 15 李太太G1 P0 已入院待產數小時。她向護理人員表示：「小姐，我好想用力哦！」，此時護理人員最佳的反應是下列何者？  
(A)這是待產正常的感覺，妳可以左側躺比較舒服  
(B)這表示即將要生產了，我立刻送你進產房  
(C)來！現在深吸一口氣，朝著陰道方向用力  
(D)我先幫妳做陰道內診，以了解目前狀況是否適合用力
- (D) 16 產婦於胎盤娩出後，護理人員依醫囑施打麥角鹼類藥物（Methergine）。但下列何種情況需暫停給藥？  
(A)耳溫38°C (B)脈搏80 次／分 (C)呼吸22 次／分 (D)血壓180/108mmHg
- (A) 17 若職業婦女需要持續哺餵母乳，最好可採取下列何項措施？  
(A)上班前幾天開始練習擠出母乳，將乳汁置於奶瓶中，由家人協助餵食嬰兒  
(B)每次哺餵母乳後，不再排空乳房，避免上班後乳房脹痛  
(C)減少哺餵母乳的次數與時間  
(D)上班時穿較緊的胸罩，以防止乳房充盈，下班後再哺餵母乳
- (D) 18 當產婦進行硬膜外麻醉（無痛分娩）時，下列何者是護理人員需優先注意的？  
(A)監測子宮是否僵硬強直 (B)給予催產素增強宮縮  
(C)給予平躺預防頭痛 (D)監測血壓是否降低
- (C) 19 張太太因子宮內胎兒死亡，於產後回病房休息，下列護理措施何者不適當？  
(A)安排單人床，避免因其他產婦使張太太觸景傷情  
(B)注意張太太產後子宮收縮及惡露情況  
(C)沒有嬰兒刺激乳房，故乳房相關衛教可以省略  
(D)鼓勵張太太將心情說出來，陪伴度過哀傷期
- (D) 20 關於產後腸胃系統的變化，下列何者錯誤？  
(A)因流汗、尿及惡露，每日需補充2500~3000c.c.的水分  
(B)皮膚汗腺功能增加，所以要保持皮膚清潔乾燥，避免感冒  
(C)由於鬆弛素的關係，使腸道張力降低及蠕動減少  
(D)要預防便秘，於產後第1 天開始服用輕瀉劑，並鼓勵補充纖維質食物
- (D) 21 李太太自然生產，產後1 小時，仍有鮮血自陰道流出，觸診評估子宮堅硬，且位在腹部中線低於肚臍的位置，此種情況最可能的出血原因為：  
(A)子宮收縮不佳 (B)子宮破裂 (C)胎盤碎片殘留 (D)撕裂傷
- (C) 22 黃太太第一胎，在產房剛自然產出一男嬰，此時最合宜的護理措施為：  
(A)將新生兒的性別、四肢介紹給黃太太後，將新生兒送至嬰兒室保溫箱內  
(B)告訴黃太太：產後24 小時，待新生兒狀況穩定後，再至嬰兒室餵奶

- (C)將新生兒貼在黃太太的胸部，給予即刻的皮膚接觸，並試著開始餵奶  
(D)告訴黃太太：因為產後2~3 天才會有乳汁分泌，所以先以葡萄糖水哺餵新生兒
- (D) 23 下列那一項產後運動為產後立刻可做，且可以預防子宮脫垂及尿失禁？  
(A)抬臀運動 (B)腹部緊縮運動 (C)腿部運動 (D)陰道收縮運動
- 情況：王太太G4 P3 AA1，3 天前剖腹產出一體重3350 公克男嬰。請依此回答以下第24、25 題。
- (C) 24 王太太在都是單胞生產，且沒有孩子出生後夭折的情況下，現在應有幾個小孩？  
(A)一個 (B)二個 (C)三個 (D)四個
- (A) 25 王太太於產後相當疲累，常需依賴婆婆滿足她吃的需求並照顧嬰兒，也喜歡分享關於分娩生產過程的各項細節，依照Rubin(1977) 的產後心理發展，王太太處於那一個階段？  
(A)接受期 (B)緊執期 (C)放手期 (D)獨立期
- (D) 26 張太太G1 P0，目前懷孕32 週，因發生早期破水現象而入院治療。請問護理人員之首要處理方式為下列何者？  
(A)教導肌肉放鬆技巧 (B)評估子宮頸擴張程度  
(C)介紹其他破水住院之產婦 (D)注意羊水流出血量、顏色、味道
- (B) 27 產婦住院期間，詢問護理人員有關自己的男嬰乳房為什麼脹大，如果你是主護護理人員，下列何種回答最恰當？  
(A)這是分娩創傷所造成只需觀察 (B)這是受到母體賀爾蒙所影響  
(C)這是乳房組織在子宮內肥大之故 (D)這是惡性的，宜諮詢醫師的建議
- (B) 28 有關小於妊娠週數（SGA）的敘述，下列何者正確？  
(A)出生體重低於1500 公克 (B)出生體重低於生長曲線第10 個百分點  
(C)出生身高低於生長曲線第10 個百分點 (D)出生週數小於37 週
- (C) 29 下列何種改變是造成動脈導管關閉的主要原因？  
(A)血氧分壓下降 (B)血中二氧化碳分壓下降  
(C)血氧分壓上升 (D)血中二氧化碳分壓上升
- (D) 30 有關引產照護，下列何者正確？  
(A)催產素藥物劑量給藥應從最高劑量開始  
(B)只要待產婦與先生同意，懷孕超過36 週即可進行引產  
(C)引產過程應禁食  
(D)發生胎兒窘迫徵象時，應立即停止催產素灌注
- (B) 31 王太太，45 歲，一直使用保險套避孕，25 歲初次性行為，王先生為其僅有之性伴侶。王太太從未接受過子宮頸抹片檢查，對其最恰當的建議是：  
(A)王太太屬極低危險群，暫時不需抹片檢查  
(B)王太太屬低危險群，應每年接受一次抹片檢查  
(C)王太太屬高危險群，應每半年接受抹片檢查  
(D)王太太屬極高危險群，應每半年接受抹片及人類乳突狀病毒核酸檢查
- (D) 32 待產過程發生胎兒困窘時，其適當處置不包括下列何者？  
(A)予待產婦左側臥 (B)提供待產婦氧氣 (C)準備生產 (D)予待產婦使用催產素oxytocin
- (B) 33 丁太太第一次到醫院產檢，當護理人員在評估丁太太日常的飲食情況時，下列何項問法較適當？  
(A)妳通常在飲食中攝取包含那些基本營養要素 (B)通常妳都吃些什麼  
(C)妳每天喝多少杯的牛奶 (D)那些食物讓妳覺得最不舒服
- (B) 34 關於胎盤早期剝離（abruptio placenta）之護理，下列何者不正確？  
(A)注意生命徵象變化 (B)待產時必須做好生產準備，馬上給予灌腸  
(C)給予靜脈輸液 (D)觀察出血性質

- (B) 35 護理一位懷孕30 週、陰道出血、前置胎盤安胎的婦女時，完善的護理應不包括下列何者？  
(A)給予絕對臥床 (B)給予陰道檢查子宮頸變化  
(C)監測胎心音與宮縮變化 (D)提供情緒與心理支持
- (A) 36 林太太，妊娠36 週，血壓160/110mmHg，下列那些狀況可能發展成嚴重型子癇前症之危險徵候及症狀？①嚴重頭痛 ②視力模糊 ③4 小時尿量為400ml ④血小板檢查結果為200,000/mm<sup>3</sup>  
(A)①② (B)②③ (C)③④ (D)①④
- (B) 37 破水待產的曾女士突然出現呼吸困難、尖銳的胸痛且無法呼吸，此時應懷疑她最可能發生下列那種問題？  
(A)胎盤早期剝離 (B)羊水栓塞 (C)子宮破裂 (D)子宮內翻
- (D) 38 有關正常陰道壁生態環境的維持，下列敘述何項錯誤？  
(A)受動情激素（estrogen）影響  
(B)受陰道上皮正常菌叢（Doderlein's bacilli）影響  
(C)受陰道內正常菌叢（Lactobacillus acidophilus）影響  
(D)受黃體激素（LH）刺激
- (B) 39 在進行新生兒身體檢查時，下列何項發現為異常？  
(A)斜眼 (B)斜頸 (C)乳房腫脹 (D)產瘤
- (C) 40 被強暴婦女進入醫療機構，醫護人員最主要的任務是給予個案醫療處置、驗傷、蒐證及情緒支持。當一位被性強暴婦女至急診處求診，何項措施最正確？  
(A)首先應予以婦女清潔身體及陰道灌洗，以預防性病  
(B)避免產生強暴創傷症候群，評估過程不應詢問受暴經過  
(C)急救評估過程中，應對個案保證她是安全的並告知其受傷情形  
(D)受暴後72 小時才可提供身體檢查，以確保證物完整性
- (B) 41 兒科護理最新趨勢為：  
(A)以照護為中心 (B)以家庭為中心 (C)以治療為中心 (D)以預防為中心
- (D) 42 根據Erikson 理論，9 歲兒童，若無法完成其階段發展任務，會產生以下何種情形？  
(A)罪惡感 (B)角色混淆 (C)羞恥與懷疑 (D)自卑感
- (C) 43 下列那個年齡層兒童，其繪畫內容已能充分表現豐富的創造性？  
(A)2~3 歲 (B)4~5 歲 (C)6~9 歲 (D)10 歲以上
- (A) 44 小強現在4 歲，被診斷為遲發性乳糖不耐症，下列那一個居家照顧的建議不適當？  
(A)小強的飲食絕不可以有乳製品  
(B)給小強食物前，要仔細閱讀成分說明，以了解該食物中乳糖的含量  
(C)帶小強看醫生時，要向醫師說明小強患有乳糖不耐症  
(D)小強可以喝優酪乳
- (A) 45 以阿帕嘉計分系統（Apgar scoring system）評估新生兒對子宮外生活立即適應狀態，評估時間點為何？  
(A)出生後第一分鐘及第五分鐘 (B)出生後第三分鐘及第七分鐘  
(C)出生後第五分鐘及第十分鐘 (D)出生後第七分鐘及第十五分鐘
- (B) 46 以叩診進行正常兒童的身體評估，下列敘述何者錯誤？  
(A)叩診胃部可聽到鼓音 (B)叩診肺部可聽到濁音  
(C)叩診腹部可聽到鼓音 (D)叩診肝臟可聽到濁音
- (B) 47 有關嬰兒猝死症候群之敘述，下列何者正確？  
(A)出生體重過重者發生率較高 (B)最常發生在出生2 至4 個月的嬰兒  
(C)女嬰發生率較高 (D)春夏季發生率較高

- (C) 48 牛小弟為早產兒，目前體重1,500 公克；每日餵食早產兒配方奶粉6 次（早產兒配方奶粉100c.c.之熱量為80 大卡），依每日每公斤需110~120 大卡所需能量計算，每次餵食量應為多少c.c.？  
(A) 14~20 c.c. (B) 24~30 c.c. (C) 34~40 c.c. (D) 44~50 c.c.
- (A) 49 那一個年齡層的兒童住院時，分離焦慮的行為表現最為明顯？  
(A)幼兒期 (B)學齡前期 (C)學齡期 (D)青少年期
- (C) 50 有關嬰幼兒生命徵象的測量，下列敘述何者錯誤？  
(A)生命徵象的測量先量呼吸，再量脈搏，最後才是量體溫和血壓  
(B)2 歲以下的兒童，以聽診器測心尖脈  
(C)嬰兒心尖脈在左鎖骨中線與第1~2 肋間交會點  
(D)測耳溫時，將耳朵向下向後拉
- (D) 51 3 歲的小玲因急性支氣管炎發燒（耳溫38°C）住院，下列那項護理措施不適當？  
(A)鼓勵多喝水及注意其攝取之營養量 (B)降低室溫，減少被蓋  
(C)給予冰枕使用 (D)給予服用Aspirin 以降低體溫
- (A) 52 2 個月的嬰兒接受肌肉注射，最優先選擇的注射部位是：  
(A)股外側肌 (B)腹臀肌 (C)背臀肌 (D)上臂三角肌
- (A) 53 有關護理人員教導第1 型糖尿病患童居家的治療控制，下列敘述何者正確？  
(A)注射部位需輪換以避免脂質增生，影響胰島素的吸收  
(B)注射後應按摩注射部位，以促進胰島素的吸收  
(C)使用二種胰島素注射時，應先抽混濁藥水，再抽澄清藥水  
(D)血糖控制穩定後，即可改為口服降血糖藥控制
- (D) 54 王小弟9 歲，因罹患水痘請假，若無任何合併症，何時可返校讀書？  
(A)體溫恢復正常 (B)不再有新的疱疹出現  
(C)所有疱疹開始結痂 (D)疱疹結痂後5 至7 天以上
- (B) 55 依據娜姬（Nagy）學說，3~5 歲的兒童對死亡的概念，下列何者正確？  
(A)沒有死亡概念 (B)死亡是一種短暫的分離  
(C)死亡是不可回復，但是可以避免 (D)死亡是不可避免的通則
- (D) 56 王小弟11 歲，為白血病末期患者，下列敘述，何項最能協助其面對死亡？  
(A)避免與其談論死亡問題，以免讓其直接面對死亡的恐懼  
(B)告知死亡是其上輩子的「業障」，以協助其接受死亡的事實  
(C)告知人死後會復生，轉移其對死亡的焦慮與害怕  
(D)與其討論死亡的問題，協助其表達對死亡的感受
- (D) 57 感染麻疹的病童會出現3C 症狀，不包括下列何者？  
(A)咳嗽（cough） (B)結膜炎（conjunctivitis）  
(C)鼻炎（coryza） (D)痙攣（convulsion）
- (C) 58 小禹為4 個月大男嬰，其母親已確定感染人類免疫缺乏病毒（human immunodeficiency virus, HIV），為確定小禹是否也被感染，可作下列何項檢查？  
(A)聯酶免疫分析（enzyme-linked immunosorbent assay, ELISA）  
(B)西方墨點法（Western blot technique）  
(C)病毒培養（virus culture）  
(D)全血球計數（complete blood count）
- (A) 59 以theophylline 靜脈注射治療氣喘時，護士須監測下列何者？  
(A)脈搏 (B)便秘 (C)體溫 (D)發紺
- (B) 60 噴霧治療無法達到下列何項效果？

- (A)稀釋分泌物 (B)增加肺泡表面張力  
(C)擴張支氣管 (D)溼潤呼吸道黏膜
- (B) 61 小涵4 歲，氣喘劇烈、反覆發作，醫囑需長期使用吸入型類固醇治療。小涵的媽媽對於類固醇的治療不清楚，下列護理指導原則何項適當？  
(A)使用類固醇的目的是擴張支氣管，避免呼吸道阻塞  
(B)吸入型類固醇可在平時規律使用，不會影響生長發育  
(C)避免接觸過敏原，即可不必再使用類固醇  
(D)氣喘症狀減輕後，即可自行停用類固醇
- (C) 62 下列何者不是急性風溼熱所表現之臨床症狀？  
(A)多發性關節炎 (B)心臟炎 (C)腎臟炎 (D)舞蹈症
- (A) 63 小茜現在1 個月大，被診斷有法洛氏四重畸形，在小茜開刀矯正之前，下列那一項護理措施不適當？  
(A)如果小茜發紺發作，趕快讓小茜平躺，抬高頭及胸部  
(B)避免小茜有便秘，並減少小茜哭泣的機會  
(C)可將奶嘴孔稍微加大，採少量多餐  
(D)家中常備小型氧氣筒，並教導小茜父母氧氣的使用方法
- (A) 64 2 歲的琪琪，診斷為心臟衰竭，醫囑「Digoxin 0.06mg q12h P.O.」，護理人員執行此醫囑時，下列何者錯誤？  
(A)給藥前需測量琪琪的心尖脈，若高於90 次／分，則暫不給藥  
(B)給藥時間需間隔12 小時，且需在飯前1 小時或飯後2 小時給藥  
(C)若有噁心、嘔吐、食慾不振、嗜睡、頭痛等症狀，需停止給藥並報告醫師  
(D)宜補充含鉀的食物，如香蕉、柑橘
- (D) 65 癌症病童接受化學治療期間，血小板降低到多少時，易有自發性出血傾向？  
(A)15 萬個/mm<sup>3</sup>以下 (B)10 萬個/mm<sup>3</sup>以下  
(C)5 萬個/mm<sup>3</sup>以下 (D)2 萬個/mm<sup>3</sup>以下
- (A) 66 對於防範兒童事故傷害的措施，下列敘述何者正確？  
(A)不允許兒童邊吃東西、邊跑、邊玩  
(B)對於不會翻身的嬰兒，不需使用床上護欄  
(C)對於剛學走路的嬰幼兒而言，在餐桌上鋪桌布對其安全有助益  
(D)為滿足嬰幼兒的口慾，可將奶嘴懸掛其頸部
- (C) 67 小強患有血友病，下列敘述何者正確？  
(A)造成小強凝血功能障礙的原因是血小板過度破壞  
(B)小強的爸爸是血友病患者，因此小強的血友病基因是來自爸爸  
(C)鼓勵小強從事適度的活動，以強化其關節肌肉  
(D)嚴重出血時，需立即輸注血小板
- (D) 68 有關先天性甲狀腺功能低下症（congenital hypothyroidism）之敘述，下列何者錯誤？  
(A)引起此病的可能原因為母親懷孕時缺乏碘的攝取 (B)早期症狀為新生兒黃疸與便秘  
(C)可以L-thyroxine 治療 (D)只要接受治療就不會影響智能
- (A) 69 周小弟4 歲，因燒傷被送至急診，評估周小弟輸液量是否恰當最好的方法是：  
(A)監測其尿量及尿液比重 (B)每一小時測量血壓  
(C)觀察皮膚彈性光澤 (D)監測體溫的變化
- (D) 70 張小弟目前8 個月大，一向很健康，2 天前突然開始斷斷續續尖叫、哭泣、嘔吐，今天早上解草莓果醬樣大便，嘔吐越來越嚴重，張小弟的症狀是下列何種疾病的臨床表徵？  
(A)巨結腸症 (B)輪狀病毒感染

- (C)幽門狹窄 (D)腸套疊
- (B) 71 有關幽門狹窄 (pyloric stenosis) 之敘述，下列何者正確？  
(A)容易呈現代謝性酸中毒 (B)會呈現噴射狀嘔吐  
(C)嘔吐物含膽汁 (D)大便呈白色
- (C) 72 有關腎病症候群之敘述，下列何者錯誤？  
(A)蛋白尿、尿液顏色深且呈泡沫狀 (B)血液生化檢查：血清白蛋白減少，膽固醇增加  
(C)宜採低蛋白、高碳水化合物及低鈉飲食 (D)出現全身性水腫
- (D) 73 有關泌尿道感染兒童的護理處置，下列何者正確？  
(A)因頻尿且有潛血發生，所以不宜給予小紅莓汁  
(B)為避免憋尿及尿瀦留，需減少水分的攝取  
(C)鼓勵多飲用碳酸飲料，協助膀胱黏膜修復  
(D)建議給予蔓越莓汁 (cranberry juice) 增加尿液酸化，以減少細菌滋生
- (B) 74 有關兒童細菌性腦膜炎 (Bacterial Meningitis) 的敘述，下列何者錯誤？  
(A)常見之病原菌為B 型嗜血桿菌、腦膜炎雙球菌及肺炎雙球菌  
(B)肺炎雙球菌腦膜炎病童的接觸者，應給予預防性抗生素  
(C)腦脊髓液中的葡萄糖濃度會降低、蛋白質濃度升高、革蘭氏染色呈陽性反應  
(D)腰椎穿刺的結果出來之前，可先給病童廣效性抗生素
- (A) 75 兒童癲癇發作時，下列那項護理措施正確？  
(A)讓兒童保持側臥姿勢，以利其口腔分泌物流出  
(B)固定兒童四肢，避免抽搐時發生骨折  
(C)務必將緊閉的牙關打開，置壓舌板於口中  
(D)讓兒童平躺頭後仰，以維持呼吸道通暢
- (B) 76 有關成骨不全 (osteogenesis imperfecta) 之敘述，下列何者錯誤？  
(A)是一種罕見的先天性胎兒骨骼發育異常的疾病  
(B)應鼓勵病童保持固定的姿態，以避免疼痛  
(C)患者骨骼脆弱，易出現骨折的危機  
(D)典型的病徵是會出現四肢極短、彎曲成弓型及肌肉張力減退
- (C) 77 有關脊柱側彎之敘述，下列何者正確？①彎腰時，背部呈現明顯的突峰 ②結構性脊柱側彎是由姿勢習慣不良所造成的 ③X 光檢查可確立診斷 ④早期可以游泳來治療  
(A)①②③ (B)②③④ (C)①③④ (D)①②④
- (B) 78 林小弟的血液常規檢查發現，白血球：2000/mm<sup>3</sup>，嗜中性白血球 (neutrophils)：8%，未分裂嗜中性白血球 (bands)：8%，其絕對嗜中性白血球 (ANC) 估計是多少？  
(A) 160 (B) 320 (C) 640 (D) 1280
- (A) 79 有關先天性腎上腺增生症 (congenital adrenal hyperplasia) 之敘述，下列何者錯誤？  
(A)是一種性染色體隱性遺傳疾病  
(B)促腎上腺皮質素分泌增加，使雄性素分泌過多  
(C)男性患者會有無精子形成的情形  
(D)須檢查24 小時尿液中的17-酮類固醇 (17-ketosteroids)，以確立診斷
- (A) 80 有關白血病兒童接受預防注射的原則，下列何者錯誤？  
(A)仍可按時施打各項疫苗  
(B)在化療期間不可施打活性疫苗 (live virus vaccines)  
(C)化療前2 週或化療期間注射的疫苗，需於化療停藥3 個月後重新施打  
(D)病童手足可以按時施打各項疫苗