

《內外科護理學》

- (B) 1 有關腰椎間盤突出之診斷檢查，下列何者錯誤？
(A)直舉腿試驗：若有腰椎間盤突出，當腿直舉 30° 以上時，會產生坐骨神經痛
(B)大腳趾試驗：左腳趾軟弱無力，表示右邊神經受壓
(C) Kernig 氏徵象：小腿往上伸展感覺疼痛，表示有腰椎間盤突出
(D) X 光攝影：可看出脊椎退化，但看不出腰椎間盤是否破裂
- (D) 2 下列何項不是顱內壓升高 (IICP) 的徵象與症狀？
(A)視乳突水腫 (B)脈搏壓變寬 (C)頭痛 (D)暈眩
- (B) 3 有關頭部創傷的護理措施，下列何項錯誤？
(A)避免集中護理，護理活動宜分項執行 (B)臥床時採平躺姿勢，頭部以枕頭墊高
(C)限制水分，並記錄輸出入量 (D)每次抽痰前給予吸入100%氧氣
- (C) 4 下列何項是導致重症肌無力病患出現肌無力危機 (myasthenic crisis) 的促發因子？
(A)藥物劑量過多 (B)運動過少 (C)忘了吃藥 (D)攝取過多脂肪性食物
- (B) 5 有關協助中風吞嚥困難病患餵食之敘述，下列何者正確？
(A)餵食時可將病患頭部轉向一邊，以便利餵食
(B)採坐直的姿勢最適合接受餵食
(C)給予進食冰棒，以協助吞嚥
(D)進食時將食物放置在患側口腔內，並在食物吞下後檢查口腔內是否仍有食物存留
- (D) 6 錢先生為馴馬師，日前由馬背上摔下來，造成脊髓橫斷，兩星期後似乎有脊髓休克恢復的現象，請問下列何者為脊髓休克 (spinal shock) 恢復的指標？
(A)膀胱排空反射減弱 (B)肌肉功能增強 (C)腸道張力減弱 (D)自主反射增強
- (A) 7 下列何者為巴金森氏症病患早期的臨床表徵？
(A)大拇指對手指的搓藥丸動作 (B)肢體僵直，快步行走
(C)面部表情扭曲 (D)複語症 (palilalia)
- (D) 8 有關狂牛病的敘述，下列何者正確？
(A)為細菌所引起之牛隻腦部海綿狀病變 (B)潛伏期極短，但病程進展極為緩慢
(C)受感染肉品需高溫消毒後，始可食用 (D)感染後，患者主要臨床症狀為進行性精神衰退
- (B) 9 血清中氨 (ammonia) 升高的患者，依醫囑服用Lactulose 30ml qid 時，會出現下列何種現象？
(A)血尿 (B)腹瀉 (C)發燒 (D)低血鉀
- (B) 10 有關腸胃道出血病患之描述，下列何者錯誤？
(A)病患應立即禁食，由靜脈輸液補充液體
(B)應長期使用血管加壓素 (vasopressin)，以控制出血
(C)嚴重出血時，會出現低血壓、脈搏微弱、發冷及心悸等現象
(D)通常會為病患插上鼻胃管，以評估出血量、胃減壓及胃灌洗
- (A) 11 有關急性胰臟炎病患之護理措施，下列何者錯誤？
(A)低血糖的預防 (B)腹痛未改善前不宜進食
(C)應限制酒、茶及咖啡的攝取 (D)留心嚴重之出血反應
- (D) 12 有關完全腸胃道外營養法 (TPN) 常見的合併症，下列何者錯誤？
(A)感染 (B)高血糖 (C)電解質不平衡 (D)腹瀉
- (A) 13 有關膽石症之敘述，下列何者正確？

- (A)若是結石阻塞膽汁流入十二指腸，可能會呈灰色大便
 (B)疼痛時應施打morphine，因可降低膽道括約肌的痙攣及壓力
 (C)宜即早手術取石，避免合併症發生
 (D)男性較女性易罹患
- (D) 14 有關痛風患者之護理措施，下列何者錯誤？
 (A)避免攝取豆類食物 (B)如無限制，每天至少攝入液體2000 c.c.
 (C)避免高脂肪食物及飲酒 (D)鼓勵攝取酸性食物，以防尿路結石
- (A) 15 下列處置何者無法預防肝昏迷？
 (A)腹腔放液以減少腹水 (B)維持血中鉀離子平衡
 (C)防止便秘的發生 (D)限制蛋白質的攝取
- (C) 16 有關退化性關節炎的醫療與護理處置，下列何項錯誤？
 (A)運用熱敷與運動可減輕肌肉痙攣，有助於解除疼痛及僵硬
 (B)常採用髖關節與膝關節的關節置換術
 (C)等長運動可增加肌肉強度亦可減輕關節承受的壓力
 (D)教導患者經常使用大關節執行活動，以保護關節並減緩病情惡化
- (A) 17 下列何種治療目標是牽引可達成，但是石膏無法達成？
 (A)解除肌肉痙攣 (B)限制活動 (C)維持骨折部位的復位 (D)預防畸型
- (D) 18 對於剛上完石膏病患的護理措施，下列何者正確？
 (A)將健側及患側肢體皆覆蓋在被蓋內，以利保暖
 (B)上石膏的肢體勿墊高，以免石膏變形
 (C)可使用烤燈，以加速石膏的乾燥
 (D)告知病患剛上石膏十五分鐘內，若有溫熱感覺為正常現象
- (A) 19 髖部手術後的護理處置，下列何者錯誤？
 (A)為了方便上下床避免跌倒，床舖應儘量搖低
 (B)協助翻身時，應儘可能地向其解釋
 (C)可用長枕頭置於雙腿之間協助翻身
 (D)維持手術側腿部的外展
- (C) 20 有關急性中耳炎的敘述，下列何者錯誤？
 (A)教導病患以伐氏操作法（Valsalva's maneuver）保持耳咽管通暢
 (B)耳膜有破裂者應禁止游泳
 (C)最常以抗生素治療，需要按時不間斷服用一個月
 (D)在家耳痛時不應自行買成藥止痛，應立刻就醫
- (B) 21 視網膜剝離前最可能出現的不適症狀為何？①頭痛 ②閃光幻視 ③飛蚊症 ④視野缺損
 (A)①② (B)②③ (C)①④ (D)③④
- (D) 22 有關鼻竇炎病患的護理措施，下列敘述何者錯誤？
 (A)正確給予鼻噴劑或鼻滴劑的方法是頭後仰且稍側，在藥物進入後要保持該姿勢5 分鐘
 (B)在患部給予溼熱敷
 (C)有助於病患分泌物引流的姿勢是半坐臥式、床頭搖高30°
 (D)Aspirin 是鼻竇炎病患常使用的止痛藥
- 情況：王太太因為不慎被藥水灼傷角膜，需施行角膜移植手術，請回答第23~24 題。
- (C) 23 有關角膜移植手術之敘述，下列何者正確？
 (A)層狀角膜移植較常用 (B)捐贈之角膜需用無菌冰生理食鹽水儲存
 (C)糖尿病患者的角膜，不適宜捐贈 (D)嬰兒的角膜質地細緻，適宜捐贈
- (C) 24 角膜手術後，王太太需注意之事項，下列何者錯誤？

- (A)術後應戴眼罩保護眼睛 (B)手術後1~2 天應躺向健側
(C)手術2 天後，開始眼球運動 (D)眼球手術部位會採壓力性敷料
- (A) 25 下列何者是低血容積性休克病人達到有效輸液治療之最佳表徵？
(A)尿量每小時每公斤大於0.5 c.c. (B)脈搏每分鐘60 到100 次
(C)收縮壓大於110 mmHg 且舒張壓大於90 mmHg (D)呼吸速率每分鐘在12 到20 次之間
- (C) 26 病患身體活動明顯受限制，從事比普通身體活動更輕微的活動也會導致疲倦、心悸、呼吸困難或心絞痛時，依據美國紐約心臟協會（New York Heart Association）之分類，此狀況屬於心臟功能第幾級？
(A)第一級 (B)第二級 (C)第三級 (D)第四級
- (A) 27 有關病患服用Digoxin 藥物之敘述，下列何者正確？
(A)血中Digoxin 有效治療濃度為0.8~2 ng/mL
(B)血中Digoxin 中毒濃度為 > 4.2 ng/mL
(C)病患若心跳 < 60 次/分鐘，可繼續服藥，但需測量血鉀濃度
(D)病患服藥期間如有畏光、視力模糊屬正常現象，停藥後，症狀即會消失
- (B) 28 有關開心手術後，病患的胸腔引流之敘述，下列何者正確？
(A)每小時每公斤體重的引流量以不超過0.5 c.c.為限
(B)引流液由紅色逐漸變為淡紅色、淡黃色
(C)引流量減少時，CVP 值會上升
(D)手術後4~6 小時內引流液即明顯減少或無引流量
- (A) 29 有關接受冠狀動脈支架患者服用aspirin 之敘述，下列何者正確？
(A)為血小板抑制劑 (B)能降低心肌耗氧需求，而減緩胸痛
(C)應於冠狀動脈支架放置前2 天開始服用 (D)建議服用半年，才會看見成效
- 情況：王太太罹患子宮頸癌，癌細胞侵犯至子宮頸外之上陰道三分之一，但未侵犯子宮旁組織，此次住院乃接受根治性子宮切除術。請回答第30~33 題。
- (C) 30 依據世界衛生組織國際分類法，醫師對王太太子宮頸癌的診斷分期為第幾期？
(A)第I a 期 (B)第I b 期 (C)第II a 期 (D)第II b 期
- (A) 31 王太太手術後接受化學藥物治療，靜脈輸注時發生滲漏現象，下列護理處置何者錯誤？
(A)迅速停止藥物注射，並立即拔除針頭 (B)依醫囑在滲漏部位四周注射解毒劑
(C)由原針頭處抽出殘留在局部之藥液 (D)抬高患肢三天，避免局部重力加壓
- (C) 32 給予王太太化學藥物治療的處理方式，下列何者錯誤？
(A)放置化療藥物廢棄物之容器，應隨時保持緊密
(B)接觸過病患排泄物和嘔吐物的床單應與其他床單分開清洗
(C)直接接觸病患的針頭、針筒及玻璃空藥瓶需分開棄置
(D)當皮膚或黏膜碰到化學抗癌藥物，立刻用大量的清水沖洗
- (C) 33 王太太接受化療後併發「腫瘤溶解症候群」（tumor lysis syndrome），下列生化檢驗值何者錯誤？
(A) $[PO_4^{2-}] \uparrow$ (B) $[K^+] \uparrow$ (C) $[UA] \downarrow$ (D) $[Ca^{2+}] \downarrow$
- (A) 34 有關心導管檢查衛教內容，下列何項錯誤？
(A)心導管檢查的主要目的在治療冠狀動脈疾病
(B)心導管檢查經由導管進入心臟各腔室，以確認心臟各腔室的壓力
(C)可進行心室或主動脈攝影
(D)為侵入性檢查，通常於心導管室進行
- (C) 35 有關放射線治療的護理措施，下列何者正確？
(A)治療期間，可使用熱敷緩解病患照射部位的不適

- (B)嚴禁病患刮鬚鬚，以免刮傷皮膚
(C)提醒病患不可洗去照射部位皮膚上所做的記號
(D)宜用肥皂清洗照射部位的油垢沈積
- (A) 36 有關PQRST 疼痛評估指引之敘述，下列何者錯誤？
(A) P 是指疼痛的區域 (B) Q 是指疼痛的性質
(C) S 是指疼痛的嚴重性 (D) T 是指疼痛持續的時間
- (B) 37 有關蕁麻疹 (urticaria) 的處置，下列何者正確？
(A)使用皮質類固醇類藥物 (B)使用抗組織胺類藥物 (C)擦潤膚乳液 (D)擦防曬乳液
- (D) 38 下列何者是老化可能引起的皮膚變化？
(A)指甲變薄 (B)真皮層血管分布增加
(C)皮膚及毛髮油量增加 (D)皮下脂肪和細胞外液減少
- (A) 39 下列何者是異位性皮膚炎較常侵犯的部位？
(A)手肘前 (B)臀部 (C)腳掌 (D)顏面
- (B) 40 人類發生過敏反應時，下列何種白血球的數目會增加？
(A)嗜中性白血球 (B)嗜酸性白血球 (C)嗜鹼性白血球 (D)單核球
- (C) 41 有關器官捐贈之敘述，下列何者錯誤？
(A)腎臟自捐贈者身上摘下後可保存48 小時 (B)配偶捐贈需已育有子女或結婚兩年以上
(C)活體器官捐贈限制在三等親內 (D)器官摘下後可保存在4°C的電解質溶液
- (D) 42 有關愛滋病患者的出院衛教，下列何者錯誤？
(A)嚴重腹瀉時，需用漂白水清洗馬桶
(B)要戴口罩清洗動物
(C)避免到公共場所
(D)飯前服用藥物可以與茶或牛奶同時服用
- (D) 43 依據美國疾病管制中心 (CDC) 對人類免疫不全病毒特徵的分類，當出現伺機性感染，與CD4 細胞數少於200/mm³ 時是屬於那一族群？
(A)第一族群 (B)第二族群 (C)第三族群 (D)第四族群
- (C) 44 有關全身性紅斑性狼瘡病患之護理措施，下列何者錯誤？
(A)在表皮使用經皮電波刺激，可以阻斷神經疼痛傳導
(B)注意口腔護理，使用軟毛牙刷
(C)白天外出應穿短袖上衣及短褲，以免因炎熱造成皮膚癢
(D)應觀察有無蛋白尿、血尿及少尿的情形
- (B) 45 肺葉切除手術後之護理措施，下列何者錯誤？
(A)抬高床頭 (B)臥向患側 (C)鼓勵戒菸 (D)鼓勵患側肩部運動
- (D) 46 下列何者不是氣胸的臨床表徵？
(A)胸痛 (B)心搏過速 (C)躁動不安 (D)胸內壓降低
- (A) 47 病患咳出的痰液為鐵銹色，可能是下列那一型肺炎？
(A)肺炎球菌性肺炎 (B)克雷白氏桿菌性肺炎 (C)假單胞菌屬肺炎 (D)分枝桿菌性肺炎
- (D) 48 教導病患噤嘴式呼吸之主要目的為何？
(A)使呼吸速率變慢 (B)增加吸入的氧氣量
(C)幫助鬆動分泌物 (D)預防呼氣時小氣道早期塌陷
- (C) 49 下列何項不是膀胱炎常見的症狀？
(A)頻尿 (B)急尿 (C)尿糖 (D)排尿有燒灼感
- (C) 50 病患出現鉀離子過高現象，下列處置方式何者錯誤？
(A)靜脈注射胰島素加在10~50%葡萄糖溶液中 (B)給予Kayexalate 口服或灌腸

- (C)衛教多食用杏仁、核桃及生菜 (D)必要時可給予血液透析
- (A) 51 行靜脈腎盂攝影 (IVP)，予病患服用Dulcolax 及Gascon 之主要目的為：
(A)驅除腸內糞便及氣體 (B)中和胃酸 (C)促進顯影劑吸收 (D)預防尿路感染
- (D) 52 有關腎結石與尿液pH 值的關係，下列敘述何者正確？
(A)尿酸結石易於鹼性尿中形成 (B)草酸鈣結石易於酸性尿中形成
(C)胱胺酸結石不受尿液pH 值影響 (D)磷酸鈣結石易於鹼性尿中形成
- (A) 53 有關預防泌尿道感染之方法，下列何者錯誤？
(A)大量攝取柑橘類果汁 (B)多用淋浴，少用盆浴
(C)避免使膀胱過度膨脹 (D)性交後，立即排空膀胱
- (B) 54 有關代謝性酸中毒之敘述，下列何者錯誤？
(A)動脈血pH 值低於7.35 (B)會伴隨發生低氯血症
(C)腎衰竭是病因之一 (D)血清HCO₃⁻ 低於22 mEq/L
- (D) 55 有關膀胱癌的敘述，下列何者錯誤？
(A)無痛性血尿是最初徵象 (B)最基本的檢查是尿液分析
(C)膀胱癌的危險因子之一是抽菸 (D)最常見的細胞增生是腺癌
- (C) 56 下列何者不是良性攝護腺肥大的典型症狀？
(A)頻尿 (B)夜尿 (C)小便量多 (D)滴尿
- (D) 57 嗜鉻細胞瘤 (pheochromocytoma) 切除術後，可能會出現下列何種立即性合併症？
(A)心因性休克 (B)肺栓塞 (C)酮酸血症 (D)低血壓
- (D) 58 有關碘製劑的使用，下列敘述何者錯誤？
(A)應以吸管飲用，避免牙齒被染色
(B)可與牛奶或果汁混合飲用
(C)碘製劑通常於甲狀腺手術前與甲狀腺藥物合併使用
(D)需持續服用12 個月
- (B) 59 下列何種疾病治療時，需注射高張的氯化鈉溶液？
(A)尿崩症 (DI) (B)抗利尿激素分泌不當症候群 (SIADH)
(C)格雷氏病 (Grave's disease) (D)愛迪生氏病 (Addison's disease)
- (C) 60 有關甲狀腺切除術後的合併症，下列何者錯誤？
(A)出血、呼吸困難 (B)聲音嘶啞 (C)高血鈣 (D)喉神經受損
- (B) 61 有關艾迪森氏病 (Addison's disease) 之敘述，下列何者錯誤？
(A)因腎上腺皮質功能不全所引起 (B)出現高血糖
(C)姿勢性低血壓 (D)皮膚與黏膜色素沉著
- (C) 62 減少吞食毒物的吸收最有效的措施為何？
(A)胃灌洗 (B)使用Ipecac 催吐 (C)使用活性碳吸收毒物 (D)服用牛奶來稀釋毒物
- (B) 63 為無意識病患進行哈姆立克急救法 (Heimlich maneuver) 時，下列步驟何者正確？
(A)抱起病患使其採取坐姿
(B)用一手掌置於病患上腹部中央，另一手覆蓋其上
(C)雙臂打直，迅速向腰側施壓推擠
(D)進行 5 次推擠後，緊接進行人工呼吸
- (A) 64 有關協助醫師為病患執行去纖維震顫術 (Defibrillation) 之敘述，下列何者錯誤？
(A)適用於病竇症候群 (sick sinus syndrome) 之病人
(B)一般電流強度自200~300 焦耳開始
(C)電極板分別放置於個案右鎖骨下第二肋間與左前腋線第五肋間處
(D)使用時，應避開氧氣帳

- (B) 65 有關病毒性肝炎的敘述，下列何者錯誤？
(A) Anti-HAV IgM(+)代表已感染A 型肝炎
(B) B 型肝炎病毒是一種缺陷性的RNA 病毒
(C)血中出現B 型肝炎表面抗原 (HBsAg)，代表此人有傳染性
(D)注射B 型肝炎免疫球蛋白是一種被動免疫
- (D) 66 有關風濕熱的敘述，下列何者錯誤？
(A)大都在上呼吸道受到A 族 β 溶血性鏈球菌感染
(B)發病之潛伏期為1~5 週
(C)可侵犯身體關節、中樞神經及心臟內膜等器官
(D)好發於45 歲以上之成年人
- (A) 67 給予燒傷病患液體補充時，除考量體表燒傷範圍外，應再考慮下列何者？
(A)體重 (B)身高 (C)體表面積 (D)身體質量指標
- (B) 68 急診病患的體溫為32.2°C時，下列何種低體溫的回溫方法最合適？
(A)以身體對身體接觸的方式進行被動加溫 (B)使用加溫靜脈輸液進行主動升溫
(C)使用充氣溫毯進行被動加溫 (D)泡溫水澡進行主動回溫
- (A) 69 有關鞏皮症 (Scleroderma) 的敘述，下列何者錯誤？
(A)只會侵犯手指、四肢遠端及臉部的皮膚
(B)好發年齡為30~40 歲
(C)女性發病率高於男性
(D)環境中危險的致病因子包括：矽塵、聚氯乙烯及抗癌藥物
- (B) 70 有關甲狀腺功能過低患者之護理，下列何者錯誤？
(A)鼓勵攝取高纖維食物，預防便秘
(B)必須服用甲狀腺製劑6-12 個月
(C)注意保暖，但不可使用電毯或熱水袋
(D)對安眠藥、鎮靜劑與麻醉劑的敏感性增加，應避免使用
- (C) 71 下列何者不是戒斷呼吸器後呼吸肌疲乏的症狀？
(A)呼吸次數 > 30 次/分鐘 (B)意識程度改變，躁動不安
(C)心搏次數 < 60 次/分鐘 (D)動脈血氧分壓 < 55 mmHg
- (D) 72 有關氣管內管的敘述，下列何者錯誤？
(A)氣囊內所充的氣體通常維持在14~20 mmHg
(B)每8 小時應測試氣囊內之氣體壓力一次
(C)氣囊在注入空氣後無法脹滿，表示有漏氣
(D)氣囊漏氣時，無法由氣管內管抽吸到食物
- (BD) 73 有關糖化血紅素 (HbA1c) 之敘述，下列何者錯誤？
(A)反應過去2-3 個月內血糖控制之情形
(B)當糖尿病患者的糖化血紅素 < 10%，表示控制不好
(C)不受驗血時間 (AC 或PC) 所影響
(D)可作為糖尿病及溶血性貧血的檢查方法
- (C) 74 胃切除後傾倒症候群 (dumping syndrome) 之預防措施，下列何者錯誤？
(A)少量多餐 (B)飯後躺下休息 (C)採低脂高糖飲食 (D)進食過程中不飲水
- (A) 75 照顧尿崩症 (diabetes insipidus ; DI) 患者，下列何者正確？
(A)水剝奪試驗 (water deprivation test) 可協助尿崩症的診斷
(B)應靜脈注射人工ADH 類似物 (DDAVP)
(C)患者會出現血壓上升、CVP 值高於正常

- (D)限制大量液體攝取
- (D) 76 有關下壁心肌梗塞之敘述，下列何者正確？
(A)主要由左迴旋支冠狀動脈阻塞所造成
(B)心電圖lead I, AVL, V1 及V2 導程會出現Q wave 或ST 段上升
(C)病患較不易合併病竇症候群 (sick sinus syndrome)
(D)病患可能導致房室傳導阻滯
- (B) 77 48 歲張太太因眼睛周圍突然劇痛至門診求治，經診斷為急性隅角閉鎖性青光眼。張太太可能發生的症狀，下列何者錯誤？
(A)頭痛及額頭痛 (B)新月形視野 (C)視力模糊 (D)對光感受性降低
- (A) 78 有關肝硬化導致腹水的敘述，下列何者錯誤？
(A)腹水中的Albumin 值高於血清中的數值 (B)避免服用Aspirin
(C)腹水嚴重時需限制鹽分的攝取 (D)腹水通常可使用利尿劑治療
- (B) 79 院內感染的肺炎，最常見的致病菌是下列那幾種？①肺炎鏈球菌 ②黴漿菌 ③克雷白氏桿菌 ④綠膿桿菌
(A)①② (B)③④ (C)①③ (D)②④
- (B) 80 下列何種化學藥物會造成出血性膀胱炎？
(A) 5-Fu (B) Cytosan (C) Ara-C (D) Bleomycin

建國

【版權所有，重製必究！】