《產兒科護理學》

（A）1 妊娠誘發性高血壓的個案，好發於下列那些高危險群？①低社經狀況的低齡孕婦 ②35 歲以上之孕婦 ③多胞胎孕婦 ④經產婦
(A)①②③ (B)①②④ (C)①③④ (D)②③④

（C）2 早產兒出生前即給予母親施打類固醇藥物，其主要目的為下列何者？
(A)預防早產兒感染 (B)促進早產兒生長 (C)刺激早產兒肺泡成熟 (D)增強早產兒免疫力

（A）3 為預防產後乳房充盈（breast engorgement）的發生，下列護理措施何者最正確？
(A)指導增加哺餵母乳的頻率與次數 (B)提供支持性胸衣
(C)乳房冷敷 (D)教導牽引乳頭

（B）4 孕婦藥物濫用對胎兒或新生兒的影響，不包括下列何項？
(A)先天畸型 (B)過期產 (C)子宮內生長遲滯 (D)呼吸窘迫

（A）5 新生兒體熱散失的途徑中，隨體表水分散失導致之散熱為下列那一種途徑？
(A)蒸發 (B)傳導 (C)對流 (D)輻射

（D）6 下列有關促進乳汁分泌的敘述，何者錯誤？
(A)嬰兒吸吮越多，乳汁即分泌越多
(B)每次餵完奶後，可排空乳房，以維持乳汁持續分泌足夠的量
(C)奶脹時，應增加哺餵的次數
(D)夜間可以不需要哺餵母乳，因為產婦若太疲倦，會影響乳汁的分泌

（A）7 有關指導不孕夫婦之性生活，使受孕之機會增加。下列敘述何項錯誤？
(A)為了促進精液之品質，男性應於女性易受孕期之前禁慾二週以上
(B)為了避免精液之滲出，性交後，以枕頭抬高女性之髖部
(C)為了提高受孕的機會，於易受孕期，每隔兩天性交一次
(D)指導婦女自行評估子宮頸黏液之分泌

（C）8 口服避孕藥的禁忌不包括下列何者？
(A)罹患心血管疾病者 (B)肝功能受損者 (C)月經不規則者 (D)正在哺乳者

（D）9 李太太子宮頸全開，在產檯上配合宮縮已用力 40 分鐘，胎頭高度仍為0，胎心音約為130次/分鐘，此時護理人員最恰當的措施是下列何者？
(A)準備剖腹產 (B)調快點滴速率 (C)協助推壓子宮底 (D)評估膀胱是否脹滿

（C）10 李太太因產程進入活動期，宮縮強度增加而顯得緊張不安甚至大叫，此時護理人員最適宜的行為是下列何者？
(A)提高音調以有效溝通 (B)保持沉默減少刺激
(C)聲音平靜態度溫和 (D)提供笑話緩和情緒

（D）11 李女士在產檯上用力，宮縮間歇時，她叫著：「太痛了！我不要生了！」，不願意再用力，此時助產人員較合適的回應為何？
(A)現在說不生也不行了！嘴巴閉起來用力。 (B)你不用力，小孩會生不出來！
(C)有誰生孩子不會痛的？ (D)之前你做得很好，加油！你一定可以做到的！

（B）12 一般而言，劉太太妊娠22 週，此期她最不可能出現的反應為何？
(A)情緒不穩，有時很高興，有時又很沮喪 (B)懷疑這時懷孕是否合適
(C)常常晚上睡覺會作夢，夢到小孩子不正常 (D)聽到胎心音時，出現興奮、愉悅表情

（D）13 準爸爸在懷孕期的任務，下列何者錯誤？
(A)調適夫妻關係的改變 (B)與胎兒建立關係 (C)逐漸參與懷孕 (D)將胎兒與自己分離

（B）14 動情激素可以對下視丘和腦垂體產生回饋作用（feedback mechanism），月經週期中，當動情激素濃度升高時，下視丘會：
(A)分泌黃體釋放激素（LHRH）產生負回饋作用（negative feedback mechanism）
(B)分泌黃體釋放激素（LHRH）產生正回饋作用（positive feedback mechanism）
(C)分泌黃體素（progesterone）產生負回饋作用（negative feedback mechanism）
(D)分泌黃體素（progesterone）產生正回饋作用（positive feedback mechanism）

（D）15 下列何者不屬於排卵機能的檢查？
(A)基礎體溫表的測量與判讀 (B)血清中黃體素（progesterone）的檢查
(C)血清中動情激素（estrogen）的檢查 (D)子宮輸卵管攝影（Hysterosalpingography）

（C）16 陳太太妊娠30 週，患有妊娠糖尿病而住院，下列那些徵兆，可判斷其有酮酸症（糖尿病昏迷）的可能？①皮膚蒼白濕冷 ②嘔吐 ③呼吸快速 ④呼吸淺
(A)①③ (B)①④ (C)②③ (D)②④

（B）17 處理過期性流產（missed abortion），爲避免造成大出血所致的意外，應先執行下列何項措施？
(A)測定hCG 值及血球計數 (B)檢驗血清纖維蛋白原（fibrinogen）
(C)實行子宮頸擴張及刮除術 (D)先給予注射維他命K 10 mg

（C）18 下列有關新生兒行爲狀態的敘述，何者正確？
(A)週期性行爲改變（清醒/睡眠週期）與其生理成熟度無關
(B)新生兒行爲狀態爲自發性反應，無特殊意義存在
(C)滿月的新生兒一個清醒/睡眠週期約爲四小時
(D)早產兒的清醒時間較足月兒長

（A）19 有關囟門的敘述，下列何者正確？
(A)前囟門比後囟門大 (B)前囟門出生後六週自行閉合
(C)後囟門呈菱形狀 (D)囟門愈大表示愈聰明

（C）20 唯一可通過胎盤的抗體是下列何者？
(A) IgA (B) IgE (C) IgG (D) IgM

（D）21 最容易造成低張性子宮功能不良的爲：
(A)妊娠毒血症 (B)孕婦貧血 (C)骨盆狹窄 (D)雙胞胎妊娠

（C）22 有關哺餵母乳之相關敘述，何者正確？
(A)正確哺餵母乳的方式應該是兩邊乳房交替餵，每次每邊只餵5~10 分鐘
(B)乳頭受傷常見原因爲嬰兒吸吮乳頭時間過久
(C)哺餵母乳可減少母親罹患乳癌的機會
(D)若嬰兒吸收力較差時，宜用配方奶餵食

（D）23 王太太爲職業婦女，第一胎，懷孕20 週，尚未決定是否哺餵母乳，護理人員告訴王太太母乳與牛乳之不同點時，下列何種說法是正確的？
(A)母乳中的蛋白質較牛乳高，有助嬰兒生長發育
(B)母乳中含較多的飽和脂肪酸，易於消化吸收
(C)牛乳中乳糖含量較高，嬰兒易發胖
(D)母乳中含免疫抗體IgA，可以減少嬰兒呼吸道及腸胃道受到感染的機會

【版權所有，重製必究！】

（B）24 產後泌尿道感染，最常見的原因爲：
(A)子宮收縮不佳 (B)尿瀦留 (C)液體攝取不足 (D)尿液酸鹼值改變

（C）25 下列何者爲產後生殖系統的正常變化？
(A)分娩後子宮內膜剝落排出惡露，約持續10 天，皆爲紅色惡露
(B)產後三週仍可於腹部摸到子宮底

(C)約產後12 小時，子宮底上升至肚臍的位置或稍高於肚臍
(D)子宮約在產後四週，便可恢復到懷孕前的大小

（D）26 張太太第二胎，自然生產產後第二天，護理人員進行身體評估，下列那種情況爲產後異常的現象？
(A)出汗多，且小便量多　(B)有產後痛的情形
(C)有腹直肌分離的現象　(D)出現霍曼氏徵象（Homan’s sign）

（B）27 王太太，第一胎，產檢時，胎位爲LOA，胎兒的前囟門可於王太太子宮頸之何處觸摸到？
(A)右上方　(B)右下方　(C)左上方　(D)左下方

（D）28 巨大的胎兒壓迫到臍帶，胎心音最可能出現下列何種變化？
(A)加速　(B)早期減速　(C)晚期減速　(D)變異性減速

（C）29 PGE2 陰道栓劑給藥之目的爲何？
(A)促進子宮頸平滑肌收縮　(B)促進胎兒肺部成熟
(C)促進子宮頸軟化成熟　(D)防止子宮頸水腫

（B）30 王太太G2 P1 ，待產期間行硬膜外麻醉，目前子宮頸口開6 公分，下列何種情形最可能發生？
(A)有尿意感　(B)下肢移動困難　(C)高血壓　(D)可感覺宮縮強度

（C）31 當待產婦使用催產素（Oxytocin）協助引產時，下列何者是最正確的護理措施？
(A)呼吸急促時給予氧氣　(B)宮縮較弱時即可調高滴速
(C)告訴待產婦宮縮感覺會比較強烈　(D)注意待產婦有無心悸、氣喘現象

（D）32 王太太40 歲，懷孕第9 週，十分擔心會生下畸型兒，當她問護理人員有什麼方法能檢查胎兒是否有畸型時，最佳的回答爲：
(A)妳擔心太多
(B)X 光檢查在懷孕六個月時可以檢查出胎兒是否畸型，我會請醫師向您解釋
(C)等下一次產前檢查時，我們再討論此問題
(D)超音波檢查在懷孕四、五個月時，通常可以協助檢查胎兒是否畸型，你是否想要知道更進一步的訊息

（C）33 95%的骨盆腔器官脫垂發生在經產婦，下列預防其發生之護理指導何者正確？
(A)良好的產前活動指導，多採剖腹生產
(B)鼓勵產婦儘量憋尿，以加強骨盆底肌肉張力
(C)教導產婦食用高纖維食物，以防止便秘
(D)協助產婦儘量臥床，勿下床活動、久站等，避免增加腹內壓

（A）34 有關胎盤之描述，下列何者正確？
(A)由蛻膜（decidua）及絨毛膜（chorion）發育而來
(B)胎兒面外觀粗糙，母體面則較光滑
(C)胎盤厚度在妊娠24 週後即不再增加
(D)成熟的胎盤呈墨藍色

（D）35 下列關於胎心音曲線之敘述，何者最能表示胎兒狀況正常，對壓力的反應良好？
(A)增減速與子宮收縮無關　(B)在子宮收縮時，依然呈現平滑現象
(C)在子宮收縮時，隨之減速　(D)在子宮收縮時，隨之加速

【高考所有 重裝必勝！】

（A）36 有絲分裂後，子細胞將得到：
(A)相同的染色體　(B)二倍的染色體　(C)二分之一的染色體　(D)四分之一的染色體

（B）37 孕婦尋求產前照顧並接受民俗保護措施，是魯賓（Rubin, 1984）所提出孕婦心理發展任務中的那一項？
(A)學習貢獻自己

(B)確保自己與胎兒在妊娠及分娩過程中能安全順利通過
(C)與未來的胎兒連成一體
(D)使重要的家人接受新生兒

（A）38 妊娠期間的鬆弛素（relaxin）主要是由何者所分泌？
(A)黃體 (B)腦下垂體 (C)腎上腺 (D)絨毛膜

（C）39 有關胎兒血循環轉變爲新生兒血循環，下列敘述何者正確？
(A)肺血管阻力增加，致使卵圓孔關閉
(B)臍靜脈回流增加，致使靜脈導管關閉
(C)血氧分壓上升，致使動脈導管收縮關閉
(D)血氧分壓增加，致使全身血管阻力降低

（A）40 三染色體18（Trisomy 18）是第二常見的三染色體疾病，有先天性心臟病、關節異常、耳向下生長、第二及第五指重疊等臨床表徵，此又稱爲何種症候群？
(A)愛德華症候群（Edward syndrome）
(B)克林費特症候群（Klinefelter syndrome）
(C)亨汀頓症候群（Huntington syndrome）
(D)杜普勒症候群（Doppler syndrome）

（D）41 何者不是A 群β型溶血性鏈球菌感染可能的續發性疾病？
(A)風溼熱 (B)多發性關節炎 (C)急性腎絲球性腎炎 (D)嬰兒玫瑰疹

（A）42 有關兒童成長與發展之敘述，下列何者正確？
(A)是持續、依序的，並依循頭尾律及由中心向外發展的原則漸進發展的
(B)許多行爲及特質的發展在敏感期較不受環境的影響
(C)每個個體的成長與達成發展里程碑速率皆差不多
(D)各個身體系統或器官成長的型態與速率相近

（D）43 有關兒童骨髓檢查的敘述，下列何者錯誤？
(A)可作爲白血病確立診斷的重要依據
(B)正常的骨髓中blast cell 只佔5%以下
(C)較大兒童會採取後側腸骨嵴部位做檢查
(D)可作爲疾病是否侵犯腦、脊髓等系統的重要依據

（B）44 有關哮吼之敘述，下列何者正確？
(A)好發於學齡前期兒童
(B)致病原可爲病毒或A 群鏈球菌
(C)臨床三合一症狀爲咳嗽如狗吠聲、聲音嘶啞、吐氣喘鳴音
(D)好發季節爲夏天

（C）45 有關胎便吸入症候群的敘述，下列何者正確？
(A)常見於早產兒
(B)當胎便阻塞於氣管時，應立即使用氧氣袋（ambu bag）加壓，以維持呼吸道通暢
(C)可能導致肺部過度膨脹，甚至造成氣胸
(D)因缺氧會造成呼吸性鹼中毒

（D）46 有關兒科護理人員的角色和功能，下列敘述何者錯誤？
(A)配合國家及兒童福利政策 (B)配合醫療體系之發展
(C)注意兒童疾病型態的改變 (D)提供照護的兒童僅限於15 歲以下

（C）47 依據皮亞傑認知發展理論，下列何者並非「運思前期」的特色？
(A)兒童年齡介於2~7 歲 (B)無法做逆向思考
(C)有體積守恆概念 (D)以自我爲中心觀來推測周遭事物

【版權所有，翻印必究！】

（D）48 3 歲兒童在丹佛II 嬰幼兒發展篩檢測驗時，如果沒有辦法通過下列那一項，需懷疑有發展遲緩的情形？
(A)依示範畫四方形　(B)單腳站立 4 秒　(C)不需協助能自行刷牙　(D)指對身體6 個部位

（C）49 關於兒童的身體評估，下列敘述何者錯誤？
(A)氣喘患童會有哮喘音（wheeze）
(B)急性會厭炎患童會有吸氣喘鳴音（stridor）
(C)支氣管炎患童在呼氣時可聽到囉音（rales）
(D)肺炎患童在吸氣晚期有細爆裂音（fine crackles）

（B）50 下列何者是護理人員檢查4 歲兒童耳朵時的正確方法？
(A)將耳垂往下往後輕拉　(B)將耳垂往上往後輕拉
(C)將耳垂往下往前輕拉　(D)將耳垂往上往前輕拉

（C）51 早產兒會出現apnea 的現象，此現象是指：
(A)心跳停止30 秒以上，合併有呼吸減慢
(B)呼吸停止20 秒以上，且合併心跳過快
(C)呼吸停止15~20 秒，且有心跳減慢、發紺現象
(D)心跳或呼吸停止10~15 秒，但可自行恢復

（B）52 兒童因住院引起分離焦慮及退行性行爲，在那一時期最明顯？
(A)嬰兒期　(B)幼兒期　(C)學齡前期　(D)學齡期

（D）53 護理人員協助2 歲半的幼兒吃藥，下列何項措施最合宜？
(A)給藥前讓幼兒選擇要服藥粉或藥丸　(B)給藥前鼓勵幼兒提出疑問
(C)把藥混入食物中　(D)給藥後給予讚美

（B）54 小綠每次打針後，都很擔心身體內的東西會從針孔流出來，一定要用膠布貼住針孔，請問小綠的年齡層是：
(A)幼兒期　(B)學齡前期　(C)學齡期　(D)青少年期

（C）55 7 歲的大偉因罹患小腦星狀細胞瘤進行手術治療，手術後護理人員發現大偉有吸吮大拇指的行爲，下列何項護理處置是正確的？
(A)告知醫師大偉有吸吮大拇指的行爲　(B)在大偉大拇指上包紗布，以防其吸吮
(C)評估大偉是否有不舒適的情況　(D)告訴大偉吸吮大拇指會讓他的牙齒變醜

（D）56 下列何者是正確執行學齡期兒童大量灌腸時的護理步驟？
(A)準備200 c.c.的清水
(B)請兒童安靜平躺床上後，採右側臥姿勢
(C)將灌腸筒掛於點滴架上，使液面與肛門距離 60 公分
(D)請兒童張口深呼吸，將肛管推入肛門內7.5 公分

（B）57 關於血友病的敘述，下列何者正確？
(A)A 型血友病是體染色體隱性遺傳　(B)A 型血友病是第八凝血因子缺乏
(C)B 型血友病是體染色體顯性遺傳　(D)C 型血友病是第九凝血因子缺乏

（D）58 小芳4 歲，患有β型地中海貧血須定期入院輸血，並需使用排鐵劑（Deferoxamine）治療。小芳具有顱骨變大、塌鼻的外觀是因爲：
(A)軟骨發育不全　(B)骨頭鈣化過早　(C)骨髓受抑制而變形　(D)骨頭髓腔擴大

（B）59 小娟14 歲，因罹患急性淋巴性白血病而住院接受化學治療，小娟告訴護理人員：「我夢見自己死了，好可怕！」，下列何者爲護理人員最恰當的回應？
(A)告知不要胡思亂想，安心接受化學治療，身體就會好起來
(B)鼓勵表達心中害怕的感受，並適時瞭解其對死亡的看法
(C)鼓勵父母陪伴住院並儘可能寸步不離，以減緩分離焦慮

(D)告知死亡是人生必經的道路，不需要過度擔憂、恐懼

（A）60 下列有關急性風溼熱（acute rheumatic fever）之敘述，何者正確？
(A)是一種自限性（self-limiting）疾病，會自行緩解
(B)常侵犯三尖瓣及肺動脈瓣，造成閉合不全
(C)臨床上發現其抗鏈球菌素（ASO）下降
(D)常造成多發性小關節炎及壓痛性結節

（A）61 王小弟1 歲，罹患肺炎，護理人員在協助其引流肺上葉前節的分泌物時，應採用下列何種姿勢？
(A)仰臥，叩擊和震顫鎖骨和乳頭之間的部位
(B)半坐臥成30 度角，叩擊和震顫鎖骨和肩胛骨之間的部位
(C)俯臥，頭放低30 度角，叩擊和震顫脊柱兩側的上背部
(D)俯臥，頭放低45 度角，叩擊和震顫脊柱兩側的上背部

（B）62 王小妹10 歲，罹患白血病，於化學治療期間有噁心與嘔吐情形，下列護理措施何者最合宜？
(A)進餐同時給予服用止吐劑 (B)鼓勵攝取高蛋白及高熱量食物
(C)改用腸胃外輸液補充營養 (D)鼓勵採用含調味料較多的食物

（D）63 有關新生兒髖關節發育不全（development desplasia of the hip）臨床表徵之敘述，下列何者錯誤？
(A)臀部或大腿皮膚皺摺較多的一邊爲患肢
(B)進行歐式徵象（Ortolani’s sign）測試，患側呈陽性
(C)患側的髖關節外展功能受到限制
(D)雙膝屈曲時，兩側的膝部同高

（C）64 王小弟10 個月，每四小時予鼻胃管灌食200 c.c.牛奶，護理人員執行第二次管餵反抽時，若胃中牛奶的餘留量爲25 c.c.，下列處置何者正確？
(A)應將反抽出的牛奶丟棄，而予灌食175 c.c.牛奶
(B)應將反抽出的牛奶丟棄，仍予灌食200 c.c.牛奶
(C)應將反抽出的牛奶推回胃中，而予灌食175 c.c.牛奶
(D)應將反抽出的牛奶推回胃中，仍予灌食200 c.c.牛奶

（C）65 腎病症候群的孩子開始服用Prednisolone 時，可能會發生下列何種現象？
(A)禿頭 (B)食慾不振 (C)容易感染 (D)體重減輕

（C）66 對泌尿道感染患童父母的衛教，下列何者正確？
(A)洗泡沫浴，保持陰部清潔 (B)多喝碳酸飲料，促進排尿
(C)抗生素治療約需兩星期 (D)治療出院後即可痊癒，不需追蹤

（D）67 腦性麻痺患孩由於身體活動功能障礙，容易產生疲憊感，下列那一項敘述不適當？
(A)供給額外熱量，以符合肌肉活動增加的能量需求
(B)設計各種方法和技巧來增進餵食，以獲得充分營養
(C)維持規律的時間表，適當的休息和睡眠，以預防疲勞
(D)無需控制體重，因愈重就愈壯愈有力

（A）68 白血病病童使用Methotrexate（MTX）藥物期間，護理人員應特別注意以下何項？
(A)神經中毒之徵象 (B)監測心跳，以防發生心律不整
(C)監測尿液顏色，以防引起出血性膀胱炎 (D)給予軟便劑，以防便秘

（A）69 15 歲的林強，因爲車禍而失去右小腿，目前住院治療中。今天林強又拒絕進食且不發一語地自己生悶氣，連母親都不理，此時，護理人員最合宜的護理措施爲何？
(A)安慰並支持母親接受林強的情緒

(B)勸導林強不該這麼不孝，讓母親傷心、難過
(C)與母親一起勸導，甚至強迫林強進食，以免營養不良
(D)通知醫師並建議使用藥物，讓林強鎮定下來

（B）70 兒童扁桃腺切除術後24 小時之內的出血徵象，不包括下列何者？
(A)不自主地吞嚥動作 (B)呼吸慢而淺 (C)血壓下降 (D)臉色蒼白，躁動不安

（B）71 先天性右至左分流之心臟缺陷的幼兒，護理人員可以預期會觀察到下列何種現象？
(A)四肢水腫 (B)發紺 (C)端坐呼吸 (D)頸靜脈怒張

（B）72 有關心導管檢查後之護理，下列敘述何者錯誤？
(A)導管插入部位之遠端脈搏的強弱需與另一肢體作對稱性的比較
(B)導管插入部位的肢體應保持彎曲，以利止血
(C)兒童清醒後，可喝些液體
(D)導管穿入部位，須用砂袋加壓

（C）73 下列何者是長期服用甲狀腺激素的毒性反應？
(A)肌肉張力差，皮膚乾燥冰冷而蒼白 (B)臉部毛髮增生
(C)躁動不安、發燒、呼吸困難、痙攣 (D)水腫、尿量減少

（D）74 有關兒童罹患第一型糖尿病的敘述，下列何者正確？
(A)不易發生在學齡期兒童 (B)此病不需完全依賴胰島素治療
(C)疾病早期易侵犯血管導致病變 (D)其症狀比成年型糖尿病症狀更明顯

（A）75 有關兒童顱內壓升高的護理措施，下列何者錯誤？
(A)以Mannitol 靜脈輸入降腦壓時，其滴速越慢越好 (B)避免用力解便及咳嗽
(C)抬高床頭 (D)限制水分攝取

（B）76 有關慢性病兒童及其家庭之護理照顧，下列何者正確？①代替其父母來照顧病童，減輕其負擔 ②協助家屬處理其對疾病的情緒反應 ③確認及評估病童調適行為與能力 ④建立病童及其家庭支持系統
(A)①②③ (B)②③④ (C)①③④ (D)①②④

（D）77 4 歲的小芬為癌症末期病童，父母和護理人員討論是否要告訴其7 歲的哥哥小翰有關小芬將面臨死亡的事實，護理人員的反應以下列何者為宜？
(A)小翰最害怕的是分離，且想知道你們將會關心照顧他，而不會關心妹妹即將會死亡
(B)依小翰的年齡對死亡的意義不會瞭解，所以當小芬死亡發生時再對他說
(C)你們怎麼不和醫生討論，醫生較瞭解你們女兒的預後，可以向小翰解釋
(D)小翰可能不瞭解死亡，但是會害怕死亡，你們可以告訴他關於妹妹疾病的真相，讓他有所準備

（D）78 兒童因脊柱側彎而穿著背架，有關其運動的護理指導，下列何者正確？
(A)不宜做任何運動 (B)鼓勵做仰臥起坐，強化腹背肌肉
(C)鼓勵做大範圍的關節運動，如：跳繩、跳躍 (D)鼓勵做不激烈的運動，如：散步

（C）79 燒傷面積大於30%的病童，為避免其因腸胃道的血流量不足所造成的影響，採取的護理措施，下列何者不恰當？
(A)最好立刻禁食 (B)必要時，插鼻胃管以間歇抽吸法引流胃液
(C)插鼻胃管減壓並灌食 (D)採靜脈補充高營養物質

【版權所有 翻印必究！】

（C）80 關於麻疹（measles）的敘述，下列何者錯誤？
(A)紅疹依序出現於耳後、髮際、前額及上頸部、上肢、軀幹至下肢
(B)科氏斑點在發疹後第2 天才逐漸減輕
(C)病童自出疹後5 天內需採腸胃道隔離
(D)傳染期主要是在前驅期