

《產兒科護理學》

- (B) 1 有關胎兒循環的敘述，下列何者正確？
(A)循環全身之血液均為含氧血
(B)靜脈導管連接臍靜脈到下腔靜脈
(C)下腔靜脈內之血液為缺氧血
(D)左右心室之間有卵圓孔，使血液產生右到左分流
- (D) 2 有關婦嬰護理理念之敘述，下列何者不正確？
(A)懷孕是一種壓力情境，對家庭生活的改變影響深遠
(B)胎兒有權利被健康地生下來
(C)強調父親與母親的照護一樣重要
(D)婦嬰護理以節約醫療成本為目的，優生政策為方針
- (A) 3 下列何者為懷孕診斷之「確定性指標」？
(A)偵測到胎兒心跳 (B)胎頭浮動 (ballottement)
(C)無痛性子宮收縮 (D)妊娠試驗陽性反應
- (B) 4 關於宮縮時胎心率之變化，下列何項最能表示胎兒是健康而且氧氣充足？
(A)胎心率呈不定型減速
(B)宮縮時，胎兒心搏加速
(C)宮縮將結束時，胎兒心搏開始減速
(D)宮縮時，胎兒心搏基準線平直不見變異性
- (D) 5 莊太太抽血檢查，其Hb 為10.4g/dL，此時應建議莊太太採取何種措施？
(A)減少含鈉飲食之攝取 (B)速服鐵劑 (C)多攝食柳丁汁 (D)多攝食深綠色蔬菜
- (B) 6 莊女士懷孕25 週，懷孕前體重適中，此次產前檢查測量得知目前體重較懷孕前增加6 公斤，護理人員對莊女士最適當的建議為：
(A)體重增加太少，建議每日攝取熱量增加500 大卡
(B)體重增加正常，提醒每日攝取熱量應較非孕期時增加300 大卡
(C)體重增加太多，須特別注意限制熱量的攝取
(D)體重增加正常，維持非孕期時熱量的攝取
- (D) 7 陳太太夫妻一起到醫院做產前檢查，陳先生向護理人員說：「我可不可以陪太太一起進去產檢，我想聽聽小孩的胎心音！」此時護理人員的處理，下列何者最合適？
(A)委婉告知不合適，因為病人太多了 (B)委婉告知不合適，因診療室內男人止步
(C)告知有此想法很好！但需等到最後一號 (D)告知有此想法很好！並協助安排
- (B) 8 黃太太懷孕後由於腹部增大愈來愈明顯，她更加確認已懷孕的事實，所以會開始穿孕婦裝，幻想胎兒的長相、性別，也因為身體的不適症狀逐漸減輕，而顯得容光煥發。黃太太此時應處於第幾妊娠期？
(A)第一妊娠期 (B)第二妊娠期 (C)第三妊娠期 (D)第四妊娠期
- (C) 9 希氏法 (Schultze Mechanism) 胎盤娩出的特徵為何？
(A)胎盤的母體面先娩出 (B)出血量較鄧氏法 (Duncan Mechanism) 多
(C)胎盤的光滑面先娩出 (D)胎盤由邊緣先剝離
- (B) 10 產檢時，以雷奧波德氏操作法 (Leopold's Maneuvers) 做四段式腹部觸診，其第幾操作步驟最主要是測胎兒大部 (平滑背部) 及小部，以判斷胎兒相對於子宮的位置？
(A)一 (B)二 (C)三 (D)四

- (C) 11 以下胎頭徑線之排列順序，何者正確？
(A)枕額徑＜枕下前囟徑＜枕額徑 (B)枕下前囟徑＜枕額徑＜枕額徑
(C)枕下前囟徑＜枕額徑＜枕額徑 (D)枕額徑＜枕額徑＜枕下前囟徑
- (B) 12 由於懷孕的胡太太已37 歲，醫師建議其接受羊膜穿刺檢查，其最適宜接受羊膜穿刺檢查之時間為懷孕的第幾週？
(A)9 至11 (B)14 至17 (C)20 至24 (D)24 至28
- (D) 13 ROA 胎產式之胎兒內診時可發現：
(A)前囟門在孕婦恥骨右側 (B)前囟門在孕婦恥骨左側
(C)前囟門在孕婦薦骨右側 (D)前囟門在孕婦薦骨左側
- (C) 14 下列何者是子宮頸擴張最快的時時？
(A)潛伏期 (B)加速期 (C)最大斜率期 (D)減速期
- (D) 15 陳女士待產中使用電子胎心監視器，若有以下何項發現需通知醫師？
(A)基準胎心率為120-130 bpm (B)宮縮時胎心率為130-150 bpm
(C)破水後胎心率為130-140 bpm (D)宮縮間歇時胎心率為170-180 bpm
- (A) 16 李太太G2 P1，子宮頸口開8 公分，完全變薄，護理人員正協助其移位至產檯時，李太太喊著「又開始痛了，好痛喔！」且不自主地用力，此時護理人員最佳的指導措施是下列何者？
(A)請李太太哈氣，待宮縮結束後再移位 (B)請李太太儘量忍耐，保持冷靜
(C)告訴李太太想用力就用力 (D)請李太太不能喊叫以免生下胎兒
- (D) 17 林女士待產中突然破水，同時在胎心率監視器上出現一段變異性減速。依此情況，下列何項措施較合適？
(A)教導林女士開始用力 (B)抬高床頭，降低床尾
(C)調快催產素靜脈滴注速度 (D)內診以檢查臍帶是否脫垂
- (C) 18 以電子監測器監測基準胎心音時，也同時觸診孕婦之橈動脈，其目的為何？
(A)測量孕婦的呼吸 (B)做為胎兒心跳的基準值
(C)鑑別所測得的，確實為胎兒的心跳 (D)病房常規，無特殊意義
- (D) 19 下列有關剖腹產的敘述，何項不正確？
(A)剖腹產是指經由腹壁及子宮切口將胎兒取出的手術
(B)胎兒窘迫是緊急剖腹產的適應症
(C)子宮下段橫式切開法，手術後合併症較少，復原較快
(D)剖腹產後，下一次生產最佳的方式也是採剖腹生產
- (A) 20 有關產後痛（After pain）的敘述，何者正確？
(A)經產婦或多胎婦，因為子宮肌肉張力較鬆弛，收縮不佳，易有產後痛的情形
(B)初產婦子宮肌肉張力較好，子宮經常保持在收縮狀態，所以容易有產後痛的情形
(C)因待產時，腹部過度用力，而有產後痛的情形
(D)胎兒通過產道，造成撕裂傷所引起之疼痛
- (C) 21 有關母乳的保存，下列敘述何者正確？
(A)室溫下，初乳可以保存6-10 小時
(B)室溫下，成熟乳可以保存12-24 小時
(C)母乳置放於4℃以下的冷藏室內，成熟乳可以存放5 天
(D)母乳置放於0℃的冷凍層內，至多可保存2 個月
- (A) 22 王太太產後第一天，護理人員評估其血液檢查結果，下列何者為正常的產後生理變化？
(A)白血球上升至25000-30000/mm³ (B)血紅素上升至15g/Dl
(C)血小板下降 (D)血比容上升

- (B) 23 李太太自然生產，產後4 小時自行下床解小便，在廁所時拉紅燈通知護理人員，主訴突然眼前發黑、頭暈、心跳加快、有快要昏倒的感覺。最可能引起此種情況的原因為：
(A)產後大出血 (B)姿勢性低血壓 (C)低血糖 (D)電解質不平衡
- (A) 24 下列有關產後婦女子宮復舊的敘述，何者不正確？
(A)是婦女生理上之進行性變化 (Progressive change)
(B)是子宮細胞體積逐漸縮小所致
(C)產後3-4 天是整個復舊過程變化最快的一段時間
(D)整個胎盤剝離部位之復舊過程約需6 星期
- (B) 25 護理人員進行新生兒Moro reflex 測試時，會有那項預期反應？
(A)新生兒的身體屈曲伸展，大腳趾往內壓，其他四指往外張
(B)新生兒肢體呈現伸展與外展後，接著呈現屈曲與內收好像擁抱狀
(C)新生兒緊抓住檢驗者的手指握住不放
(D)新生兒會將頭轉向刺激源，打開嘴巴並尋找刺激源
- (A) 26 下列那種情況的產婦在產後發生子宮收縮不全的機會較低？
(A)初產婦 (B)產程延長 (C)羊水過多 (D)產程過快
- (D) 27 有關過期妊娠新生兒的敘述，下列何者正確？
(A)難以餵食 (B)全身覆蓋胎脂 (C)容易血糖過低 (D)皮膚有脫皮現象
- (A) 28 在產婦產後之生理變化中，何者是因催產素 (Oxytocin) 作用所產生？①產後子宮收縮 ②排乳反射 (Let-Down Reflex) ③乳汁形成 ④乳管增殖生長
(A)①② (B)②③ (C)③④ (D)①③
- (B) 29 過渡期新生兒出現心跳及呼吸速率變化大、腸蠕動增加及可能解胎便之現象，大約是發生在出生後的：
(A)15-30 分鐘 (B)2-6 小時 (C)8-12 小時 (D)16 小時
- (D) 30 新生兒出生後在嬰兒房做新生兒護理時，護理人員為其測量體溫是測量肛溫，其主要理由是下列何者？
(A)肛溫比較精準 (B)肛溫比較方便 (C)刺激新生兒排便 (D)觀察有無肛門
- (B) 31 有關新生兒的頭血腫，下列敘述何者不正確？
(A)常見於頭產式嬰兒 (B)會越過縫合線 (C)常造成新生兒膽紅素升高 (D)通常不需治療
- 情況：王太太剖腹生產，產下一名健康的男嬰，王太太在產後被診斷為股部血栓靜脈炎。請回答第32~34題。
- (C) 32 針對股部血栓靜脈炎，護理人員的護理計畫不可包括下列何者？
(A)臥床休息 (B)抬高患肢
(C)按摩患部 (D)避免久站、久坐或雙腿交叉的姿勢
- (C) 33 若王太太由股部血栓靜脈炎發展為肺栓塞，其症狀不包括下列何者？
(A)呼吸困難 (B)咳嗽 (C)心搏減速 (D)肋膜痛
- (A) 34 發現王太太有肺栓塞時，應立即給予的護理措施為下列何者？
(A)給予氧流量 8-10 公升/分鐘的氧氣面罩 (B)降低床頭30 至40 度
(C)給予靜脈輸注protamine sulfate (D)給予冰敷
- (D) 35 下列有關於孕婦得到急性水痘的敘述，何者不正確？
(A)血液中IgM 濃度可能會升高
(B)如果產婦感染水痘後立即生產，則新生兒可能會有瀰漫性水痘症狀
(C)如果有早產跡象，最好能安胎一週以上等到母體產生抗體，經由胎盤傳給胎兒，可以減少胎兒水痘症狀
(D)如果孕婦在懷孕初期得到水痘，不會造成畸胎

- (B) 36 早期產後出血最常見的原因為下列何者？
(A)子宮破裂 (B)子宮張力不全 (C)生殖道裂傷 (D)瀰漫性血管內凝血
- (C) 37 王太太45 歲，單一性伴侶，今年其人類乳突狀病毒核酸檢查為陰性反應，且連續三年子宮頸抹片檢查皆正常，那她應：
(A)永不需再接受抹片檢查 (B)二年接受抹片檢查乙次
(C)明年再接受抹片檢查 (D)維持半年定期接受抹片檢查
- (B) 38 有關念珠菌所引起的女陰部及陰道感染疾病的敘述，下列何者正確？
(A)停經後婦女的發生率較高 (B)不視為一種性傳染疾病
(C)性伴侶數會影響感染率 (D)陰道pH 值會高於4.5
- (D) 39 有關婦女基礎體溫 (BBT) 的敘述，下列何項正確？
(A)BBT 的變化介於 36.2°C ~ 36.4°C 之間，稱為雙峰現象
(B)雙峰現象之BBT，其最低溫是因progesterone 的濃度達到最高峰
(C)雙峰現象之BBT，其最低溫是因estrogen 的濃度達到最高峰
(D)BBT 的變化可判斷排卵的發生
- (C) 40 有關減胎的敘述，下列何者錯誤？
(A)因超音波檢查技術精進及經驗的累積，減胎後的流產率已下降
(B)減胎後，可能會有破水、流產、感染與瀰漫性血管內凝血等合併症
(C)減胎後，留下胚胎數越少者，其減胎後的流產率越高
(D)原有胚胎數越多者，其減胎後的流產率越高
- (D) 41 2003 年公布之「兒童及少年福利法」，其適用之年齡範圍為：
(A)未滿12 歲 (B)未滿15 歲 (C)未滿16 歲 (D)未滿18 歲
- (A) 42 12 到15 個月兒童的動作發展，最主要的特徵為何？
(A)走路很穩 (B)走上樓梯 (C)會使用湯匙 (D)會疊四塊方形積木
- (C) 43 兒童鉛中毒會影響身體各器官之功能，但以那三個身體系統功能受損最為嚴重？
(A)血液、循環及神經系統 (B)呼吸、腎臟及循環系統
(C)血液、腎臟及神經系統 (D)呼吸、循環及神經系統
- (B) 44 為各年齡層兒童進行身體檢查與評估，下列敘述何者錯誤？
(A)檢查嬰兒生命徵象的順序是呼吸、脈搏、血壓或體溫
(B)幼兒期發展自主感，檢查前應讓他選擇檢查之順序
(C)學齡前期兒童非常害怕身體受到傷害，應避免量肛溫
(D)學齡期兒童接受檢查前應先給予解釋讓其有操控的機會
- (C) 45 新生兒血液中維生素K 值較低，會導致下列何種情況？
(A)膽紅素 (bilirubin) 增加 (B)血紅素 (hemoglobin) 減少
(C)凝血酶原時間 (prothrombin time) 延長 (D)血小板 (platelet) 減少
- (D) 46 下列何項不是新生兒壞死性腸炎的早期臨床表徵？
(A)呼吸窘迫 (B)腹脹 (C)血便 (D)痙攣
- (C) 47 曉君目前一歲半，媽媽帶她來打疫苗，如果曉君從出生開始都有按時接種疫苗，這次她應該接種的是：
(A)麻疹疫苗第一劑 (B)麻疹、腮腺炎、德國麻疹混和疫苗
(C)白喉、百日咳、破傷風混和疫苗
(D)卡介苗追加
- (A) 48 造成新生兒呼吸窘迫症候群 (Respiratory Distress Syndrome; RDS) 的最主要因素是：
(A)早產 (B)產前窒息 (C)產前出血 (D)剖腹產

- (B) 49 曉華五歲，罹患第 I 型糖尿病，於住院期間的護理措施，下列何者正確？
(A)無需向曉華做任何解釋及說明，完全由父母負責照顧
(B)以遊戲方式協助曉華辨識低血糖症狀
(C)運用同儕團體，協助曉華自我照顧
(D)教導曉華自我監測血糖及注射藥物
- (D) 50 小明五歲，因肺炎住院，小明認為是自己不乖才要住院接受各種檢查與治療。護理人員之回答，下列何者最合宜？
(A)下次要聽大人的話，就不會生病住院
(B)護士阿姨的技術都很好，打針又不會痛，不要怕
(C)你只要聽話，很快就可以回家
(D)住院做檢查或治療是要幫你快點好起來，不是你不乖，也不是處罰你
- (B) 51 陳小妹因罹患開放性肺結核入院接受治療，有關其病房的隔離措施，下列敘述何者錯誤？
(A)進入病房的人皆需要戴口罩 (B)進入病房的人皆需要穿隔離衣
(C)接觸陳小妹的人皆需洗手 (D)需安排單獨的隔離室
- (C) 52 四歲兒童對死亡的了解，不包括下列何者？
(A)死亡像是在睡覺 (B)死亡是暫時性的身體功能不良
(C)死亡是不可回復的 (D)死亡是一種處罰
- (B) 53 小芬10 歲，罹患腦瘤已是末期，對於瀕死兒童的照顧，下列何者錯誤？
(A)引導病童說出其對死亡的觀感及害怕
(B)為避免鴉片類止痛劑使用過多造成呼吸抑制，疼痛時可交替給安慰劑
(C)尊重瀕死兒童的個人信念及信仰
(D)接受患童面對死亡時所表現之憤怒與攻擊行為
- (C) 54 有關手足口症（hand-foot-mouth disease）的描述，下列何者正確？
(A)常見的致病原為伊科病毒（echo viruses） (B)年紀越大發病率越高
(C)病童會因口腔水泡無法進食 (D)四肢的水泡，通常腳比手多
- (B) 55 青春期癌症兒童接受化學藥物治療時，下列何項副作用最影響其身體心像？
(A)體重減輕 (B)禿髮 (C)身高成長緩慢 (D)短暫時期的麻痺
- (D) 56 人類免疫缺乏病毒（human immunodeficiency virus, HIV）呈陽性反應，且已有嚴重免疫抑制症狀的兒童，可按時接種下列何項預防注射？
(A)卡介苗（BCG） (B)麻疹、德國麻疹、腮腺炎三合一疫苗（MMR）
(C)口服小兒麻痺沙賓疫苗（OPV） (D)B 型肝炎疫苗（HBV）
- (B) 57 有關氣喘之敘述，下列何者正確？
(A)80%氣喘發作年齡在5 歲以後 (B)台灣兒童最常見的過敏原是家塵中的極
(C)尖峰呼氣流量值小於60%的預估值，即處於黃燈區 (D)臨床表徵為吸氣時有喘鳴聲
- (D) 58 有關以茶鹼（Theophylline）治療氣喘的敘述，下列何者錯誤？
(A)茶鹼的主要作用是擴張支氣管及鬆弛支氣管平滑肌
(B)茶鹼的安全治療範圍很窄，血清濃度大於20μg/ml 即出現中毒現象
(C)對已使用吸入性類固醇者，有非常顯著的加成作用
(D)高蛋白、低醣飲食會使茶鹼的代謝變慢
- (B) 59 小威是一個18 歲罹患第 I 型糖尿病的青少年，當他打籃球時出現頭暈、皮膚濕冷、心跳加速情形，應立刻採取什麼行動？
(A)趕快打電話給父母來處理 (B)趕快吃巧克力或喝可樂、果汁
(C)立刻注射短效胰島素 (D)到旁邊休息，直到症狀緩解

- (C) 60 下列那一項是嬰幼兒容易造成中耳炎的原因？
(A)用鼻子呼吸 (B)喉部的淋巴組織豐富
(C)歐氏管較成人短、直，且呈水平位置 (D)因為喉頭在頸部較高處
- (B) 61 林小弟因為罹患急性淋巴性白血病（Acute lymphocytic leukemia），經常在學校出現鼻出血情形，此時最適當的處理是：
(A)儘快送醫進行血小板輸液
(B)可先嘗試在鼻部加壓止血或冰敷
(C)限制患童上學，鼓勵患童多休息
(D)因為治療會造成血小板低下，因此出血為正常現象，不必特別處理
- (C) 62 胎兒出生後，心臟血管會有變化，下列何者正確？
(A)右心房、心室和肺動脈壓力上升 (B)主動脈壓力下降
(C)臍靜脈閉合形成肝圓韌帶 (D)動脈導管內氧濃度下降
- (A) 63 毛地黃的中毒症狀為何？
(A)心跳減緩、厭食、噁心及嘔吐
(B)心跳減緩、肌肉無力及痙攣
(C)心跳過速、厭食、噁心及嘔吐
(D)心跳過速、肌肉無力及痙攣
- (D) 64 有關病童接受心導管檢查之護理措施，下列何者正確？①檢查前應禁食4-6 小時 ②檢查後應注意觀察與測量脈搏、血壓、膚色及其他生命徵象 ③穿刺肢體維持彎曲，以便加壓 ④檢查後應密切觀察穿刺部位是否有出血之現象
(A)①②③ (B)②③④ (C)①③④ (D)①②④
- (C) 65 有關 β 型海洋性貧血的敘述，下列何者錯誤？
(A) β 型海洋性貧血是 β 鏈的數量不足
(B)在母親懷孕初期可做絨毛膜穿刺檢查以確立診斷
(C)為體染色體顯性遺傳
(D)目前較有效的治療方法是骨髓移植
- (B) 66 血友病的病童常發生關節內積血，而出現關節僵硬或疼痛的問題，下列相關敘述何者正確？
(A)為避免關節變形產生血腫，所以應嚴格限制患童平日的活動
(B)關節出血急性期時，為避免關節不適及腫脹，應維持患肢固定不動
(C)若疼痛持續不止，應依醫囑給予水楊酸類（Aspirin）止痛劑
(D)關節血腫最常見於下肢之踝關節
- (A) 67 長期使用類固醇藥物治療之青春兒童可能會出現庫欣氏徵象（Cushing's syndrome）。護理師在評估此兒童時會發現下列何狀況？
(A)軀幹肥胖但肢體纖瘦 (B)臉浮腫而身體生長細長
(C)頭髮和體髮脫落 (D)臉色蒼白、眼神呆滯
- (D) 68 下列何者不是台灣「新生兒先天性代謝異常篩檢」的項目？
(A)苯酮尿症 (B)G-6-PD 缺乏症 (C)高胱氨酸尿症 (D)先天性免疫機能不全症
- (C) 69 有關膽道閉鎖的敘述中，下列何者錯誤？
(A)肝外膽管阻塞的病嬰，最好在2 個月大之前，進行手術治療
(B)接受肝管腸道切開術治療，最常見的合併症是膽管炎
(C)若解出的大便是灰白色，表示手術很成功
(D)若不接受手術治療，會造成肝臟永久性損傷

- (D) 70 有關嬰兒腹股溝疝氣之敘述，下列何者錯誤？
(A)腹股溝疝氣在嬰兒用力哭泣時最容易被發現
(B)男嬰發生的原因是腹膜鞘狀突閉合不全，以致腹內腸道進入陰囊中
(C)女嬰發生的原因是圓韌帶周圍組織薄弱，且腹壓增加，導致腹腔的腸道突出於腹股溝
(D)腹股溝疝氣是胚胎發育的正常現象
- (C) 71 有關急性腎絲球性腎炎的臨床檢驗，下列何者錯誤？
(A)血紅素下降 (B)尿素氮 (BUN) 與肌胺酸酐 (creatinine) 上升
(C)尿比重減少 (D)蛋白尿
- (B) 72 有關泌尿道感染的敘述，下列何者錯誤？
(A)大腸桿菌是主要致病菌 (B)腰窩部疼痛是下泌尿道感染的症狀
(C)不要喝碳酸類飲料，以防膀胱黏膜受到刺激 (D)可給予小紅莓汁，以酸化尿液
- (C) 73 王小弟，15 個月大，被診斷為單純性熱性痙攣，下列敘述何者正確？
(A)王小弟的痙攣會導致神經的永久性損害
(B)單純性熱性痙攣的特色是四肢呈現不對稱的強直攣縮
(C)誘發痙攣的因素是體溫的急劇上升
(D)王小弟的痙攣會持續1 小時到數小時
- (A) 74 有關裘馨氏假肥大性肌失養症 (Duchenne's pseudohypertrophic muscular dystrophy) 患童的護理措施，下列敘述何者正確？
(A)加強胸腔物理治療，以防呼吸道感染
(B)給予低渣飲食以防腹瀉
(C)告知父母，只要按時做物理治療此症是可治癒的
(D)應限制活動，以保持體力
- (C) 75 請由以下數據計算及評估病童的絕對嗜中性白血球 (Absolute Neutrophil Count; ANC) 的狀態： $WBC 6 \times 10^3/mm^3$ ；Neutrophils 50%；Bands 5%；Eosinophils 1%；Basophils 1%；Lymphocytes 35%；Monocytes 8%
(A)病童的ANC 為900/ mm^3 ，有neutropenia 的危險
(B)病童的ANC 為2100/ mm^3 ，有neutropenia 的危險
(C)病童的ANC 為3300/ mm^3 ，沒有neutropenia 的危險
(D)病童的ANC 為3600/ mm^3 ，沒有neutropenia 的危險
- (A) 76 白血病患童接受化學治療時，會服用Bactrim，請問此藥主要目的為何？
(A)預防卡氏肺囊蟲肺炎 (pneumocystis carinii pneumonia)
(B)促進尿酸排出
(C)預防出血性膀胱炎
(D)促進血球增生
- (C) 77 協助吞嚥能力較差之腦性麻痺兒童進食，宜將其頭部維持正中位置，並儘量將食物置於何部位？
(A)舌頭前方 (B)舌頭正中央 (C)舌頭後方 (D)舌頭側邊
- (A) 78 一位妥瑞氏症候群 (Tourette's syndrome) 的學童，在上課中出現重複性的扮鬼臉、聳肩、清喉嚨的動作，老師不知如何處理，下列何者為適當的照護建議？
(A)解釋此種行為的成因，請老師不要理會這些行為
(B)教導學童做有效的咳嗽
(C)教導學童深呼吸等放鬆技巧
(D)給此學童一隔離的安靜環境

- (C) 79 有關先天性髖關節脫位 (congenital dislocation of the hip) 的臨床表徵，下列敘述何者錯誤？
- (A) 不對稱的大腿或臀皺褶
 - (B) 患肢單腳站立時，健肢髖部由正常的高度向下傾斜
 - (C) 彎腰時背部呈現明顯的突峰
 - (D) 以手施壓於髖部，可感覺到股骨頭於髖臼關節囊中滑動
- (B) 80 注意力缺損過動症 (attention deficit hyperactivity disorder) 的學童，關於其學習環境安排，下列敘述何者最適當？
- (A) 寫功課前儘量給予學童口頭指示
 - (B) 安排學童在固定地點完成家庭作業
 - (C) 學童上課的位置儘量靠近窗戶和走廊
 - (D) 學習的內容不要事先安排，以維持彈性

點
■
建
國

【版權所有，重製必究！】