

《產兒科護理學》

情況：陳太太G1 P0，因胎兒臀產式，於早上9點採半身麻醉以剖腹產方式取出一體重3350gm男嬰，Apgar score 8'→9'，陳太太現腹部傷口外觀乾淨，子宮收縮硬，宮底臍平，因疼痛難耐要求採用病人自我調控止痛法（Patient Controlled Analgesia; PCA）後，於11點返回病房休息。請回答第1~3題。

- (C) 1 陳太太返室後，一直抱怨腹部疼痛，護理人員發現陳太太子宮底高度在肚臍的水平位置，1小時內PCA已按壓8次，此時最適當的護理措施為：
- (A)教導陳太太按壓PCA方法，解釋按壓次數越多麻醉止痛效果才會顯現
 (B)告知陳太太：「你對止痛劑的反應不佳，我去請麻醉醫師幫你調整劑量。」
 (C)檢查宮縮狀況，解釋此為產後子宮收縮痛，教導呼吸法以轉移注意力
 (D)安慰陳太太，這是剖腹產後常見的現象，忍一忍就會過去了
- (C) 2 護理人員指導陳太太需平躺至下午5點，其主要的理由是：
- (A)護理常規規定 (B)手術消耗體力太多，需強制休息
 (C)避免麻醉穿刺部位之腦脊髓液滲漏 (D)避免下腔靜脈受壓，下肢回流受阻
- (C) 3 陳太太下午5點後開始執行母嬰同室，男嬰在床邊哭的很大聲，下列何項陳太太的反應顯示她對哺餵母乳的認知正確？
- (A)讓孩子繼續哭，孩子哭累就會停了 (B)下床將孩子抱起來搖一搖，按撫一下
 (C)側躺在床上，以臥姿餵奶 (D)通知護理人員，將孩子送回嬰兒室
- (C) 4 下列何者不是產後早期給予新生兒吸吮母乳之目的？
- (A)刺激母乳的分泌 (B)促使新生兒膽紅素的排出
 (C)預防新生兒生理性體重減輕 (D)促進親子依附關係
- (C) 5 王太太妊娠30週，住院安胎中，醫囑給予Decadron 8mg 肌肉注射，此目的為何？
- (A)減少子宮收縮 (B)降低血壓
 (C)降低早產兒發生呼吸窘迫症候群 (D)降低早產兒有感染的危險
- (D) 6 妊娠時檢查母血之紅血球平均體積（MCV），若低於80fL，需進一步檢查父親的血液，這主要是要判定何種疾病？
- (A)黏多醣症 (B)葡萄糖-6-磷酸鹽去氫酶（G-6-PD）缺乏症 (C)血友病 (D)海洋性貧血
- (A) 7 胎兒因動脈血氧濃度較成人為少，正常情況下會產生下列何種代償反應？
- (A)增加心跳次數 (B)減少胎兒血紅素攜帶的氧量 (C)減少心輸出量 (D)增加活動量
- (B) 8 有關孕婦在孕期的全身性變化，下列何者錯誤？
- (A)心輸出量增加25-50% (B)血漿蛋白質增加
 (C)腎絲球體過濾率增加 (D)潮氣容積增加30-50%
- (B) 9 黃太太，懷孕31週，因感到胎動次數減少，經醫師評估須做無壓力試驗（Nonstress test）。該試驗之主要目的為：
- (A)測量宮縮時，胎兒活動之情形 (B)測量胎動時，胎心率之變化
 (C)測量宮縮時，胎心率之變化 (D)藉催產素注射以測量胎動之情形及胎兒發育
- (A) 10 有關護理人員執行倫理決策的敘述，下列何者較不適當？
- (A)對於別人無法接受時，應再努力收集資料說服，直到對方認同
 (B)記住胎兒的安全是護理人員的職責
 (C)瞭解護理專業倫理
 (D)認識自己的價值觀

- (A) 11 黃女士今年 33 歲，今天第一次來不孕症特別門診就診。醫師建議黃女士測量基礎體溫 (BBT)，下列護理指導何者正確？
(A)先購買一支刻度間距為 0.05°C 之婦女基礎體溫計
(B)於月經乾淨時，開始測量，並記錄在月經週期的第一天
(C)每天睡前先將基礎體溫計之水銀甩至 36°C 以下之位置，並立即含於舌下5 分鐘
(D)測量基礎體溫，至少要半個月
- (C) 12 懷孕期合併子宮肌瘤，最不可能造成的影響為下列何者？
(A)子宮早期收縮 (B)胎位不正與難產 (C)胎兒先天性代謝異常 (D)胎盤早期剝離
- (C) 13 有關人類乳突狀病毒核酸檢測 (HPV DNA testing) 之敘述，下列何者正確？
(A)其檢測是以血液為檢體
(B)約80%陽性反應者，三年內會被診斷出子宮頸癌
(C)陽性反應者，需每年接受子宮頸抹片檢查
(D)性行為不是感染人類乳突狀病毒唯一途徑
- (A) 14 有關刺激排卵可能會併發卵巢過度刺激症候群 (ovarian hyperstimulation syndrome; OHSS) 之敘述，下列何者正確？
(A)症狀會因月經到來或懷孕而獲得緩解 (B)肌肉酸痛、熱潮紅、乳房不適為其典型症狀
(C)使用hCG 製劑較易引起卵巢過度刺激 (D)嚴重症狀者為下腹部悶痛、食慾不佳
- (D) 15 林太太詢問母親與胎兒ABO 血型不合是發生在什麼情況，護理人員的正確回答為下列何者？
(A)AB 型母親懷O 型胎兒 (B)A 型母親懷O 型胎兒
(C)B 型母親懷O 型胎兒 (D)O 型母親懷A 型胎兒或B 型胎兒
- (A) 16 感染梅毒之孕婦在懷孕幾個月前給予完全的治療，胎兒可以避免感染先天性梅毒？
(A)4 個月 (B)5 個月 (C)6 個月 (D)7 個月
- (A) 17 白太太因有早產的徵象而給予Ritodrine (Yutopar) 安胎，有關使用Ritodrine (Yutopar) 之敘述，下列何者錯誤？
(A)Yutopar 的作用主要在活化有 β_1 接受器的平滑肌
(B)Yutopar 可鬆弛子宮肌肉，抑制子宮收縮
(C)心跳過速、低血壓為Yutopar 的副作用
(D)使用此藥物應經常監測心跳速率
- (B) 18 頭產式待產婦已破水，發現羊水呈現綠色，此時立即之護理措施不包括下列那一項？
(A)使用胎兒監視器 (B)測量待產婦血壓 (C)通知醫師 (D)評估胎心率
- (B) 19 目前已知可能發生瀰漫性血管內凝血病變 (DIC) 的個案包括下列何者：前置胎盤 胎死腹中 子宮外孕 胎盤早期剝離 羊水栓塞 過期流產
(A) (B) (C) (D)
- (D) 20 李太太懷孕31 週，突然發生腹痛合併陰道出血，最可能是下列那一種情況？
(A)先兆性流產 (B)妊娠誘發性高血壓 (C)前置胎盤 (D)胎盤早期剝離
- (C) 21 護理人員測得新生兒的體溫、心跳及呼吸如下，何者為異常？
(A)活動睡眠期，肛溫 36.8°C 、156 次/min、56 次/min
(B)安靜睡眠期，肛溫 37°C 、120 次/min、46 次/min
(C)哭泣的時候，肛溫 36.8°C 、100 次/min、40 次/min
(D)哭泣的時候，肛溫 37.6°C 、174 次/min、40 次/min
- (A) 22 在未接受新生兒篩檢前，新生兒執行臍帶護理時避免使用優碘，這是擔心會影響下列何種項目的檢測結果？
(A)甲狀腺功能低下 (B)甲狀腺機能亢進 (C)苯酮尿症 (D)高胱胺酸血症

- (A) 23 陳小弟，32 週，產後為其做新生兒護理時，可發現他有下列何種情形？
(A)全身覆蓋著胎毛 (B)足底佈滿皺褶 (C)耳朵厚無軟骨 (D)四肢屈曲
- (D) 24 陳太太聽說哺乳期間會自然避孕，她向妳求證，最適當的回答是：
(A)因為分泌乳汁會抑制排卵，所以妳不需要擔心懷孕
(B)月經可能4-5 週後會來，只要妳的月經還沒來，就不需要擔心懷孕
(C)在月經還沒有來以前，最好不要有任何性交發生
(D)最好採用一些避孕方法避孕，因為雖然沒有月經，仍有可能排卵
- (C) 25 王太太第一胎，哺餵母乳，她一直擔心不知道寶寶吃的飽不飽，詢問護理人員。下列何種徵象最可能顯示嬰兒並沒有吃飽？
(A)平均每2-4 小時餵食一次
(B)一天解尿 6-8 次
(C)每次吸吮5 分鐘後，寶寶就睡著了，但不足一小時又哭鬧
(D)體重一個月約增加0.5 公斤
- (B) 26 下列何者為產後子宮復舊的生理機轉？
(A)肌細胞的數目減少 (B)肌肉細胞產生自體溶解 (Autolysis) 的現象
(C)血中動情素 (Estrogen) 濃度上升 (D)血中黃體素 (Progesterone) 之濃度不變
- (C) 27 下列那一項產後運動，不適合有腹直肌分離現象的產婦執行？
(A)呼吸運動 (B)腹部緊縮運動 (C)骨盆搖擺運動 (D)腿部運動
- (B) 28 王太太剖腹產後因擔心傷口疼痛而不願下床活動，此時護理人員最合宜的護理措施為下列何者？
(A)疼痛為主觀感受，應尊重個人意願
(B)了解產婦擔心的內容，解釋並協助採漸進式活動
(C)警告不活動的潛在威脅，由產婦自己決定
(D)請醫師開止痛劑，待24 小時後再處理
- (C) 29 無腦兒常有過期分娩的現象，這可能和下列何者有關？
(A)動情素增加 (B)黃體素下降 (C)胎兒腎上腺皮質素不足 (D)前列腺增加
- (D) 30 下列何者不是待產時合宜的冷熱敷運用？
(A)沖溫水澡可促進舒適
(B)濕冷毛巾有助緩解肌肉痙攣
(C)骶骨區之疼痛緩解均可使用熱水袋或冰袋
(D)為增強皮膚感受性冷熱敷應使用1.5 小時以上
- (A) 31 王太太G1 P0，懷孕38 週，今因規則陣痛而入院待產，產科檢查結果為：子宮頸口擴張3 公分，變薄程度 60%，高度 0，羊膜完整。以胎心音監測器所測得胎心率約為150 次/分，基準線的變異性在6 至10 次/分。下列護理人員的判斷何者正確？
(A)胎兒神經系統發育良好 (B)胎頭過度受壓結果
(C)胎兒處在缺氧狀態 (D)胎兒可能體重過輕
- (B) 32 當醫師為待產婦執行人工破水時，下列何者為護理人員首要的措施？
(A)協助醫師執行技術 (B)監測胎兒心跳速率
(C)教導憋氣較易操作 (D)告訴待產婦執行過程
- (C) 33 妊娠高血壓婦女於胎盤娩出後，為預防產後出血，可自靜脈滴注何項藥物？
(A) methergin (B) dexamethasone (C) pitocin (D) yutopar
- (B) 34 以下何項胎兒移動的步驟常見於子宮頸口全開後？
(A)屈曲 (flexion) (B)伸展 (extension)
(C)固定 (engagement) (D)下降 (descent)

- (B) 35 李太太G1 P0，採硬膜外阻斷麻醉法行無痛分娩，下列關於護理人員的措施，何者正確？
(A)術後需平躺6至8小時 (B)維持足夠靜脈輸液，以預防低血壓
(C)限制液體攝入，以減輕頭痛現象 (D)協助下床走路，以促進產程進展
- (C) 36 有孕婦問護理人員：「羊水的作用是在做什麼呢？」護理人員最佳的回答應該是：
(A)幫助胎兒能吸收到由胎盤來的營養 (B)保護胎兒的皮膚
(C)維持胎兒的體溫 (D)提供給胎兒營養
- (D) 37 谷女士懷孕38週，來院做骨盆腔評估，當她檢查完坐起時向護士抱怨突然頭很暈、想吐，請問護士應最優先採取何項措施？
(A)立刻通知醫師處理 (B)量她的胎心音
(C)請其站立並做搖擺運動 (D)請她躺下並深呼吸
- (C) 38 胎兒的肺臟何時開始製造表面張力素 (surfactant)？
(A)第16週 (B)第20週 (C)第24週 (D)第30週
- (D) 39 關於孕期熱量消耗的敘述，下列何者正確？
(A)孕期熱量需求是平均分配於三孕期 (B)第一孕期胎兒消耗最多熱量
(C)第二孕期熱量主要消耗於胎盤的生長 (D)第三孕期熱量之消耗主要為胎兒的生長
- (D) 40 林太太向護理人員抱怨小孩在她的肚子裡動得好厲害，而且很不舒服，甚至會影響她的睡眠，此時護理人員的回答以下列何者最不合適？
(A)一般的媽媽常會有這個情形
(B)妳可以嘗試更換姿勢減少不適
(C)妳可以試試用手掌輕輕按摩腹部胎動的地方，並試著和小孩說說話
(D)胎動會影響睡眠，那是有些異常，我拿安眠藥給你吃
- (B) 41 根據行政院衛生署2004年與兒童及青少年有關的統計資料，下列敘述何者正確？
(A)1~14歲兒童以跌落為事故傷害的主因
(B)1~14歲兒童的死因中，占第一位的是事故傷害
(C)自殺是青少年死亡原因中的第一位
(D)男性青少年企圖自殺行為的比率較女性高3倍
- (A) 42 下列何者不是新生兒敗血症之診斷標準？
(A)白血球計數 (WBC) $>5000/\text{mm}^3$
(B)不成熟白血球與嗜中性白血球比 (I/TN) ≥ 0.2
(C)C反應性蛋白質 (CRP) $>5 \text{ mm}$
(D)肝蛋白 (hepatoglobin) $>200 \text{ mg/dL}$
- (C) 43 小傑，10歲，正處在癌症末期階段，經常會主動向護理人員提到他即將死亡之事，此時護理人員最合宜之措施為何？
(A)告訴小傑：「別想太多，不會死的！」 (B)向小傑解釋死亡的現象
(C)鼓勵小傑說出他對死亡的看法與感覺 (D)安排小傑會晤其他的瀕死病人，一起討論
- (C) 44 有關嬰兒的成長與發展，下列何者錯誤？
(A)一般頭頸的肌肉比軀幹及四肢先成熟
(B)頭佔身體長度的四分之一
(C)行為與認知的發展是由生物遺傳基因所塑造
(D)早期的反射與後期的動作發展有密切之關聯性
- (A) 45 癌症病童接受下列何種化學藥物治療後，可能會引發出血性膀胱炎？
(A) Endoxan (Cytosan) (B) Vincristine (Oncovin)
(C) Allopurinol (D) Mercaptopurine (6-MP)

- (A) 46 王小妹10 歲罹患白血病，於化學治療期間持續發燒，且絕對嗜中性白血球數目（Absolute Neutrophil Count, ANC）低於500/mm³ 時，可能會導致下列那些問題？
(A)感染、全身虛弱、脫水及抽搐
(B)全身虛弱、水腫、抽搐及呼吸困難
(C)便秘、水腫、瘀斑及血尿
(D)瘀斑、呼吸困難、血尿及感染
- (B) 47 骨折後，血液學檢查值可能會有一些改變，但不包括下列那一項？
(A)血紅素（Hb）下降 (B)乳酸脫氫酶（LDH）下降
(C)血清中肌酸酐（Creatinine）上升 (D)鹼性磷酸酶（alkaline phosphatase）上升
- (A) 48 陳小妹右股骨上石膏，護理人員發現有下列那些情況時，需立即通知醫師處理？
(A)肢體麻痺 (B)皮膚冰涼 (C)肢體腫脹 (D)皮膚搔癢
- (D) 49 有關兒童顱內出血的敘述，下列何者錯誤？
(A)顱內出血嚴重時會有意識改變，呈現昏迷、心跳停止、瞳孔放大，甚至死亡
(B)兒童顱內出血的後遺症包括腦性麻痺、肢體偏癱、視力受損、動作發展遲緩等
(C)若將嬰兒拋向空中，可能會造成其硬腦膜下腔出血
(D)嬰兒搖晃症候群的顱內出血，主要為顱骨骨膜下出血
- (A) 50 有關細菌性腦膜炎（Bacterial meningitis）與無菌性腦膜炎（Aseptic meningitis）病童的腦脊髓液（CSF）的敘述，下列何者正確？
(A)細菌性腦膜炎葡萄糖減少，無菌性腦膜炎葡萄糖接近正常
(B)細菌性腦膜炎蛋白質減少，無菌性腦膜炎蛋白質接近正常
(C)細菌性腦膜炎外觀清澈，無菌性腦膜炎較混濁
(D)細菌性腦膜炎壓力降低，無菌性腦膜炎壓力增高
- (D) 51 有關腎病症候群之敘述，下列何者錯誤？
(A)因腎小球基底膜發生變化，通透性增加，蛋白質流失 (B)全身水腫
(C)可以腎上腺皮質類固醇來治療 (D)應採低蛋白質飲食
- (B) 52 小明因急性腎絲球性腎炎（Glomerulonephritis）而入院，其尿液分析的結果為下列何項？
(A)膿尿、血尿 (B)血尿、蛋白尿
(C)膿尿、尿比重上升 (D)蛋白尿、尿比重下降
- (C) 53 關於嬰兒管灌食（tube feeding）下列敘述何者正確？
(A)灌食前以10 c.c.清水沖洗鼻胃管 (B)直接灌入10 c.c.的牛奶
(C)給嬰兒安撫奶嘴 (D)灌食時，維持垂頭仰臥姿勢
- (C) 54 有關甲狀腺機能亢進（Grave's disease）的敘述，下列何者錯誤？
(A)病童的胃口很好，但體重卻不增加，有時反而下降
(B)可能與自體免疫疾病有關
(C)外科手術切除是唯一的治療方式
(D)臨床症狀可能有注意力差及行為問題
- (C) 55 請選出IDDM 病童之低血糖症狀：①暈眩頭痛 ②皮膚乾燥發紅 ③尿酮出現 ④呼吸有水果味 ⑤飢餓感
(A)①④ (B)②③ (C)①⑤ (D)②④，重製必究！
- (B) 56 何項檢查是確立急性淋巴球白血病（acute lymphoid leukemia; ALL）最有效之鑑別診斷？
(A)血液分析 (B)骨髓檢查 (C)腦脊髓液檢查 (D)切片檢查
- (D) 57 下列何者不是抗癌藥物？
(A) Vincristine（Oncovin） (B) Methotrexate（MTX）
(C) Cyclophosphamide（Endoxan） (D) Allopurinol

- (D) 58 有關風濕熱 (Rheumatic fever) 之敘述，下列何者錯誤？
(A) 續發於 A 群 β 型溶血性鏈球菌
(B) 好發於 8~15 歲的兒童
(C) 感染後，會侵犯心臟、中樞神經以及關節
(D) 侵犯心臟所造成的瓣膜損傷是可回復性的
- (D) 59 張小弟兩個月大，因單側唇裂而入院行矯正手術，術後的第一天，下列護理措施，何者正確？
(A) 宜使用安撫奶嘴，以避免張小弟哭泣 (B) 不宜使張小弟平躺，以免壓迫傷口
(C) 餵食牛奶後需以清水清洗傷口 (D) 約束張小弟手臂，以防止碰觸傷口
- (D) 60 小明 2 歲，因心臟病需於家中持續服用毛地黃 (Digoxin)，有關服用毛地黃的注意事項，下列敘述何者錯誤？
(A) 在固定時間服藥 (B) 避免於用餐時給藥
(C) 給藥前需先測量心尖脈 (D) 服藥後嘔吐，應立即補服一劑
- (D) 61 依照行政院衛生署 2003 年之統計資料，台灣地區嬰兒 (未滿 1 歲) 主要死亡原因為：
(A) 新生兒感染 (B) 惡性腫瘤 (C) 事故傷害 (D) 源於周產期之病態
- (A) 62 患有糖尿病且於懷孕期間血糖控制不良 (血糖偏高) 的產婦，產出的新生兒可能會出現下列那些症狀？
(A) 蒼白、出汗、顫抖、躁動 (B) 肌肉鬆弛、反射變差
(C) 腹瀉、心律不整 (D) 昏睡、皮膚乾燥、呼吸加快
- (B) 63 下列那幾項是屬於發紺性心臟缺損之疾病：①大動脈移位 ②心室中隔缺損 ③法洛氏四重畸形 (Tetralogy of Fallot) ④主動脈狹窄
(A) ①② (B) ①③ (C) ②③ (D) ②④
- (A) 64 法洛氏四重畸形的幼兒出現嚴重發紺和呼吸困難時，應讓幼兒維持何種姿勢？
(A) 膝胸臥式 (B) 端坐姿勢 (C) 半坐臥式 (D) 側臥式
- (A) 65 王小弟罹患囊性纖維變性 (cystic fibrosis)，護理指導時應建議其採用下列何種飲食？
(A) 高熱量、高蛋白 (B) 高熱量、低蛋白
(C) 高碳水化合物、低蛋白 (D) 高蛋白、低脂肪
- (A) 66 護理人員在拔除胸腔引流管時應指導兒童：
(A) 完全吸氣後憋氣 (B) 完全吐氣後憋氣 (C) 用嘴慢慢呼氣 (D) 正常呼吸
- (C) 67 有關學齡期兒童的抽痰技術，每次抽痰的時間與抽痰的壓力，下列何者正確？
(A) 時間為 3-5 秒，壓力為 60-80 mmHg (B) 時間為 5-10 秒，壓力為 60-80 mmHg
(C) 時間為 10-15 秒，壓力為 100-120 mmHg (D) 時間為 15-20 秒，壓力為 100-120 mmHg
- (A) 68 下列何種疾病需採呼吸道隔離？
(A) 麻疹 (B) 脊髓灰白質炎 (C) 日本腦炎 (D) 腸病毒
- (B) 69 有關玫瑰疹的敘述，下列何者錯誤？
(A) 會有突發性高燒 (B) 疹子首先出現在臉部
(C) 熱性痙攣是常見的合併症 (D) 感染者日後仍有可能再得
- (D) 70 當小玲被宣告死亡時，護理人員面對小玲父母的反應，下列何者最恰當？
(A) 「不要難過，小玲以後不會再痛苦了」 (B) 「堅強一點，妳還有其他小孩要照顧」
(C) 「你們還年輕，可以再生一個孩子」 (D) 「小玲很特別，我們都會很想念她」
- (D) 71 9 歲兒童面臨死亡時之感受，下列敘述何者為是？①通常對人死後的儀式好奇 ②很想知道發生了什麼事？為什麼會發生？下一步會發生什麼？ ③認為死亡是他們應接受的懲罰 ④認為死亡是一種威脅，對死亡會產生焦慮、害怕或擔心
(A) ①②③ (B) ②③④ (C) ①③④ (D) ①②④

- (A) 72 對於痙攣兒童的護理，下列何者錯誤？
(A)為維持呼吸道通暢及避免咬傷舌頭，當痙攣發作牙關緊閉時必須強將壓舌板置入口中
(B)痙攣發作時，避免約束四肢
(C)維持病童日常生活習慣，不需特別限制或過度保護
(D)熱性痙攣發作時，可配合給予冰枕或溫水拭浴
- (B) 73 嬰兒使用集尿袋收集尿液標本時，應多久檢查一次集尿袋，以免蓄集尿液太多、太重而使集尿袋脫落？
(A) 5-10 分鐘 (B) 20-30 分鐘 (C) 40-60 分鐘 (D) 70-90 分鐘
- (B) 74 王小弟被診斷為急性結膜炎，醫囑予眼藥水及眼藥膏同時使用，有關使用眼藥的護理指導，下列敘述何者錯誤？
(A)滴眼藥水時兒童最好採仰臥，或採坐著頭後仰之姿勢
(B)眼藥水及眼藥膏皆需點於眼球正中央
(C)先滴眼藥水，間隔三分鐘後再點眼藥膏
(D)滴眼藥水後，需以手指按壓內眦淚點（lacrimal punctum）一分鐘
- (B) 75 有關兒童牙齒發展的敘述，下列何者正確？
(A)不論乳齒或恆齒上排中央門牙最早長出 (B)約2 歲半時，20 顆乳齒可全數長出
(C)恆齒的第一大白齒長出時間約在9 歲左右 (D)通常男孩比女孩先長牙
- (A) 76 當葡萄糖-六-磷酸鹽去氫酶缺乏（G-6-PD）的兒童，吃了許多蠶豆後，可能發生的臨床表徵是：
(A)黃疸、貧血及褐色尿液 (B)複視、感覺障礙及肌肉張力微弱
(C)發紺、痙攣及頭痛 (D)皮膚冰冷、關節疼痛及呼吸困難
- (C) 77 新生兒因腸胃道缺乏製造維生素K 的菌叢，為預防新生兒出血，目前常規性的措施為何？
(A)鼓勵孕婦進食含豐富維生素K 的食物
(B)孕婦於產前注射維生素K
(C)新生兒於出生後，立即給予肌肉注射維生素K
(D)新生兒於出生後，立即給予口服維生素K
- (C) 78 周小弟4 歲，因燒傷被送至急診，急救時應優先給周小弟的靜脈輸液為：
(A)0.9%生理食鹽水 (B)5%葡萄糖生理食鹽水 (C)乳酸林格氏液 (D)台大五號
- (C) 79 給予嬰幼兒滴耳藥的正確拉耳法是：
(A)將耳垂往上往前輕拉 (B)將耳垂往下往前輕拉
(C)將耳垂往下往後輕拉 (D)將耳垂往上往後輕拉
- (C) 80 正常5 個月大的嬰兒還會出現下列何種新生兒反射？
(A)吸吮反射（Sucking reflex） (B)手掌抓握反射（Palmer grasp reflex）
(C)蹠抓握反射（Plantar grasp reflex） (D)驚嚇反射（Startle reflex）

【版權所有，重製必究！】