


《醫學(六)》

- (C) 1 為病患進行麻醉誘導時，下列何者會使麻醉氣體的最低肺泡濃度 (minimum alveolar concentration; MAC)增加？
- (A)體溫 34°C
(B)急性酒精中毒 (acute alcohol intoxication)
(C)長期酒精濫用 (chronic alcohol abuse)
(D)動脈血中氧氣濃度 (PaO₂) 低於 40 mmHg
- (B) 2 Train-of-four(TOF)是測試神經肌肉阻斷程度的方式之一,以下敘述何者錯誤？
- (A) TOF 是藉由在二秒內給予連續四次時間為 200μsec 的電刺激，觀察其強度衰退 (fade) 情形，來判定神經肌肉阻斷程度的監測方式
(B)當連續四次刺激的第四次反應 (the fourth response)完全消失時,代表 90% 以上的神經肌肉是被阻斷的
(C)手術中所需要的神經肌肉阻斷程度大約是 75%到 95%的神經肌肉阻斷
(D)連續四次刺激的第一次和第四次反應程度的比例，是評估去極化肌肉鬆弛劑是否達到效果的良好指標
- (B) 3 傳導疼痛訊息的神經系統 (nociceptive pathways)是以下列何種纖維傳導？
- (A) C-fiber + A-beta fiber
(B) C-fiber + A-delta fiber
(C) C-fiber + A-gamma fiber
(D) A-beta fiber + A-delta fiber
- (D) 4 一位69 歲有心肌梗塞病史的男性病患，施行全身麻醉做攝護腺肥大之經尿道攝護腺切除手術 (TURP)，手術90 分鐘過程順利。當病患被送至恢復室時，氣管內管已拔除，意識清醒。但20 分鐘後病人呈現躁動、發抖、血壓80/50 毫米汞柱、呼吸40 次/分、心率140 次/分、血氧飽和濃度92%。請問以下診斷何者最不可能？
- (A)術後持續出血 (B) TURP 症候群
(C)心肌梗塞或缺血 (D)單純術後傷口疼痛
- (C) 5 下列有關臨床監測設施之敘述，何者正確？
- (A)由 right internal jugular vein 插入中央靜脈導管，發生氣胸之危險性最大
(B) pulse oxymetry 可監測病人目前血中二氧化碳濃度
(C) end-tidal CO₂ 可用來判斷氣管內管是否誤插入食道中
(D) precordial doppler 用來偵測氣栓 (air embolism)最準確
- (C) 6 對於五歲以下小孩，其氣道最狹窄部位為何？
- (A) tongue base (B) vocal cords (C) cricoid cartilage (D) thyroid cartilage
- (A) 7 下列何者是 nonsteroidal antiinflammatory drugs(NSAIDs)的直接藥理機轉？
- (A)抑制 prostaglandins 的形成 (B)釋放出 substance P
(C)直接作用在 μ-opioid 接受器上 (D)抑制 substance P 的釋放
- (C) 8 下列何種靜脈麻醉藥物 (intravenous anesthetics)在室溫下打開藥瓶後不易保存,容易有細菌生長,因此在開瓶後六小時內應使用完畢？
- (A) Thiopental (B) Pentobarbital (C) Propofol (D) Diazepam
- (C) 9 下列那一項不屬於圓錐角膜 (keratoconus) 的臨床病徵？
- (A) Munson 氏徵候 (B)高度的不規則性散光
(C) Kayser-Fleischer ring (D)急性角膜積水 (acute hydrops)



- (D) 10 下列有關背景型糖尿病視網膜病變 (background diabetic retinopathy; BDR)的敘述,何者錯誤?
(A)視網膜病變局限於視網膜內 (intraretinal)
(B)微血管瘤 (microaneurysms) 是其早期視網膜病變之特徵
(C)黃色視網膜滲出物 (hard exudates)亦是其視網膜病變之特徵
(D)需要積極視網膜雷射治療 (laser photocoagulation)以防止惡化
- (B) 11 下列有關原发性隅角開放型青光眼的敘述,何者錯誤?
(A)屬於進行性的視神經病變 (optic neuropathy)
(B)疾病早期常會有視力模糊的症狀
(C)眼壓是造成疾病的危險因子,也是控制疾病的要素
(D)具特殊形態的視神經頭 (optic nerve head)病變,有時伴隨視野缺損
- (B) 12 下列那一條眼肌的長度最長?
(A)上直肌 (B)上斜肌 (C)下直肌 (D)下斜肌
- (C) 13 上眼部化學灼傷 (chemical burn)時,急救的第一步是什麼?
(A)眼睛包紮 (B)趕緊送到醫院
(C)馬上以清水沖洗眼部 (D)立刻投予類固醇藥物
- (A) 14 淚液薄膜 (tear film)的中層(middle aqueous layer),其成分是由下列何者所分泌?
(A)淚腺 (lacrimal gland) (B)眼瞼瞼板腺 (meibomian gland)
(C)結膜杯狀細胞 (D)眼瞼蔡氏腺 (Zeis' gland)
- (A) 15 下列那一種結膜疾病,會在角膜上出現盾狀潰瘍 (shield ulceration)?
(A)春季角結膜炎 (vernal keratoconjunctivitis)
(B)砂眼 (trachoma)
(C)威爾遜氏疾病 (Wilson' s disease)
(D)圓錐角膜 (keratoconus)
- (C) 16 出生三日之嬰兒發生結膜充血、分泌物劇增,且其父母曾有性病史,下列敘述何者錯誤?
(A)分泌物的抹片檢查,可能有革蘭氏陰性雙球菌
(B)與產道感染有關
(C)由於僅為結膜炎,無失明之虞
(D)治療方針應予 Penicillin G,局部點眼及肌肉注射
- (C) 17 45 歲李先生主訴最近半年持續右耳閉塞感及聽力減退,但沒有眩暈或耳漏現象。理學檢查發現耳膜完整但顏色為琥珀色,純音聽力檢查為傳導性聽力損傷,下列診斷何種最為可能?
(A)梅尼爾氏症 (Meniere' s disease) (B)慢性中耳炎
(C)中耳腔積液 (D)中耳膽脂瘤 (cholesteatoma)
- (B) 18 承上題,後續之檢查,下列何者為最優先考量?
(A)耳道內視鏡 (B)鼻咽內視鏡
(C)電腦斷層攝影 (D)聽性腦幹反應 (auditory brain stem reflex)檢驗
- (A) 19 一位中年婦女主訴兩天前眩暈發作,持續半小時至一小時,伴隨左側聽力障礙、耳鳴、耳內腫脹壓迫感。她無高血壓、冠心病、高血脂症或糖尿病等病史。這是兩年來第 3 次發作,每次發作的過程都一樣。下列何者為最可能之診斷?
(A)梅尼爾氏症 (Meniere' s disease)
(B)良性陣發性位置性眩暈 (benign paroxysmal positional vertigo)
(C)前庭神經炎 (vestibular neuritis)
(D)椎骨基底動脈循環不全症 (vertebro-basilar artery insufficiency)

- (D) 20 一位 58 歲男性因聲音沙啞求診，經內視鏡檢查顯示左側聲帶麻痺，胸部 X 光發現左上肺有陰影，則下列敘述何者最可能？
 (A)病人可能罹患肺癌併發腦幹轉移
 (B)病人可能罹患肺癌併發喉局部轉移
 (C)病人可能罹患喉癌併發肺部轉移
 (D)病人可能罹患肺癌壓迫喉返神經 (recurrent laryngeal nerve)
- (C) 21 急性鼻竇炎引起之頭痛，如果多發生於白天，到下午或傍晚則漸緩，則最常見之原因為何？
 (A)篩竇炎 (B)蝶竇炎 (C)額竇炎 (D)上頷竇與篩竇炎
- (D) 22 慢性積液性中耳炎可以中耳導氣管置放術 (myringotomy tube insertion)治療。中耳導氣管大約放多久就會自然排出？
 (A)1 個月 (B)2 個月 (C)3 個月 (D)6 至 12 個月
- (D) 23 根據下圖，則左耳氣導 (air conduction)的平均聽力閾值(pure tone average)為何？



- (A) 2 dB (B) 25 dB (C) 35 dB (D) 55 dB
- (B) 24 有關第三鰓裂瘻管 (third branchial fistula)之敘述,下列何者正確？
 (A)此瘻管有一端開口在扁桃腺窩
 (B)此瘻管在第九對與第十二對腦神經間穿過
 (C)此瘻管在外頸與內頸動脈間穿過
 (D)此瘻管是所有鰓裂瘻管中最常見的
- (ABCD) 25 一位 50 歲婦女，G3P3，每年固定接受子宮頸抹片檢查。今年子宮頸抹片檢查呈現 atypical squamous cells of unknown origin,而子宮頸人類乳突狀病毒檢查(HPV)呈現低危險型(type 16)陽性反應。下列何種處置為最佳選擇？
 (A)立刻接受陰道鏡檢查，並且做子宮頸切片 (punch biopsy)檢查
 (B)六個月後追蹤子宮頸抹片檢查
 (C)子宮內膜切片檢查
 (D)子宮頸錐狀切除 (LEEP or conization)
- (D) 26 所謂卵巢癌適當減積手術 (optimal debulking),是指殘餘的腫瘤大小為:
 (A) < 4 cm (B) < 3.5 cm (C) < 3 cm (D) < 1.5 cm
- (C) 27 持續性妊娠滋養層細胞疾病 (persistent gestational trophoblastic disease)經過化學治療後,如果再懷孕時，通常會如何？
 (A)胎兒畸形率增加 (B)流產發生率增加 (C)正常生育功能 (D)早產增加

- (A) 28 一位 17 歲女孩患有 endodermal sinus tumor,則下列敘述何者錯誤?
 (A)可能發生於兩側卵巢,因此對側卵巢須切片
 (B)甲型胎兒蛋白(alpha-fetoprotein)可能會升高
 (C)術後須加上化學治療
 (D)又稱為卵黃囊癌(yolk sac carcinoma)
- (B) 29 對於子宮內膜癌 FIGO 分期為 stage Ib G3 期的病人,最常使用的術後治療計畫為何?
 (A)小心追蹤檢查 (B)放射線治療 (C)黃體素治療 (D)化學療法
- (B) 30 子宮頸錐狀切除後的病理檢查,發現癌細胞侵襲深度介於 3~5 mm 之間,寬度小於 7 mm,則此病人屬於子宮頸癌的那一期?
 (A) stage Ia1 (B) stage Ia2 (C) stage Ib1 (D) stage Ib2
- (D) 31 在臺灣,胎兒水腫(hydrops fetalis)最常見的原因為甲型海洋性貧血(alpha-thalassemia)。請問其致病基因在第幾對染色體?
 (A) 8 (B) 11 (C) 13 (D) 16
- (B) 32 一位24 歲女性, G₂P₁, 妊娠42 週,待產中胎兒心律發生「變異減速」(variable deceleration),則下列診斷以何者為最可能?
 (A)胎頭壓迫 (B)臍帶壓迫 (C)子宮胎盤功能不足 (D)胎兒畸形
- (A) 33 一位21 歲女性, G₃P₂, 妊娠33 週,半夜急診就醫,主訴突然大量陰道出血,不覺疼痛,無任何內外科病史,曾剖腹生產兩次。下列何者為最可能的診斷?
 (A)前置胎盤 (B)胎盤早期剝離 (C)子宮破裂 (D)子宮外孕
- (D) 34 一位31 歲女性, G₁P₀, 妊娠38 週,診斷為「前置胎盤」。她最適當的分娩方式為何?
 (A)自然生產 (B)真空吸引分娩 (C)產鉗 (D)剖腹生產
- (D) 35 一位25 歲女性, G₁P₀, 月經規則,週期42 天,最後一次月經的第一天是3 月8 日。她的預產期是那一天?
 (A)同年12 月 15 日 (B)翌年12 月 15 日 (C)同年11 月 15 日 (D)同年12 月 29 日
- (B) 36 一位 20 歲女大學生因急性腹痛而接受手術,取出卵巢腫瘤(如下圖所示),則下列診斷何者最正確?




- (A)卵巢外孕 (B)卵巢畸胎瘤 (C)卵巢單純囊腫 (D)卵巢黃體囊腫
- (A) 37 一位 53 歲婦女, 6 個月無月經,期間有熱潮紅、夜間盜汗、情緒容易急躁。她接受荷爾蒙療法緩解這些症狀;但治療 6 個月後,發現每天有少量陰道出血。此時那個處置最合適?
 (A)陰道超音波檢查 (B)子宮鏡子宮內膜燒灼術 (C)觀察 (D)子宮切除手術

- (C) 38 一位 39 歲婦女，G₁P₁，例行性的超音波檢查發現有一個子宮肌瘤 6×6×5 公分，卵巢正常。她沒有頻尿、排便困難等任何症狀。下一步最適合的處置是什麼？
 (A)注射 gonadotropin-releasing hormone(GnRH)agonists 療法 (B)剖腹切除肌瘤手術
 (C)追蹤六個月再檢查一次 (D)腹腔鏡肌瘤切除手術
- (B) 39 一位 42 歲母親，20 年前罹患子宮內膜異位症曾接受手術治療，現在她的大女兒也有相同疾病，她很擔心二女兒也會有相同疾病。據你所知，子宮內膜異位症可能是下列那一種疾病？
 (A) Autosomal recessive with variable penetrance (B) Polygenic multifactorial
 (C) Spontaneous mutations (D) No evidence of genetic inheritance
- (D) 40 有關卵巢濾泡中分泌 sex hormones 的細胞，下列敘述何者正確？
 (A)只限於顆粒細胞 (granulosa cells) (B)顆粒細胞及基礎細胞 (basal cells)
 (C)卵囊膜細胞 (theca cells)及基礎細胞 (D)顆粒細胞及卵囊膜細胞
- (B) 41 婦女停經後，體內雌激素由何處產生？
 (A)骨骼 (B)脂肪 (C)神經 (D)血管
- (C) 42 有關 GnRH agonists 藥物之敘述，下列何者最正確？
 (A)比內生性 GnRH 半衰期短 (B)給予 3 週後，可刺激 FSH
 (C)可治療內膜異位症 (D)可口服使用
- (B) 43 年輕女性引起急性性輸卵管炎之最常見的致病原因為何？
 (A) gonorrhea (B) Chlamydia trachomatis
 (C) Ureaplasma urealyticum (D) bacterial vaginitis
- (A) 44 一般而言，正常性生活的健康且年輕夫妻嘗試受孕，12 個月後成功機會約為：
 (A) 90% (B) 70% (C) 50% (D) 30%
- (B) 45 人工生殖技術中，何種冷凍效果最不好？
 (A)精子 (B)卵子 (C)受精卵 (D)囊胚期胚胎
- (C) 46 一位 21 歲女性，因陰蒂肥大求診，被診斷為 congenital adrenal hyperplasia(CAH),其血中 17-hydroxyprogesterone(17-HP)為 600 ng/dL。下列關於 CAH 之病因及治療的敘述，何者最適當？
 (A)最常見為 21-hydroxylase deficiency,治療最有效為 cortisone
 (B)最常見為 11β-hydroxylase deficiency,治療最有效為 dexamethasone
 (C)最常見為 21-hydroxylase deficiency,治療最有效為 dexamethasone
 (D)最常見為 11β-hydroxylase deficiency,治療最有效為 cortisone
- (A) 47 厭食症引起無月經症，主要源於何者功能失調？
 (A)下視丘 (B)甲狀腺 (C)卵巢 (D)子宮
- (C) 48 關於泌乳素 (prolactin) 之分泌，下列何者正確？
 (A)無日夜 (diurnal) 差別 (B)月經週期無差別 (C)呈脈衝型 (pulsatile) (D)呈平原型
- (D) 49 下列何者不是催生的藥物？
 (A) Prostaglandin E2 (B) Oxytocin (C) Misoprostol (D) Ritodrine
- (B) 50 妊娠時，母親血清中「甲型胎兒蛋白 (AFP)」過高時，應懷疑下列何種疾病？
 (A)染色體異常，尤其是唐氏症 (B)胎兒神經管缺損或皮膚有缺損
 (C)海洋性貧血 (D)妊娠滋養層細胞疾病
- (A) 51 造成胎兒心跳早期性減速 (early deceleration)的常見原因為何？
 (A)胎頭壓迫 (B)臍帶壓迫 (C)胎兒缺氧 (D)母親酸血症
- (A) 52 分娩時，胎頭先露部 (presenting part)之檢查,下列何者最為合理？
 (A)陰道內診 (B)超音波 (C)陰道鏡 (D)電腦斷層

- (B) 53 實施產前遺傳診斷的羊膜腔穿刺 (amniocentesis) 常見的時間是在懷孕的第幾週 (gestational age)?
(A)第10~13 週 (B)第14~20 週 (C)第21~24 週 (D)第25~30 週
- (AC) 54 一位75 歲男性, 因左側腦中風導致右半身麻痺及語言障礙, 他可以聽懂別人說的話, 但是無法回答。若請他重述句子則沒有困難; 他最可能是下列何種失語症?
(A)經大腦皮質運動性失語症 (transcortical motor aphasia)
(B)經大腦皮質感覺性失語症 (transcortical sensory aphasia)
(C)運動性失語症 (motor aphasia)
(D)感覺性失語症 (sensory aphasia)
- (C) 55 半邊忽略現象 (hemineglect) 是最常出現於腦部何處之病變?
(A)基底核 (basal ganglion) (B)額葉 (frontal lobe)
(C)顳頂葉 (temporoparietal lobe) (D)枕葉 (occipital lobe)
- (B) 56 下列何者不是腦傷 (traumatic brain injury)病人常見的後遺症?
(A)肌肉痙攣 (spasticity) (B)帕金森氏症 (Parkinsonism)
(C)癲癇 (epilepsy) (D)頭痛 (headache)
- (A) 57 一位70 歲老人走路跌倒, 造成頸部疼痛, 頸部X 光檢查沒有骨折或脫位。理學檢查患者上肢無力, 無法自行進食; 下肢肌肉張力增強, 但還可走路。下列何種診斷最為可能?
(A)中央脊髓症候群 (central cord syndrome)
(B)布朗史夸德症候群 (Brown-Séquard syndrome)
(C)前脊髓症候群 (anterior cord syndrome)
(D)馬尾症候群 (cauda equina syndrome)
- (D) 58 處理腦性麻痺患者的肌肉痙攣, 那一種方法的效果最持久?
(A)治療性運動
(B)口服抗痙攣藥物
(C)酚 (phenol) 神經阻斷術
(D)選擇性背神經根切除術 (selective posterior rhizotomy)
- (A) 59 下列何者是兒童最常見的語言障礙?
(A)構音異常 (articulation disorder) (B)發音失常 (dysarthria)
(C)失語症 (aphasia) (D)口吃 (stuttering)
- (B) 60 下列關於移植後的心臟生理之敘述, 何者最正確?
(A)運動時最大心跳率較手術前高
(B)運動後較慢恢復至運動前心跳率
(C)副交感神經的影響較交感神經大
(D)靜脈回心血量 (venous return)不影響其心搏量(stroke volume)
- (A) 61 下列何者是髌骨肌腱承重套筒 (patellar tendon-bearing socket)的壓力承受位置?
(A)脛骨前肌群 (pretibial muscles) (B)腓骨頭部 (fibular head)
(C)膕旁腱 (hamstring tendon) (D)脛骨結節 (tibial tubercle)
- (B) 62 針對慢性阻塞性肺病 (COPD) 所做的吸氣肌肉訓練 (inspiratory muscle training), 下列那一項敘述錯誤?
(A)會減少橫膈膜 (diaphragm) 的疲乏
(B)會減少COPD 急性惡化 (acute exacerbation)的發作頻率
(C)會增加12 分鐘的步行距離 (12-MD)
(D)會增加最大吸氣時的嘴壓 (maximal inspiratory mouth pressure)

(A) 63 下列兩圖所示是在進行那一條肌肉的拉筋運動？




- (A)左側髂腰肌 (iliopsoas muscle)
 (B)右側股四頭肌 (quadriceps muscle)
 (C)右側大腿後肌 (hamstring muscle)
 (D)兩側腓腸肌 (gastrocnemius muscle)
- (B) 64 下列對膝上截肢病患之衛教，何者錯誤？
 (A)避免在大腿下放枕頭，以免肌肉攣縮
 (B)在兩大腿中間放枕頭
 (C)趴在床上15分鐘，每天3次，以避免髌關節攣縮
 (D)對殘肢按摩，可減少對壓力的敏感及避免結痂組織沾黏
- (D) 65 運動中扭傷腳踝，第一時間應如何處理？
 (A)施予按摩 (B)繼續運動以維持韌帶彈性
 (C)立即熱敷以增進血液循環 (D)立即冰敷以減輕疼痛腫脹
- (D) 66 下列何者不是人工膝關節置換手術後復健計畫的重點？
 (A)減少疼痛 (B)恢復關節活動度
 (C)恢復及增加肌力 (D)臥床休息以預防人工關節過早磨損
- (C) 67 身心障礙者的復健目標不包括下列何者？
 (A)將患者功能訓練至最高極限
 (B)利用輔具協助解決日常生活困難
 (C)治癒殘障
 (D)協助患者重新在社會扮演應有的角色
- (A) 68 有關骨質疏鬆 (osteoporosis) 之復健原則，下列何者為非？
 (A)應以游泳增加骨密度 (B)要教育病人如何避免跌倒
 (C)要教導病人提抬重物的正確方法 (D)病人可從事太極拳運動
- (B) 69 當病患坐在輪椅上，足部有蹠屈 (plantar flexion)的問題時，下列敘述何者錯誤？
 (A)可能是病患的正向支持反應 (positive supporting reaction)所造成
 (B)因為腳板 (footrest) 的高度太高
 (C)調整腳板的高度，將足部維持在稍微背屈 (dorsiflexion) 的姿勢
 (D)可能與足跟攣縮 (heel cord contracture)有關
- (D) 70 下列何者不是熱療 (heat therapy)的治療效果？
 (A)血管擴張 (B)肌肉韌帶鬆弛 (C)代謝率增加 (D)疼痛閾值降低

(A) 71 一位 21 歲女性病患所做骨盆腔影像檢查如圖所示，下列那一項敘述最不正確？


- (A) 為達到正確診斷，需進一步做經陰道之超音波掃描
 (B) 檢查時有賴於介質
 (C) 最可能的影像診斷為源自卵巢之囊性畸胎瘤
 (D) 其音波頻率大多介於 2.5 MHz 至 10 MHz 之間



(D) 72 正在做復健治療之腦性麻痺的 3 歲小孩，其 MRI 的 FLAIR 影像如下圖，可見雙邊側腦室旁白質有對稱性的高訊號病變，由此影像可推測造成他腦性麻痺的原因為：




- (A) sequela of previous Japanese encephalitis
 (B) sequela of previous herpes encephalitis
 (C) sequela of infantile head injury
 (D) sequela of perinatal asphyxia of a premature infant
- (A) 73 一位 24 歲男性，三週前曾發生車禍造成頭部外傷。主訴最近十天右眼紅腫，右眼球輕微突出，睡覺時右耳隱約聽到咻咻聲，而來眼科求診。附圖為注射顯影劑後 CT 的眼眶影像，其最可能的診斷是：



- (A) carotid cavernous fistula (B) retrobulbar hematoma
 (C) traumatic edema of superior rectus muscle (D) myositis of superior rectus muscle

- (B) 74 一位 79 歲男性，下列左圖為其側面頸椎 X 光片，右圖為其電腦斷層矢狀面重組之頸椎影像，其第一及第二頸椎病變之敘述，以何者為最正確？



- (A) C1-C2 subluxation (B) odontoid fracture with non-united gap
(C) infection of odontoid process (D) metastatic bone lesion of C2
- (B) 75 一位 28 歲女性，主訴 3 天前開始出現腹痛。病人無噁心嘔吐，食慾正常，排便習慣沒變。陰道分泌物增多，但無出血現象。有固定吃避孕藥，不曾懷孕。理學檢查發現體溫為 38.5°C，下腹部有壓痛 (tenderness)，但無反彈痛 (rebounding pain)，腸音正常。若懷疑此病人是婦科或腸道疾病，以下敘述何者最為適當？
- (A) 因為有發燒而且有吃避孕藥，所以此病人不可能是子宮外孕
(B) 腹腔鏡 (laparoscopy) 可用來診斷骨盆腔感染 (pelvic inflammatory disease)
(C) 骨盆腔感染最常見的病原為金黃色葡萄球菌 (Staphylococcus aureus)
(D) 若做理學檢查發現有明顯子宮頸移動痛 (cervical motion tenderness) 或子宮旁附屬器疼痛 (adnexal tenderness)，則可排除闌尾炎的可能性
- (A) 76 醫療人員對呼吸道阻塞病患的急救處置，下列何者錯誤？
- (A) 病人無意識時，應立即跨跪在病人大腿兩側，兩手掌根重疊放在肚臍稍上方，用力壓腹部 5 下
(B) 病人無意識時，應執行類似 CPR 的動作，壓胸與吹氣的部位及次數比均相同
(C) 於壓胸後，應檢查口中有無異物，如有則挖除之，如無則試吹氣
(D) 對於有意識的呼吸道阻塞急救，除了壓腹部，也可以壓胸和捶背
- (A) 77 觸電或被閃電擊中的急救處理原則，下列敘述何者錯誤？
- (A) 觸電或被閃電擊中造成心臟停止，救回來以後都要給大量水分，以防腎衰竭
(B) 被閃電擊中若造成大量傷患，此時應採反向的檢傷分類 (reverse triage)
(C) 無論是觸電或被閃電擊中造成心臟停止，在回復自發性循環前，其急救方法與一般心臟停止相同
(D) 去急救觸電的病人，首要任務是確保自身安全
- (C) 78 有關生物戰中肉毒桿菌毒素中毒 (botulism) 之表徵，下列敘述何者正確？
- (A) 瞳孔之光反射正常 (normal light reflex) (B) 遠端肢體無力 (distal limb weakness)
(C) 下降型肢體癱瘓 (descending paralysis) (D) 中樞性顏面神經麻痺 (central facial palsy)
- (C) 79 一位 25 歲男性，二週前於 A 醫院接受鼻部手術後出院，今天突然流大量鼻血至 B 醫院急診。B 醫院之處置，以何者最為適當？
- (A) 驗血，不必說明原因，轉回原手術之 A 醫院處置
(B) 以棉花塞鼻止血，並告知為原手術失敗造成，需回去找原來的醫師
(C) 先行止血，待病情穩定，請病患回原手術醫師處治療
(D) 止血，驗血，影像學檢查，並告知病患以後不要再回去原手術醫院了

- (B) 80 美國大法官 Cardozo 早在 20 世紀初就清楚揭示：「每一個心智健全的成年人，都有權利決定其身體要作如何之處置。」此一保障身體自主權的概念，在 1950 年代以後，形成了那一個重要的醫病關係之原則？
- (A) 病人生病時欠缺作決定的必要心智能力，故醫師有義務為病人作決定
 - (B) 醫師執行醫療行為，應取得病人的「知情同意」（或稱告知後同意）
 - (C) 為了幫助病人作出最好的決定，醫師可以視個案情況，斟酌告知病人其病情
 - (D) 醫師為避免以專業的醫學知識來增加病人負擔，應該說的愈少愈好

高
點
·
建
國

【版權所有，重製必究！】