



# 《醫學(六)》

- (C) 1 對於慢性阻塞性肺疾病的患者而言，應訓練何種呼吸方式以避免呼吸末期肺泡的塌陷？  
 (A)舌咽式呼吸 (glossopharyngeal breathing)  
 (B)腹式呼吸 (abdominal breathing)  
 (C)噘唇式呼吸 (purse-lip breathing)  
 (D)斷續式呼吸 (intermittent breathing)
- (D) 2 關於放置喉頭罩 (laryngeal mask airway) 與放置氣管內管 (endotracheal tube) 的比較，下列敘述何者錯誤？  
 (A)放置喉頭罩較不具侵入性 (B)放置喉頭罩只需要較淺的麻醉深度  
 (C)放置喉頭罩可以不須給肌肉鬆弛劑 (D)放置喉頭罩可以避免產生吸入性肺炎的危險性
- (B) 3 下列何種膽鹼酶抑制劑 (cholinesterase inhibitors)，能通過血腦障礙 (blood brain barrier) 而影響中樞神經？  
 (A) neostigmine (B) physostigmine (C) pyridostigmine (D) edrophonium
- (C) 4 下列何者是類鴉片類 (opioids) 藥物的純粹拮抗劑 (pure antagonist)？  
 (A) nalbuphine (B) butorphanol (C) naloxone (D) pentazocine
- (D) 5 使用肌肉鬆弛劑拮抗劑膽鹼酶抑制劑 (cholinesterase inhibitors)，作用在muscarine 接受器 (muscarinic receptor) 所產生的作用，下列何者錯誤？  
 (A)降低心跳速率 (decreased heart rate)  
 (B)瞳孔縮小 (pupillary constriction)  
 (C)胃腸痙攣 (intestinal spasm)  
 (D)降低膀胱張力 (decreased bladder tone)
- (C) 6 抗憂鬱劑 (antidepressant) 是治療慢性疼痛的一種藥物，它的機轉是阻斷了那一個神經傳遞物 (neurotransmitter) 的再吸收？  
 (A) adenosine (B) substance P (C) serotonin (D)  $\gamma$ -aminobutyric acid (GABA)
- (B) 7 放置Swan-Ganz 導管時，當壓力變化於下圖中箭頭處時，代表導管前端在：  
 (A)右心房 (right atrium)  
 (B)肺動脈 (pulmonary artery)  
 (C) pulmonary wedge  
 (D)右心室 (right ventricle)
- 
- (A) 8 在局部麻醉劑 (local anesthetics) 中，添加血管收縮劑 (vasoconstrictors) 的作用及機制，下列何者錯誤？  
 (A)加快局部麻醉劑開始作用 (onset) 的時間 (B)減緩局部麻醉劑的吸收速度  
 (C)加強局部麻醉劑止痛的品質 (D)減少局部麻醉劑毒性副作用
- (B) 9 以下是數種不同麻醉氣體的blood/gas 互溶係數 (partition coefficient)，如果其他條件均相同，下列何者達到誘導 (induction) 麻醉入睡的速度會最快？  
 (A)甲氣體；2.4 (B)乙氣體；0.42 (C)丙氣體；1.9 (D)丁氣體；12
- (D) 10 下列何者與先天性白內障無關？  
 (A)先天性德國麻疹 (congenital rubella) (B)唐氏症候群 (Down syndrome)  
 (C) galactose 代謝異常 (galactosaemia) (D)母親妊娠子癇症 (eclampsia)

- (A) 11 下列何者是發生在成年人上眼瞼結膜上的巨大乳頭狀結膜炎 (giant papillary conjunctivitis)，最常見的原因？  
(A)配戴隱型眼鏡 (B)維他命A 缺乏  
(C)糖尿病 (D)頸動脈靜脈竇瘻管 (carotid-cavernous fistula)
- (C) 12 結膜的杯狀細胞 (goblet cells)，可以分泌淚液的那一種成分？  
(A)脂肪 (lipid) (B)水 (aqueous) (C)黏液 (mucin) (D)電解質 (electrolytes)
- (B) 13 69 歲女性服用感冒藥後因噁心、嘔吐、頭痛、左眼視力模糊且疼痛至急診室求診，身體檢查發現瞳孔中度散大、前房變淺、角膜混濁不清，此病患最可能之主要診斷為：  
(A)急性結膜炎 (B)急性隅角閉鎖性青光眼 (C)病毒性角膜炎 (D)急性虹彩炎
- (A) 14 隱斜視 (heterophoria) 的診斷一般需靠下列何項檢查，才易確定？  
(A) cover-uncover test (B) alternate cover test  
(C) prism cover test (D) prism reflex test of Krimsky
- (B) 15 高度近視接受過雷射屈光手術 (LASIK) 後的眼壓值，以非接觸性氣壓式 (air-puff) 眼壓計測量的結果，會如何？  
(A)偏高 (B)偏低 (C)不一定 (D)不受影響
- (A) 16 下列何者不是第三對腦神經麻痺可能引起的徵候？  
(A)內斜視 (B)外斜視 (C)瞳孔變大 (D)眼瞼下垂
- (D) 17 有關重症肌無力 (myasthenia gravis) 的敘述，何者錯誤？  
(A)眼部症狀以眼瞼下垂或複視表現  
(B)老年人患有此症者要檢查是否患有胸腺瘤  
(C)靜脈注射edrophonium chloride 可幫助診斷  
(D)可以注射肉毒桿菌素 (botulinum toxin) 來治療
- (D) 18 7 歲劉小妹今天早上誤食鈕釦型電池，中午被家長送至門診後，X 光檢查發現電池卡在食道上段，劉小妹無嘔吐現象亦不覺疼痛，請問下列何種處置最合適？  
(A)先觀察48 小時，看電池是否會隨排便排出 (B)先服用抗生素避免感染  
(C)開予催吐劑，讓孩童吐出 (D)立即安排食道鏡取出電池
- (C) 19 Radical neck dissection 須犧牲那一條肌肉？  
(A) mylohyoid muscle (B) omohyoid muscle  
(C) sterno-cleido-mastoid muscle (D) digastric muscle
- (A) 20 鼻咽癌的五年存活率，以下列何種病理型態為最低？  
(A) keratinizing carcinoma (B) non-keratinizing carcinoma  
(C) undifferentiated carcinoma (D) adenoid cystic carcinoma
- (C) 21 下列何者構造不屬於下咽部 (hypopharynx)？  
(A)梨狀窩 (pyriform sinus) (B)後咽壁 (posterior pharyngeal wall)  
(C)喉室 (ventricle) (D)環狀軟骨後區 (post cricoid area)
- (B) 22 下列有關鼻及鼻竇惡性腫瘤敘述何者正確？  
(A)發生性別男女比約為1：1  
(B)硬木屑 (hardwood dust) 與篩竇腺癌的發生具有特別的關聯性  
(C)發生位置最常見於篩竇，其次為上頷竇  
(D)以未分化癌佔大多數
- (A) 23 下列何種材料是目前最常被用來修補耳膜破孔？  
(A)自體顳肌膜 (temporalis fascia)  
(B)自體皮瓣 (pedicle flap)  
(C)自體全層皮膚移植片 (full thickness skin graft)  
(D)自體分層皮膚移植片 (split thickness skin graft)

- (B) 24 目前治療慢性副鼻竇炎最常使用的手術為何？  
 (A) Caldwell-Luc 手術 (B)功能性內視鏡鼻竇手術  
 (C)開窗術 (D)側鼻切開術
- (A) 25 供應鼻部血管中，那一條血管不是由外頸動脈供應？  
 (A)前篩動脈 (anterior ethmoidal artery)  
 (B)上唇動脈 (superior labial artery)  
 (C)大腭動脈 (greater palatine artery)  
 (D)蝶腭動脈 (sphenopalatine artery)
- (C) 26 某位30 歲孕婦，G1P0，月經規則，週期28 天，每次月經五天，自訴：最終月經第一天 (LMP) 是2005 年 2 月1 日，則預產期 (EDC) 是何時？  
 (A) 2005 年 9 月8 日 (B) 2005 年 10 月8 日  
 (C) 2005 年 11 月8 日 (D) 2005 年 12 月8 日
- (B) 27 承上題，該女士來診日期是2005 年 5 月1 日，請問當時妊娠週數為何？請就下列四者中選擇最適當的答案：  
 (A) 8 週 (B) 12 週 (C) 16 週 (D) 20 週
- (A) 28 47 歲婦女，子宮不正常出血，使用荷爾蒙治療 3 個月無法獲得改善，子宮鏡檢查結果如下圖。最可能的診斷是：



- (A)子宮黏膜下肌瘤 (submucosal myoma)  
 (B)子宮漿膜下肌瘤 (subserosal myoma)  
 (C)子宮內膜息肉 (endometrial polyp)  
 (D) Asherman's syndrome
- (B) 29 32 歲女性，主訴無月經3 個月，抽血檢驗，estradiol < 20 pg/mL，濾泡刺激素 (FSH) 為80 IU/L，下列何者最為正確？  
 (A)因懷孕引致無月經  
 (B)欲懷孕需卵子捐贈  
 (C)可以使用clomiphene 以刺激排卵  
 (D)因腦下垂體機能障礙引致無月經
- (D) 30 下列何者為最常見的生殖細胞腫瘤 (germ-cell tumor) ？  
 (A)惡性胚胎瘤 (dysgerminoma)  
 (B)絨毛膜癌 (choriocarcinoma)  
 (C)內胚層竇瘤 (endodermal sinus tumor)  
 (D)成熟性畸胎瘤 (mature teratoma)

(B) 31 一位18 歲女性未曾來月經（無月經），身高正常、第2 性徵發育正常、血液中黃體素濃度正常、基礎體溫表正常，腹部超音波檢查如圖，最合適的診斷是什麼？

- (A) androgen insensitivity ( testicular feminization )  
 (B) Mayer-Rokitansky-Küster-Hauser syndrome  
 (C) Turner syndrome  
 (D) Asherman's syndrome



(D) 32 卵巢腫瘤在超音波檢查及內診時，如有下列何種特徵，可能是良性的機會比較高？

- (A) 實質性的 (solid) (B) 固定的 (fixed) (C) 不規則形狀 (D) 囊狀的 (cystic)

(AB) 33 腹腔鏡手術目前已開始使用來治療一些早期婦癌病人，目前適用於何種病患？

- (A) 子宮內膜癌 (B) 卵巢癌 (C) 陰道癌 (D) 輸卵管癌

(C) 34 部分葡萄胎妊娠 (partial molar pregnancy)，最常見的染色體類型為何？


- (A) 46, XX (B) 46, XY (C) 69, XXY (D) 69, XYY

(B) 35 高劑量黃體素，如medroxyprogesterone acetate 200 mg/day，可用於治療何種復發性癌症？

- (A) 卵巢癌 (B) 子宮內膜癌 (C) 子宮頸癌 (D) 陰道癌


(D) 36 26 歲不孕女性，主訴月經稀少，經檢查如圖A、圖B、圖C 所示，欲治療圖A 所呈現疾患，下列藥物何者最不適當？

圖A：多毛



圖B：後頸黑色素棘皮症圖

圖C：陰道超音波




- (A) medroxyprogesterone acetate (B) antiandrogen  
 (C) 5 $\alpha$ -reductase inhibitor (D) danazol

- (A) 37 承上題，圖B 是何種症狀之特別表徵？  
(A)胰島素耐性不良 (B)半乳糖耐性不良  
(C)雌激素缺乏 (D)黃體素缺乏
- (C) 38 承上題，如欲懷孕，則何者為第一線處理？  
(A)腹腔鏡卵巢穿洞術 (B)卵巢楔狀切除術 (C) clomiphene citrate (D) gonadotropin
- (A) 39 下列那條動脈與內腸骨動脈 (internal iliac artery) 無關？  
(A)股骨動脈 (femoral artery)  
(B)子宮動脈 (uterine artery)  
(C)臍動脈 (umbilical artery)  
(D)中膀胱動脈 (middle vesical artery)
- (C) 40 18 歲病患，高160 公分，體重48 公斤，至婦科求診，主訴無初經來潮，身體檢查乳房發育、陰毛發育正常，則最可能的診斷為：  
(A)雄激素不敏感症 (B)卵巢衰竭症 (C)處女膜閉鎖症 (D)透納氏徵候群 (45,X)
- (D) 41 Acanthosis nigricans 常合併：  
(A)消瘦 (B)低血糖 (C)乳房白斑 (D)無排卵性月經
- (B) 42 35 歲女性，G<sub>5</sub>P<sub>2</sub>A<sub>2</sub>，妊娠35 週，急診剖腹生產發現「子宮胎盤中風」(uteroplacental apoplexy)，請問最可能的診斷為：  
(A)子宮破裂 (B)胎盤早期剝離 (C)前置胎盤 (D)羊水栓塞
- (D) 43 男性不孕症的“睪丸切片”檢查適合什麼情況下執行？  
(A)所有精液分析有少精者  
(B)無精症合併果酸陰性者 (fructose-negative)  
(C)無精症且血中FSH 濃度過高者  
(D)無精症且血中FSH 濃度正常者
- (A) 44 26 歲女性，G<sub>2</sub>P<sub>1</sub>，妊娠40 週產前胎兒超音波檢查，下列何者為異常？  
(A)胎兒胎頭橫徑 (biparietal diameter, BPD) 50 mm  
(B)胎兒股骨長 (femur length, FL) 70 mm  
(C)胎兒腹圍35 cm  
(D)羊水指數 (amniotic fluid index, AFI) 20 cm
- (D) 45 29 歲女性，G<sub>1</sub>P<sub>0</sub>，妊娠32 週，合併嚴重型子癇前症，以MgSO<sub>4</sub> 治療，應注意下列徵候以防「鎂中毒」，下列項目何者錯誤？  
(A)尿液量 (urine output)  
(B)深腱反射 (deep tendon reflex)  
(C)呼吸數 (respiratory rate)  
(D)嘔吐 (vomiting)
- (B) 46 下列何種pelvic ligament 沒有附著於子宮上？  
(A) round ligament  
(B) infundibulopelvic ligament  
(C) cardinal ligament  
(D) uterosacral ligament
- (D) 47 25 歲女性，G<sub>1</sub>P<sub>0</sub>，月經規則，週期42 天，產前超音波呈現胎兒頭臀徑 (CRL, crown-rump length) 6.1 公分，請問懷孕週數為：  
(A) 6 週 (B) 8 週 (C) 10 週 (D) 12 週
- (C) 48 造成胎兒心跳變異性減速 (variable decelerations) 的主要原因為何？  
(A)胎頭壓迫 (B)母親酸血症 (C)臍帶壓迫阻塞 (D)胎兒缺氧

- (D) 49 某位25 歲孕婦，G<sub>1</sub>P<sub>0</sub>，妊娠39 週，自訴胎動略為減少，前來就診，於是做了下列檢查，如下圖，請問是做了何種檢查？請就下列四者中選擇最適當的答案。




- (A) 臍動脈血流速度波形 (umbilical artery flow velocity waveform)  
 (B) 臍靜脈血流速度波形 (umbilical vein flow velocity waveform)  
 (C) 加壓性試驗 (contraction stress test, CST)  
 (D) 非加壓性試驗 (non-stress test, NST)
- (A) 50 承上題，以上檢查之最適當的判讀結果為：  
 (A) 反應性 (reactive) (B) 非反應性 (non-reactive)  
 (C) 變異性減速 (variable deceleration) (D) 晚期減速 (late deceleration)
- (C) 51 下列那種藥物給予孕婦使用，可能引起胎兒動脈導管 (ductus arteriosus) 之早期閉鎖？  
 (A) chloramphenicol (B) cimetidine (C) indomethacin (D) ritodrine
- (A) 52 卵巢癌最常見的組織型態為：  
 (A) 漿液性 (serous) (B) 黏液性 (mucinous)  
 (C) 子宮內膜樣 (endometrioid) (D) 亮細胞 (clear cell)
- (C) 53 一位28 歲之男性，身材高瘦，因為不孕症就診。抽血檢查其染色體，karyotyping 如下圖所示，請問病患的診斷為：




- (A) Down syndrome (B) Cri-du-chat syndrome  
 (C) Klinefelter syndrome (D) Turner syndrome


- (A) 54 H (Hoffmann) 反射檢查在神經生理上，最常用於診斷下列何種疾病？  
 (A)第一薦椎神經根病變 (B)發炎性神經病變  
 (C)遺傳性神經病變 (D)糖尿病神經病變
- (C) 55 女性骨盆腔最小的徑線為何？  
 (A)骨盆腔入口前後徑 (B)中骨盆腔前後徑 (C)中骨盆腔橫徑 (D)骨盆腔出口橫徑
- (B) 56 一位25 歲男子，二年前曾發生一次視力模糊和走路困難現象，但恢復情況良好。今年發生吞嚥困難，兩側下肢無力且有尿失禁現象，則下列何者是最可能的疾病診斷？  
 (A)神經性梅毒 (neurosyphilis) (B)多發性硬化症 (multiple sclerosis)  
 (C)脊髓空洞症 (syringomyelia) (D)脊髓炎 (myelitis)
- (D) 57 腦中風半側偏癱的患者，其患側肢的手部可以做出掌面抓握 (palmar prehension) 的動作，依照布朗氏分期 (Brunnstrom's stage) 來判定，應該屬於第幾期？  
 (A) Stage II (B) Stage III (C) Stage IV (D) Stage V
- (A) 58 一位病患腦部損傷後，對外界漠不關心 (indifference)，反應慢，呈現假性憂鬱症狀 (pseudo-depression)，則其最可能病變位置為何？  
 (A)額葉 (frontal lobe) (B)顳葉 (temporal lobe)  
 (C)頂葉 (parietal lobe) (D)枕葉 (occipital lobe)
- (D) 59 下列何者最不適用於預測腦傷 (traumatic brain injury) 病人的預後？  
 (A)病發時意識不清的時間長短 (B)受傷後健忘症 (amnesia) 的時間長短  
 (C)受傷時的格拉斯可 (Glasgow) 昏迷指數 (D)眨眼反射 (blink reflex)
- (C) 60 下列何種方法用來決定輪椅的高度？  
 (A)以小腿長度作標準 (B)以下肢二分之一之長度作標準  
 (C)以腳底至臍部 (popliteal area) 長度加2 吋作標準 (D)以身高四分之一作標準
- (A) 61 莊老伯是一位68 歲的糖尿病患者，體力衰弱，一個月前才剛接受過右側膝下截肢手術，則下列那一項義足最適合？




(A)



(B)




(C)




(D)

- (D) 62 下圖是請病人俯臥在床上，量測大腿與腳掌軸線間的夾角。此患者有下列何種問題？  
 (A)左脛骨內旋 (tibial internal rotation)  
 (B)左脛骨外旋 (tibial external rotation)  
 (C)右脛骨內旋 (tibial internal rotation)  
 (D)右脛骨外旋 (tibial external rotation)



【版權所有，重

- (A) 63 圖A、B 是請病人彎腰測量皮尺間距的變化，圖C 是請病人做最大的吸氣和吐氣，量測胸圍的變化。下列何種病人最容易在上述兩項檢查出現陽性反應？



- (A) 僵直性脊椎炎 (B) 脊椎側彎 (C) 退化性脊椎炎 (D) 脊椎結核
- (C) 64 下列有關踝關節扭傷急性處理的原則，何者有誤？  
 (A) 避免進行引起疼痛之運動 (B) 可一天冰敷4 次，每次約20 分鐘  
 (C) 此時關節活動受損，可幫病人腳踝拉筋 (D) 可於患處綁彈性繃帶
- (B) 65 楊同學騎機車發生車禍導致嚴重腦傷，目前仍意識紊亂，記憶喪失，常有躁動現象。依照 Rancho Los Amigos 量表來評分，應該屬於第幾級？  
 (A) III (B) IV (C) V (D) VI
- (D) 66 4 歲男孩，出生時早產缺氧，2 歲才開始學走路，走路時墊腳尖，給予圖中所示之支架，其主要目的為改善下列何者？

- (A) 脛前肌無力  
 (B) 脛前肌痙攣  
 (C) 腓腸肌無力  
 (D) 腓腸肌痙攣



- (A) 67 圖中母女都有採這種坐姿的習慣，這是何種問題造成的？

- (A) 股骨前轉 (femoral anteversion)  
 (B) 股骨後轉 (femoral retroversion)  
 (C) 脛骨內旋 (tibial medial torsion)  
 (D) 脛骨外旋 (tibial lateral torsion)




【版權所有】

- (A) 68 運動員因集訓而引起無月經，下列何者會下降？  
 (A) LH (B) endorphine (C) ACTH (D) androgen
- (C) 69 圖中新生兒左上肢經常維持在此種姿勢，其最可能的診斷為下列何者？  
 (A)鎖骨骨折  
 (B)手腕骨折  
 (C)臂神經叢上幹麻痺  
 (D)臂神經叢下幹麻痺




- (A) 70 54 歲病患，圖A 的CT 是二年前中風左側putamen 出血，一直在做復健，圖B 是最近所做的CT，發現中腦之雙側大腦腳不對稱，此乃因：


圖A



圖B



- (A) left cerebral peduncle atrophy due to Wallerian degeneration  
 (B) left cerebral peduncle atrophy due to previous hematoma compression  
 (C) right cerebral peduncle swelling  
 (D)中腦之雙側大腦腳不對稱，乃常見的正常變異 (normal variation)
- (D) 71 68 歲男性病人罹患惡性腫瘤，主訴骨頭疼痛。圖為本次就診之腰椎X 光攝影。最可能的骨轉移來源為何？  
 (A) thyroid cancer  
 (B) adrenal cancer  
 (C) renal cancer  
 (D) prostate cancer



- (D) 72 某醫院急診處，突然來了20位從火車站受到不明氣體外洩傷害的傷患。大多數傷患皆有呼吸困難、涕泗橫流及瞳孔縮小的現象。以下各種處置，何者最不恰當？  
 (A)應於急診外建立沖洗除污區  
 (B)醫護人員應至少有C級防護裝備  
 (C)應準備充足之解毒劑（如：atropine、PAM）  
 (D)除污應使用高壓，單一的強力水注沖洗病患
- (B) 73 一位74歲女性由家人陪同入急診求醫。主訴為一天前開始腹瀉，約有10次，黏液狀（mucoid）糞便。家人無同樣症狀。腹部偶爾會有絞痛感，無嘔吐，無發燒。病人10天前因為肺炎住院，前二天才出院，帶回家口服使用的藥物有Augmentin（amoxicillin with clavulanic acid）與acetaminophen，除此以外無使用其他藥物。依以上病史，你認為以下何者是最有可能造成此次腹瀉的病原？  
 (A) *Staphylococcus aureus* (B) *Clostridium difficile*  
 (C) *Pseudomonas aeruginosa* (D) Norwalk virus
- (C) 74 復健病房值班時，有頸椎損傷患者，頭痛、冒汗、起雞皮疙瘩，下列處置何者最適當？  
 (A)檢查喉嚨是否發紅，是否發燒，給予感冒、退燒藥  
 (B)詢問是否有習慣性偏頭痛，給予止痛藥  
 (C)檢查是否有膀胱過漲現象，必要時緊急導尿  
 (D)可能是緊張過度，給予鎮定劑
- (C) 75 75歲女性病患，背部疼痛多年，最近3個月加劇，經影像檢查除了主動脈鈣化明顯外，腰椎及椎體也有變化；圖A為腰椎側面X光攝影，圖B為電腦斷層掃描之橫切面。這位病患最可能的診斷為何？


圖A



圖B



- (A)感染性脊椎炎 (B)癌細胞骨轉移及病理性之壓迫性骨折  
 (C)骨質疏鬆症之壓迫性骨折 (D)外傷性壓迫性骨折
- (C) 76 42歲男性，自己摸到左側耳朵前方有一硬塊已有三個月，根據此注射顯影劑之CT，最適當的診斷是：



- (A) infectious lymphadenopathy  
 (B) metastatic lymphadenopathy  
 (C) parotid adenoma (Warthin's tumor)  
 (D) submandibular adenoma (mixed tumor)

(D) 77 一位懷孕25 週的年輕孕婦，騎機車不慎撞擊前方小轎車而到急診就醫。她有兩側手掌及膝蓋擦傷，她很擔心的請問急診室王醫師有關她胎兒的情況。請問王醫師針對胎兒的檢查中，何者最為恰當？

- (A)腹部電腦斷層掃描 (B)Kleihauer-Betke 試驗  
(C)骨盆腔內診 (D)胎兒心跳監測

(C) 78 圖中為胸椎損傷病人，每半個小時需做此動作，其最主要目的為何？

- (A)避免腰酸背痛  
(B)避免關節硬化  
(C)預防壓瘡  
(D)預防下肢水腫



(A) 79 一位42 歲婦女主訴頭痛，喉嚨痛和鼻充血帶有綠色黏狀分泌液已三天。但否認有發燒，胃腸症狀以及季節性過敏，或與病人接觸史。身體檢查：體溫36.8°C，脈搏82 次/分，呼吸16 次/分，血壓124/76 毫米汞柱，後口咽部呈現輕度發紅及腫脹，頸部柔軟，無淋巴節腫大，呼吸聲正常。被診斷為鼻竇炎（rhinosinusitis），其最常見的原因為何？

- (A)鼻病毒（rhinovirus）  
(B)肺炎鏈球菌（*Streptococcus pneumoniae*）  
(C)流行感冒嗜血桿菌（*Haemophilus influenzae*）  
(D)卡他莫拉克氏菌（*Moraxella catarrhalis*）

(D) 80 以下情況是涉及藥商與醫師的關係，何者在倫理上可以被接受？

- (A)某醫院的主任級醫師舉家出國旅行，藥商負責接送至機場及返家  
(B)某醫學中心腸胃科醫師有胃酸逆流的症狀，由藥商長期免費提供抑制胃酸分泌的藥物  
(C)某醫院某專科之晨會，長期由某藥商提供早餐  
(D)某藥商有一項新藥研發會議在國外舉行，藥商提供經費由醫院指派醫師參加

【版權所有，重製必究！】