

《精神科與社區衛生護理學》

- (C) 1 在精神科病房，常需使用約束措施，有關約束使用，下列何項正確？①保護病人不傷害病人自己 ②保護病人不傷害他人 ③緊急時不需告知病人，就可約束病人 ④執行約束時，需每 15 分鐘探視病人
(A)①②③ (B)②③④ (C)①②④ (D)①③④
- (B) 2 護理師對病人說：「你今天跟平常不一樣，你今天是自己鋪床而且很整齊」，此護理師是使用下列何種溝通技巧？
(A)陳述真實狀況 (presenting reality) (B)給予認知 (giving recognition)
(C)透露感受 (sharing perceptions) (D)提供訊息 (informing)
- (C) 3 下列有關認知功能評估的敘述，何者正確？
(A)「請問您住幾號房？」主要是在評估病人的抽象思考能力
(B)「請病人正反背誦數字」主要是在評估病人的計算能力
(C)「請告訴我，醫師為何開這種藥給您？」主要是在評估病人的病識感
(D)「請問失敗為成功之母是什麼意思？」主要是在評估病人的判斷能力
- (B) 4 陳先生 67 歲，公務員退休，心智功能正常，有高血壓病史，然而接受心導管手術後第二天，出現混亂、慌張、不安、定向障礙，小夜班時不斷拉鈴要求出去走走，大夜班時更將護理師當成媳婦，不斷抱怨責罵，請問您對陳先生的精神狀態，評估結果最可能是那一項？
(A)恐慌 (B)譫妄 (C)焦慮 (D)妄想
- (C) 5 下列有關錐體外徑症候群 (extrapyramidal syndrome, EPS) 的敘述，何者最正確？
(A)發生急性肌肉緊張異常 (acute dystonia)，最好建議病人暫時停藥
(B)流口水、手抖等類巴金森氏症的現象，通常在服藥初期發生
(C)遲發性運動不能 (tardive dyskinesia)，多發生於長期服用抗精神病藥物後
(D)靜坐不能 (akathisia)，例如來回走動多發生於開始用藥後4~5 天內
- (C) 6 吳先生在團體中總是主動且積極的發言，打斷別人的話題，好像希望全部的人只聽他說話，其行為屬於下列何種團體治療中的角色？
(A)守門員 (B)領導者 (C)獨占者 (D)解決者
- (D) 7 下列何種個案較適合採用「認知行為治療」協助其成長？
(A)思考脫離現實躁症個案
(B)器質性精神病個案
(C)70 歲的失智症個案
(D)30 歲的慮病症個案
- (B) 8 有關譫妄 (delirium) 與失智症 (dementia) 的區別，下列何者正確？
(A)失智症患者以觸幻覺症狀最為常見 (B)譫妄患者意識障礙波動大
(C)失智症患者主要以情感障礙為主 (D)譫妄患者會有失語症或執行功能障礙
- (D) 9 病人向護理師自我介紹：「我是大學二年級學生，現在是幼稚園老師，我在製鞋工廠上過班，我是商專畢業。」護理師說：「你是說你是商專畢業後在鞋廠工作，之後再去讀大學，讀到二年級，目前在幼稚園當老師。」請問護理師運用何種溝通技巧？
(A)澄清 (clarification)
(B)提出懷疑 (voicing doubt)
(C)依字面意義反應 (giving literal responses)
(D)將事件依先後次序排列 (placing the event in sequence)

- (C) 10 執行病人之行爲治療時，病人因要面臨行爲改變及新的適應方式，極易產生焦慮，甚至出現阻力，此時，護理師的下列反應中，何項正確？
(A)緩解其焦慮暫緩執行 (B)提供其多元化的環境
(C)持續給予支持與鼓勵 (D)增強其行爲的改變
- (A) 11 護理師對所護理的對象產生情感反轉移現象時，下列常見的行爲表現是：①難以同理病人的某些行爲表現 ②腦海中經常充滿與病人有關的想像 ③與病人有私人或社交性質的互動關係 ④從多元角度看待病人的問題與行爲表現
(A)①②③ (B)②③④ (C)①③④ (D)①②④
- (B) 12 王先生此次入院是因為在家自行停藥而發病，表示服藥造成不舒服，此次入院，下列藥物衛教處理措施何者正確？①向個案解釋藥物治療的作用 ②轉移注意力，不適症狀會漸漸緩解 ③建議個案以日誌記下用藥的感受、想法及行爲 ④在視線範圍內要求個案服下藥物
(A)①②③ (B)①③④ (C)②③④ (D)①②④
- (A) 13 有關抗精神病藥物惡性症候群 (neuroleptic malignant syndrome, NMS) 呈現之臨床症狀敘述，下列何項正確？①腎衰竭 ②血清肌酸酐磷酸酶 (creatinine phosphokinase, CPK) 上升 ③肌肉僵硬 ④牙關緊閉
(A)①②③ (B)②③④ (C)①②④ (D)①③④
- (C) 14 依據家庭理論對於精神分裂症的敘述，下列何者正確？
(A)低情緒表達的家屬比高情緒表達的家屬易出現排斥及拒絕個案
(B)個案常是家中最受寵的孩子，因而失去社會適應能力而產生症狀
(C)混淆不清的世代界線，易造成子女成爲精神分裂症患者
(D)患者自我 (ego) 較強，原我 (id) 較弱，致使內在產生衝突而呈現的症狀
- (A) 15 15 歲的林同學，因爲非常害怕蜘蛛，連蜘蛛相關的圖片都不敢看，看到教室的蜘蛛即緊張的大叫不已，且哭泣。林同學最可能的診斷爲：
(A)特殊畏懼症 (specific phobia) (B)社交畏懼症 (social phobia)
(C)懼曠症 (agoraphobia) (D)懼學症 (school phobia)
- (A) 16 下列有關「物質濫用」之敘述，最正確的是：
(A)包含心理、社會與靈性層面的問題
(B)是一種複雜、急性發作的疾病
(C)依賴者主要是缺乏意志力，須強制勒戒
(D)多重藥物濫用者較不易形成物質依賴者
- (D) 17 「酒精中毒治療」之「支持性療法」是指下列何者？
(A)加「抗巴金森藥物」治療顫抖情形
(B)出現譫妄及幻覺情形，併用「抗精神病藥物」
(C)運用「戒酒發泡錠」(disulfiram)，減弱飲酒的慾望
(D)補充「維他命B群」(vitamin B group)，減低神經系統症狀
- (C) 18 有關鋰鹽中毒的護理措施，何者正確？
(A)鋰鹽中毒濃度約爲0.6~1.0 mEq/L
(B)長期服藥的病人才會發生鋰鹽中毒
(C)中毒濃度過高時應該採用腹膜或血液透析
(D)病人若沒有出現意識不清或抽搐，應該未達中毒劑量
- (D) 19 有關憂鬱症的病因敘述，下列何者正確？
(A)正腎上腺素 (norepinephrine) 過高 (B)可體松 (cortisol) 分泌受抑制
(C)血清素 (serotonin) 分泌過高 (D)遺傳與環境因素

- (A) 20 有關藥物濫用的嚴重性敘述，下列何者正確？
 (A)安非他命會造成破壞性與攻擊性行爲，以及精神症狀的改變
 (B)BZD 類藥物濫用後，雖會產生欣快感，但不會產生心理依賴
 (C)FM2 (flunitrazepam, rohypnol) 使用後會產生放鬆或愉悅感，長期使用不會有耐藥性
 (D)大麻濫用後不會產生心理依賴與耐受性
- (B) 21 王先生 30 歲，任職於某外商公司，在會議和聚餐的場合，特別容易焦躁不安。下列何種焦慮最適合描述王先生的情況？
 (A)急性焦慮 (acute anxiety)
 (B)情境性焦慮 (situational anxiety)
 (C)廣泛性焦慮 (generalized anxiety)
 (D)重度焦慮 (severe anxiety)
- (C) 22 王小姐長期使用抗焦慮劑 BZD (benzodiazepine)，近日因離婚後意圖自殺，開始酗酒並服用BZD而入院治療，下列護理處置何者錯誤？
 (A)針對焦慮、顫抖之戒斷症狀，提供安全舒適之環境，並注意生命徵象之觀察
 (B)鼓勵王小姐表達內心感受，以合理方式處理內在衝突和壓力
 (C)提供所觀察之慣用防衛機轉，督促王小姐於短期住院中儘速改善
 (D)與王小姐討論可用之社會資源，鼓勵尋求協助

情況：吳先生29 歲，覺得自己的想法很快就被同事知道了，懷疑同事老是在背後講自己的壞話，感到壓力很大而不肯去上班，被家人帶來住院。依此回答下列第23 題至第24 題。

- (D) 23 護理師與吳先生互動中，下列有關護理師之回應何種適當？
 (A)「您為什麼會有這種想法呢？」
 (B)「不會吧！我想是您自己太多心了！」
 (C)「他們為什麼要這樣對您呢？」
 (D)「當您覺得同事知道您的想法時，您有何感受？」
- (C) 24 護理師與吳先生互動時，將會談焦點放在吳先生情緒的癥結處或問題所在，這項溝通原則在治療性人際關係建立過程的那一期進行為宜？
 (A)互動前期 (B)介紹期 (C)工作期 (D)結束期

情況：小美18 歲，原本是個外向活潑的女生，最近一個月以來出現情緒低落、失眠、注意力不集中，表示活得很辛苦，不想去上學，成績明顯退步。依此回答下列第25 題至第26 題。

- (B) 25 請問小美最可能罹患下列何種精神疾病？
 (A)恐慌症 (B)憂鬱症 (C)強迫症 (D)自閉症
- (B) 26 護理師評估小美之護理問題時，下列敘述何者正確？①評估個案時須包括家庭之互動型態 ②成長早期發展過程與現在問題無關 ③需同時評估身體與生理之發展 ④可邀請學校老師會談以了解在校情形
 (A)①②③ (B)①③④ (C)②③④ (D)①②④
- (B) 27 老年精神醫學常提到的三個「D」，下列何者正確？①憂鬱 (depression) ②妄想 (delusion) ③譫妄 (delirium) ④失智 (dementia)
 (A)①②③ (B)①③④ (C)②③④ (D)①②④
- (B) 28 下列何者為自閉症 (autism) 最常見的行為症狀？
 (A)坐立不安 (B)行為刻板 (C)排斥上學 (D)睡眠障礙
- (C) 29 陳小姐 17 歲，身高158 公分，體重43 公斤，一年前被診斷為暴食症，目前於精神科門診追蹤治療，在下列何種情況下醫師最可能建議陳小姐住院？
 (A)體重於半年內下降至40 公斤 (B)血清鉀濃度為3.5 mEq/L
 (C)出現計畫性自殺想法 (D)每週暴食2~3 次

- (B) 30 張先生診斷為schizophrenia，因欲引爆瓦斯而遭強制入院，入院時出現阻抗情形而與工作人員發生衝突，入院第二天，張先生來回在大廳踱步，並頻頻走向大廳門口，時而踢廳內的椅子。下列那一種護理措施較適當？
- (A)為了避免讓張先生感到害怕而激發暴力行爲，護理師應從其身後接近他
 (B)與張先生談話時至少維持一個手臂長的距離
 (C)請張先生與護理師一同進到房間，將門關上，鼓勵他說出現在的情緒
 (D)拍拍張先生肩膀以紓緩緊張的情緒

情況：小晴罹患精神疾病多年，目前住在家中，總覺得自己是家人的恥辱，鄰居也常會對自己指指點點。依此回答下列第 31 題至第33 題。

- (D) 31 以小晴爲例，下列何者最能呈現社會對精神病患的觀點？
- (A)此現象爲疾病標籤，經常會使病患提早就醫
 (B)家屬常覺得是祖先前世作孽，故與自己或病患無關
 (C)民眾對於精神病患並未有偏差看法
 (D)家屬因此求神問卜不就醫
- (C) 32 小晴覺得自己再也無法承受別人的眼光，想要結束生命。護理師的回應，下列何者最合宜？
- (A)「我覺得你不需要這樣想！」
 (B)「我相信你一定會復原的。」
 (C)「說說看，這當中最讓你感到痛苦的經驗是什麼？」
 (D)「選擇結束生命，是很懦弱的表現。」
- (A) 33 小晴在護理師的鼓舞下，決定參加精神病患病友團體。有關病友團體的主要功能，下列何者最正確？
- (A)發揮同舟共濟、相互支持的精神
 (B)匯集力量向媒體宣言
 (C)避免病患被其他病友排擠
 (D)相較於專業人員，精神病患病友團體較不易提供病患或家屬實質的幫助
- (A) 34 護理師在照顧慢性精神病患時，下列何項護理措施最可以增進其維護健康的能力？
- (A)須提供個案具體化指導措施，以利其執行
 (B)最好是用「是或否」的問句形式，以引導個案回答問題
 (C)進行衛教指導或回覆示教時，多用強制策略，會有較佳效果
 (D)儘量多使用批判方式，激發個案潛能
- (C) 35 依據精神衛生法，下列何者爲精神疾病強制鑑定強制社區治療審查會的組成成員？①病患本人 ②專科醫師 ③護理師 ④心理師 ⑤病人權益促進團體代表 ⑥法律專家
- (A)①②③④⑥ (B)①②③④⑤ (C)②③④⑤⑥ (D)①②③⑤⑥
- (D) 36 王先生精神分裂症，因嚴重妄想及幻聽干擾，自我照顧能力差而身體異味重，且出現破壞家中物品，以及攻擊父親而遭強制住院治療，下列何者應爲其優先之照護活動？
- (A)王先生一入院，應立即給予預防性約束，以免因症狀明顯，不願留下住院而再出現攻擊行爲，波及其他病友
 (B)面質個案之憤怒感受，探討暴力發生之行爲導因，預防個案再出現暴力
 (C)立即請人協助處理王先生之個人清潔，以保持衛生
 (D)確認王先生過去暴力原因與徵兆，積極觀察以利防範
- (D) 37 佛洛伊德 (Sigmund Freud) 主張精神疾病乃起因於潛意識中早期未解決的衝突，是屬於下列何者？
- (A)妖魔化身 (B)人道關懷 (C)描述性精神醫學 (D)心因性病因論

- (D) 38 憂鬱症的病人最常使用下列何種心理防衛機轉 (defense mechanism) ?
(A) 合理化 (rationalization) (B) 投射作用 (projection)
(C) 認同作用 (identification) (D) 內射作用 (introjection)
- (B) 39 方老太太患有失智症，常夜裡走錯房間，闖入家人的臥房，嚴重影響家人的睡眠，對此困擾，下列那一項建議最恰當？
(A) 白天多帶老太太出門散步或活動 (B) 在房門上放置大而明顯標記
(C) 按醫囑給與適量藥物幫助睡眠 (D) 將老太太反鎖在房間內
- (B) 40 有關「海洛因」依賴者施行的「美沙冬 (methadone) 替代性療法」，下列何者正確？
(A) 「美沙冬」是三級毒品 (B) 具有減低疾病感染及犯罪之目的
(C) 吸毒累犯並不適用 (D) 個案接受替代療法的時間越短，其未來的預後越好
- (D) 41 臺灣某社區 65 歲以上的性比小於1，代表的意義為何？
(A) 65 歲以上女性死亡人數多於男性 (B) 65 歲以上男性死亡人數多於女性
(C) 65 歲以上男性多於女性 (D) 65 歲以上女性多於男性
- (C) 42 有關腸病毒感染特徵的敘述，下列何者正確？
(A) 感染過腸病毒者，以後不會再感染 (B) 流行季節是冬季
(C) 傳染途徑為直接接觸傳染 (D) 感染後，約在二天內出現症狀
- (A) 43 A 社區有1,000 人口，社區護理師在年初對其進行空腹血糖抽血檢查，發現有200 人的空腹血糖值超過正常，經過一年，邀請這1,000 位受檢者回診，發現有250 人的空腹血糖值超過正常，下列敘述何項正確？
(A) 第一次抽檢空腹血糖過高的盛行率為20%
(B) 第二次抽檢空腹血糖過高的發生率為25%
(C) 空腹血糖過高的總盛行率為45%
(D) 空腹血糖過高的發生率為50%
- (A) 44 以直接標準化調整，比較甲乙兩地死亡率，其目的為何？
(A) 消除人口組成差異所產生之誤差 (B) 降低死亡人數過少所造成的干擾
(C) 將死亡人數調整為同一水平 (D) 減少老年人口過高造成的干擾
- (A) 45 醫療網規劃中，建立分級醫療作業制度與轉診系統之目的為何？
(A) 期使醫療資源分布較均勻，使用較合理 (B) 避免健康醫療化，減少醫療專制
(C) 促進醫療自由競爭，降低專業人員的負擔 (D) 醫療資源升級，擴充人民的需求
- (D) 46 社區夥伴關係 (collaborative partnership) 的描述，下列何者正確？
(A) 著重於專家的指導 (B) 民眾參與不是重要考量
(C) 目標在爭取夥伴關係中更多的權力與代表性 (D) 促進成員中的相互支持與互動
- (D) 47 偏遠地區之醫療資源較不足，為達全民均健的目標，在偏遠地區之重要健康保健策略應為：
(A) 急重症醫療 (B) 醫院醫療 (C) 專科醫療 (D) 基層醫療保健
- (B) 48 下列何項衛生統計指標可以用來比較兩地婦女的生育能力？
(A) 一般生育率 (B) 年齡別生育率 (C) 毛繁殖率 (D) 淨繁殖率
- (C) 49 社區護理師擔任主持人邀請社區領導人、民眾與其他相關人員共同參與會議，討論社區所需的健康服務，此方法為：
(A) 參與性觀察 (B) 擋風玻璃式調查 (C) 民意團體過程 (D) 個案調查
- (A) 50 陳先生發生車禍，又逢喪妻之痛，家中尚有一位年老母親與兩位國小孩童，鄰里發揮愛心，募款並分別輪流協助照顧陳先生家中的飲食，此現象屬於華倫 (Warren) 所列舉社區五大功能中的那一種？
(A) 互相支援 (B) 社會參與 (C) 社會控制 (D) 生產—分配—消費

- (D) 51 考慮護理師的能力及解決問題的快速性，下列何項社區健康問題應優先處理？
(A)火災的預防 (B)老人醫療保健缺乏 (C)青少年性氾濫 (D)子宮頸篩檢比率偏低
- (C) 52 為培養社區獨立解決問題的能力，下列何種方式最適當？
(A)分析社區檔案 (B)領導統御 (C)充分賦權 (D)訂定績效指標
- (B) 53 依據健康信念模式，某位男性指出「因為遺傳的傾向，將來我會和父親一樣罹患糖尿病」，是：
(A)行動的線索 (B)疾病的易感性認知
(C)疾病嚴重性認知 (D)預防性健康行為障礙的認知
- (C) 54 教導個案戒菸的方法並實施公共場所禁菸的政策，是應用渥太華憲章主張的健康促進的那些優先行動？①建立公共政策 ②強化社區行動 ③發展個人技巧 ④重新定位健康服務
(A)①② (B)②③ (C)①③ (D)②④
- (C) 55 細菌性食物中毒，下列何者致死率最高？
(A)金黃色葡萄球菌 (B)黃麴黴菌 (C)肉毒桿菌 (D)沙門氏菌
- (A) 56 越南籍產婦阮氏自然產下一足月男嬰，住院三日後出院，社區護理師接獲此新生兒通報，進行家庭訪視，請問此次訪視的主要目的為何？
(A)確認產婦照顧新生兒的能力 (B)為新生兒施打B 型肝炎疫苗
(C)建議為新生兒進行先天性代謝異常篩檢 (D)確認產婦是否遵從臺灣坐月子規範
- (A) 57 新住民阮氏照顧全身癱瘓的先生已一年，照護情況良好，但主訴很疲累、很想休息，當社區護理師告知可使用喘息服務時，阮氏表示無法自行決定，針對此狀況，社區護理師需進一步評估下列何者？
(A)家庭的權力結構 (B)家庭的社會化功能
(C)家庭的發展階段 (D)家庭的照護能力
- (A) 58 張老太太是位失智患者，有短期記憶障礙、猜忌及誤食物品等問題，由媳婦照顧日常生活，生病前婆媳關係不佳，社區護理師訪視時，案媳憤怒表示婆婆故意與她作對，跟其他親友告狀媳婦沒有給與食物吃，社區護理師採取的護理措施，下列何者錯誤？
(A)勸導張老太太體諒媳婦辛苦 (B)向案媳解說疾病特性
(C)建議案媳將危險及不可食的物品收納好 (D)轉介案媳參加照顧者支持團體
- (D) 59 因阮氏希望於產後坐完月子，就到家裡經營的工廠幫忙，所以她覺得還是餵配方奶比較方便。社區護理師於家訪時給予的建議，何者不合適？
(A)坐月子期間，是建立成功泌乳的最佳時機
(B)在家人的支持與鼓勵，可參加哺乳支持團體
(C)上班時定時將乳汁擠於集奶袋中，置於冰箱中保存，可持續母乳哺餵
(D)上班時請家人餵牛奶，下班後再餵母乳
- (A) 60 山地離島偏遠地區因地理環境特殊，就醫資源及健康照護屬於相對弱勢，為強化其健康照護，目前政策與措施，下列何者錯誤？
(A)鼓勵都會區名醫前往服務，強化醫療品質
(B)補助山地離島硬體設施、巡迴醫療車、資訊醫療設備
(C)推動偏遠部落醫療資訊化
(D)推動偏遠部落社區健康營造
- (C) 61 校園是提供學童學習良好體適能的場所，有關評估學生體適能的描述，下列何者錯誤？
(A)跑800 公尺測量學生的心肺耐力
(B)仰臥起坐測量學生的肌耐力
(C)定期量血壓測量學生的血流動力學
(D)坐姿體前彎測量學生的柔軟度

- (A) 62 陳護理師之公司有近一半員工為女性，因輪班導致許多女職員近三年未做子宮頸抹片檢查，陳護理師聯絡衛生單位提供行動醫療車協助，在工作場所設立抹片站，依據健康信念模式，此措施之目的為何？
 (A)減少員工對子宮頸抹片檢查之障礙 (B)增進員工對罹患子宮頸癌之可能性認知
 (C)增進員工對子宮頸抹片檢查之認同 (D)提升員工對罹患子宮頸癌嚴重性之認知
- (D) 63 下列何者罹患代謝症候群？
 (A)林先生－身體質量指數：27，收縮壓/舒張壓：162/100 mmHg，三酸甘油酯：160 mg/dL
 (B)王先生－空腹血糖：110 mg/dL，收縮壓/舒張壓：120/85 mmHg，腰圍：85 公分
 (C)張女士－空腹血糖：110 mg/dL，高密度脂蛋白膽固醇：55 mg/dL，腰圍：81 公分
 (D)曾女士－三酸甘油酯：160 mg/dL，收縮壓/舒張壓：140/90 mmHg，腰圍：85 公分
- (C) 64 對於血脂異常的處理原則，下列那些描述是正確的？①應優先選擇3~6 個月飲食治療 ②定期檢查心臟超音波 ③減重、運動與戒菸是其他的非藥物治療方式 ④增加個案對血脂異常的認識
 (A)①②③ (B)①②④ (C)①③④ (D)②③④
- (D) 65 下列那些是慢性病的特色？①需要密集的醫療照護 ②潛伏期長須終生控制 ③初期無明顯症狀 ④常殘留殘障或機能不全
 (A)①②③ (B)①②④ (C)①③④ (D)②③④
- (C) 66 王媽媽 74 歲，最近被診斷為糖尿病，目前以飯後口服降血糖藥物進行治療。她習慣每天早餐前先到公園運動跳元極舞，再回家吃稀飯當早餐。對於這樣的運動與飲食習慣，社區護理師的建議，下列何者最為適當？
 (A)可以維持原先運動與飲食習慣 (B)飯後立即運動以免低血糖
 (C)飯後一小時再運動 (D)早餐選擇稀飯有助於血糖穩定
- (A) 67 發展改善社區健康的執行策略時，需要考慮的因素中，下列何者錯誤？
 (A)重要人物的政治立場 (B)執行策略時可能遭遇的障礙
 (C)未執行該策略之可能後果 (D)策略行動之優先順序
- (C) 68 2009 年開始，我國中老年保健的重點工作，下列何者錯誤？
 (A)整合性篩檢服務 (B)成人預防保健服務
 (C)整合性老人癌症治療 (D)老人健康促進
- 情況：李先生45 歲，是一家之主，因車禍後變成植物人，經醫院診治後準備返家照顧，李先生使用鼻胃管、尿管及氣切管，家中還有80 歲疑似失智症的父親、專職家管的妻子及小學三年級的兒子。依此回答下列第69 題至第71 題。
- (A) 69 關於李先生出院準備的時機，下列敘述何者正確？
 (A)一入院就須進行出院準備服務 (B)病情穩定已確定出院時再執行出院準備服務
 (C)依家庭照顧者照顧能力決定出院準備服務的時機 (D)出院前都可以
- (A) 70 李先生出院後決定由家人照顧，其資源需求，下列何者錯誤？
 (A)轉介居家職能治療進行居家環境改造
 (B)建議使用居家服務協助部分照顧人力
 (C)評估家庭經濟狀況協助取得相關經濟資源協助
 (D)轉介居家護理
- (D) 71 面對李先生的父親逐步退化情形，李太太可以做的事項，下列何者錯誤？
 (A)請個案管理師初步篩檢後再帶去醫院確診
 (B)直接到醫院由醫師利用臨床診斷失智症
 (C)可請居家護理師協助以簡易心智量表 (MMSE) 評估
 (D)自行購買藥物治療

- (B) 72 政府制定酒醉駕車罰則，以維護交通安全的政策是屬於健康促進介入措施中的那一種？
(A)教育 (B)社會改變 (C)賦權 (D)行為改變
- (A) 73 「依賴人口指數」是以何種方式呈現？
(A)比例 (ratio) (B)分率 (proportion) (C)比率 (rate) (D)百分比 (percent)
- (C) 74 社區健康營造的實施期程，在行銷籌備期的目標為何？
(A)成立功能性委員會 (B)進行社區衛生計畫
(C)使社區居民接納欲推動的計畫 (D)進行社區評價與回饋
- (B) 75 社區護理師收集社區居民的社經狀態、貧戶比率及職業分布等資料，此乃評估社區中的何項系統？
(A)福利系統 (B)經濟系統 (C)政治系統 (D)娛樂系統
- (C) 76 為社區中 30 歲以上婦女舉辦子宮頸癌防治衛生教育，並同時提供子宮頸抹片篩檢，此一活動是屬於三段五級預防中的那些概念？①促進健康②特殊保護③早期診斷④早期治療
(A)①② (B)②③ (C)①③ (D)③④
- 情況：小英14 歲女生，身高150 公分，體重45 公斤，表示擔心自己的體型問題，因此到健康中心找護理師。依此回答下列第77 題至第78 題。
- (B) 77 請問小英的 BMI (body mass index) 為何？
(A) 13.5 (B) 20.0 (C) 22.5 (D) 30.0
- (A) 78 依據小英的 BMI (body mass index)，護理師最適合的回答方式為何？
(A)妳覺得妳的體型有什麼問題
(B)看起來BMI 偏高，建議要多運動
(C)看起來BMI 正常，建議維持現在的體型
(D)看起來BMI 偏高，建議減少脂肪的攝取
- (D) 79 下列那些傳染病是可經由病媒 (昆蟲) 傳染的？①猩紅熱②百日咳③日本腦炎④瘧疾
(A)①② (B)①③ (C)②③ (D)③④
- (C) 80 評估婦幼衛生保健工作成效的最佳指標為：
(A)粗死亡率 (B)孕產婦死亡率 (C)嬰兒死亡率 (D)新生兒死亡率



【版權所有，重製必究！】