

# 《醫學(三)》

- (B) 1 一位 49 歲女性病患因上腹以及左上腹區域疼痛約2 至3 天而求診，急診室的檢查結果顯示 Hb 10.4 g/dL，WBC 分類N/L 79.9%/14.5%，glucose 115 mg/dL，BUN 13 mg/dL，creatinine 0.9 mg/dL，CRP10.8 mg/L，lipase 173 U/L，amylase 67 U/L，triglyceride 1634 mg/dL。下列何項檢查最可能確定診斷？  
(A)上消化道內視鏡 (UGI endoscopy) (B)腹部電腦斷層檢查 (abdominal CT scan)  
(C)大腸鏡檢查 (colonoscopy) (D)腫瘤標記檢查 (tumor markers)
- (C) 2 一位 80 歲的男性病人因跌倒至急診就診，他的家人拿出他平日在服用的藥物，下列何者最不可能導致他跌倒？  
(A)alprazolam (B)zolpidem (C)omeprazole (D)chlorothiazide
- (D) 3 下列何者並非診斷全身性發炎反應症候群 (systemic inflammatory response syndrome) 的準則？  
(A)發燒 (口溫超過38°C) 或體溫過低 (小於36°C)  
(B)呼吸次數每分鐘超過24 次  
(C)心跳次數每分鐘超過90 次  
(D)血液培養出細菌
- (C) 4 一位病人因體重減輕而來就診，適當之初步檢驗 (initial testing) 不包括下列何者？  
(A)全血球計數 (CBC) (complete blood count) (B)肝功能生化檢查  
(C)上消化道內視鏡 (D)胸部X 光檢查
- (D) 5 一位 47 歲男性病人因再生不良性貧血而長期接受輸血治療，病人全身皮膚呈現鐵灰色，血中ferritin 高於正常值500 倍，下列何種併發症與長期輸血無關？  
(A)心肌病變 (cardiomyopathy) (B)肝硬化 (liver cirrhosis)  
(C)糖尿病 (diabetes mellitus) (D)白內障 (cataract)
- (C) 6 下列何者較不易引起血管擴張？  
(A)bradykinin (B)BNP (brain natriuretic peptide)  
(C)endothelin (D)ANP (atrial natriuretic peptide)
- (ABCD) 7 最常見的持續性心律不整為何？  
(A)上心室性心搏過速 (supraventricular tachycardia)  
(B)心室性心搏過速 (ventricular tachycardia)  
(C)心房顫動 (atrial fibrillation)  
(D)心房撲動 (atrial flutter)
- (C) 8 一位 35 歲女性病人，已生二子，目前服用避孕藥，健康檢查及多次在家自量血壓介於 138/88 mmHg 至150/94 mmHg 之間。身體診查及健診檢驗皆為正常。下列處置何者最為恰當？  
(A)給予利尿劑治療高血壓  
(B)給予鈣離子阻斷劑治療高血壓  
(C)請病人和其婦產科醫師討論是否停止服用避孕藥，並定期測血壓及回診  
(D)給予angiotensin-converting enzyme inhibitor (ACEI) 治療高血壓
- (C) 9 先天性 QT 延長症候群 (congenital long QT syndrome)，最常見的遺傳變異為何？  
(A)鈉離子通道之突變 (B)鈣離子通道之突變  
(C)鉀離子通道之突變 (D)氯離子通道之突變

- (D) 10 一位 46 歲男性糖尿病病人，有蛋白尿 (proteinuria)，且血壓介於150/90 mmHg 至160/94 mmHg 之間。首選藥物是下列那一種？  
(A)乙型交感神經阻斷劑 ( $\beta$ -adrenergic receptor blocker)  
(B)甲型交感神經阻斷劑 ( $\alpha$ -adrenergic receptor blocker)  
(C)利尿劑 (diuretics)  
(D)angiotensin-converting enzyme inhibitor (ACEI)
- (C) 11 下列何者非主動脈瓣閉鎖不全 (aortic regurgitation) 的身體診查所見？  
(A)Corrigan's pulse  
(B)de Musset's sign  
(C)elevated diastolic BP  
(D)Austin Flint murmur
- (A) 12 二尖瓣 (僧帽瓣) 閉鎖不全與主動脈瓣膜狹窄的心雜音，一般而言不能由下列那一項特徵來區分？  
(A)一為收縮期雜音，另一為舒張期雜音  
(B)雜音的特徵及期間，一為全收縮期，較soft；另一為漸強漸弱型收縮期雜音，較harsh  
(C)雜音radiation 不同，一至左腋下，另一至頸動脈  
(D)心雜音最大強度，一在心尖部位，另一在右第二肋間 (心底部位)
- (B) 13 張先生60 歲，因罹患高血壓、糖尿病長期規律服藥，最近2 天，走幾步路就會呼吸急促，睡覺時無法平躺，坐著呼吸才比較舒服，另外走路時胸口悶痛，坐著休息時胸悶就比較緩解，最近胸痛的頻率也比以前增加。張先生到急診求診，血壓160/90 毫米汞柱，心跳每分鐘130 下，體溫攝氏37 度，呼吸每分鐘25 次，在無使用氧氣之下的血氧濃度88%，身體診查呈現如下，頸靜脈怒張 (jugular vein engorgement)，於心尖處有第2 度 (Grade II/VI) 心收縮雜音，S3 奔馬音 (S3 gallop)，雙側均有肺囉音 (rales)，雙下肢水腫，心電圖呈現竇性心搏過速 (sinus tachycardia) 與V4-V6 有ST 段下降，胸部X 光片呈現心臟肥大與肺水腫，對於張先生此次到急診的診斷，下列何者最不恰當？  
(A)心臟衰竭 (B)肺心症 (cor pulmonale)  
(C)急性肺水腫 (D)急性冠心症
- (C) 14 承上題，對於張先生的處置，下列何者最不恰當？  
(A)給予氧氣與生理監測器 (B)靜脈注射嗎啡  
(C)靜脈注射生理食鹽水 (D)靜脈注射利尿劑
- (D) 15 巴洛氏食道 (Barrett's esophagus) 是下列何種癌症的危險因子 (risk factor) ？  
(A)胃腺癌 (gastric adenocarcinoma)  
(B)胃腸基質瘤 (gastrointestinal stromal tumor)  
(C)食道鱗狀細胞癌 (esophageal squamous cell carcinoma)  
(D)食道腺癌 (esophageal adenocarcinoma)
- (C) 16 一位45 歲婦人主訴食慾不振，腹部不適及皮膚發黃，實驗室檢查數據如下：prothrombin time 延長，alkaline phosphatase (ALP) 350 U/L，GGT 280 U/L，ALT 60 U/L，AST 50 U/L，total bilirubin 7.0 mg/dL，direct bilirubin 4.2 mg/dL。下列何項步驟或敘述最不恰當？  
(A)應予病患補充維他命K  
(B)病患應先接受腹部超音波檢查  
(C)病患應立即進行經皮穿膽管引流術 (PTCD)  
(D)病患之尿液膽紅素 (bilirubin) 會增加，而糞便黃疸色素原 (urobilinogen) 會減少


- (BD) 17 關於原發性膽道性肝硬化症 (primary biliary cirrhosis) 的敘述，下列何者錯誤？  
(A)絕大多數發生在中年女性  
(B)血清生化檢查，主要顯示典型膽汁滯留的變化，ALP 及GGT 明顯升高，AST、ALT 僅呈輕度升高，膽紅素升高以間接型膽紅素為主  
(C)90%患者的AMA 抗體皆呈陽性，可與自體免疫肝炎 (autoimmune hepatitis) 及原發性硬化性膽道炎 (primary sclerosing cholangitis) 作鑑別  
(D)目前認為ursodeoxycholic acid 能延長患者壽命，且延遲肝移植
- (C) 18 有關非類固醇抗發炎藥物 (NSAIDs) 引起的胃病變敘述，下列何者正確？  
(A)同時服用aspirin 及COX-2 抑制劑與只用COX-2 抑制劑的腸胃出血風險相當  
(B)抗血小板藥物clopidogrel 並不會引起胃腸出血  
(C)發生胃腸出血的風險為indomethacin > diclofenac > ibuprofen  
(D)COX-2 抑制劑可減少胃腸出血的風險，但可能增加心血管風險，而非選擇性NSAID 則不會增加心血管風險
- (D) 19 一位肝硬化患者因為大量吐血至急診處接受緊急上消化道內視鏡檢查，發現胃及食道靜脈曲張 (varices) 出血，此患者之門脈壓 (portal pressure，以wedge-to-free gradient 測量) 最有可能為：  
(A)5~7 mmHg (B)8~10 mmHg (C)10~12 mmHg (D)13~15 mmHg
- (B) 20 下列何者不會增加胃腺癌 (gastric adenocarcinoma) 的風險？  
(A)幽門螺旋桿菌感染 (B)O 型血型 (C)胃部分切除術後20 年 (D)惡性貧血
- (AD) 21 下列有關炎症腸病 (inflammatory bowel disease) 的敘述，何者錯誤？  
(A)潰瘍性大腸炎 (ulcerative colitis, UC)，只侵犯大腸；克隆氏病 (Crohn's disease, CD)，從口腔到肛門都可能侵犯  
(B)UC 為廣泛性黏膜發炎；CD 呈斑塊性深層發炎，可能形成膿瘍、瘻管  
(C)UC 及CD 皆有癌變之可能，尤其患病8 年以上時為然  
(D)抽菸在CD 病人有利於減輕症狀，但停抽時反會惡化；但對UC 病人則只會使症狀惡化
- (C) 22 臨床上偶見雙側卵巢轉移癌 (Krukenberg tumor)，最可能由何種細胞型態的消化系原發癌發生轉移？  
(A)鱗狀上皮細胞癌 (B)不分泌黏液之腺癌 (C)分泌黏液之腺癌 (D)肝細胞癌
- (C) 23 下列何者為肝癌之主要轉移部位？  
(A)胃及腸 (B)胃及胰 (C)腹部淋巴結及肺 (D)腹部淋巴結及腎
- (D) 24 與消化道類癌 (carcinoid tumor) 引起之類癌症候群 (carcinoid syndrome)，無關之症狀為下列何者？  
(A)顏面潮紅 (B)糙皮病 (pellagra) (C)氣喘樣症狀 (D)便秘
- (D) 25 下列何種利尿劑可以用來治療先天性腎性尿崩症 (congenital nephrogenic diabetes insipidus) 所引起之多尿症？①thiazides ②loop diuretics ③acetazolamide ④amiloride  
(A)①② (B)②③ (C)②④ (D)①④
- (C) 26 下列那一個病例較符合所列之動脈血氣體分析和血清電解質的檢查結果？pH 7.32，PaO<sub>2</sub> 110 mmHg，PaCO<sub>2</sub> 30 mmHg，HCO<sub>3</sub><sup>-</sup> 18 mEq/L；Na<sup>+</sup> 138，K<sup>+</sup> 3.5，Cl<sup>-</sup> 97 (電解質的單位是mmol/L)  
(A)70 歲病人因便秘嚴重，服用magnesium sulfate 導致腹瀉數天  
(B)28 歲病人診斷為修格連氏症候群 (Sjögren's syndrome)，無意間發現腎鈣化 (nephrocalcinosis)，尿液酸鹼值為6.5；給予NH<sub>4</sub>Cl (0.1 g/kg 體重) 後，尿液酸鹼值為6.0  
(C)20 歲病人第一型糖尿病病史5年，血糖控制不佳，最近因為期末考胰島素注射次數減少

- (D)60 歲病人因膽道阻塞放置引流管引流膽汁
- (D) 27 一位 33 歲男性因早上無法起床被送至急診處。病人過去無特殊病史，半年前發現血壓偏高，但他並不在意且沒服藥物。身體診查：脈搏每分鐘98 下，血壓178/110 mmHg，無貧血或黃疸，胸腔、心臟和腹部檢查正常。血液電解質 (mmol/L)： $\text{Na}^+$  139， $\text{K}^+$  2.5， $\text{Cl}^-$  89。有關於此病人進一步的診斷和處置，下列何者最不適切？  
(A)檢查尿液的鉀離子濃度和滲透壓，以及血清滲透壓 (B)檢查甲狀腺功能  
(C)檢查血漿皮質醛固酮 (aldosterone) 濃度 (D)心臟超音波檢查
- (B) 28 承上題，此病人最不需考慮下列那個診斷？  
(A)原發性皮質醛固酮症 (primary aldosteronism)  
(B)巴特氏症候群 (Bartter's syndrome)  
(C)葛拉夫思氏疾病 (Graves' disease)  
(D)高安氏動脈炎 (Takayasu's arteritis)
- (B) 29 與 Sjögren's syndrome 的診斷最無關的檢查為：  
(A)sialoscintigraphy (B)HLA-DR2 檢測  
(C)嘴唇的小唾液腺組織切片檢查 (biopsy of lip minor salivary gland) (D)Schirmer's test
- (ABCD) 30 下列何者不是急性腎衰竭病人接受緊急血液透析治療的適應症？  
(A)BUN 120 mg/dL，creatinine 2.5 mg/dL  
(B)血鉀值大於7 mEq/L，且Kayexalate (sodium polystyrene sulfonate) 治療效果不佳  
(C)心包膜積水  
(D)肺水腫
- (D) 31 下列那一個病例不符合所列之動脈血氣體分析和血清電解質的檢查結果？pH 7.49， $\text{PaO}_2$  90 mmHg， $\text{PaCO}_2$  48 mmHg， $\text{HCO}_3^-$  32 mEq/L； $\text{Na}^+$  140， $\text{K}^+$  2.7， $\text{Cl}^-$  92 (電解質的單位是 mmol/L)  
(A)40 歲甲病人，血壓160/108 mmHg，血漿腎素活性0.12 ng/mL/hr (正常值1.0-3.5 ng/mL/hr)  
(B)20 歲乙女性，使用利尿劑 (hydrochlorothiazide) 減重  
(C)40 歲丙病人，血壓162/102 mmHg，長期食用甘草 (licorice)  
(D)60 歲丁病人使用acetazolamide 治療青光眼
- (B) 32 承上題，那位病人給予生理食鹽水後可以矯正其電解質和酸鹼的不平衡？  
(A)甲病人 (B)乙病人 (C)丙病人 (D)丁病人
- (C) 33 下列有關 Lyme arthritis 的敘述，何者正確？  
(A)類固醇為首選治療藥物 (B)通常對口服doxycycline 的治療無效  
(C)由Borrelia burgdorferi 感染所引起 (D)以侵犯手指或腳趾的小關節為主
- (B) 34 根據 1982 年美國風濕病學院所制定的全身性紅斑狼瘡 (SLE) 的11 項分類準則中符合4 項即可診斷。下列何種組合最符合SLE 的診斷？  
(A)臉頰部紅斑，發燒，關節疼痛及口腔黏膜潰瘍  
(B)抗核抗體陽性，抗dsDNA 抗體升高，尿蛋白1.25 公克/天，以及血小板數為68,000/ $\mu\text{L}$   
(C)多發性關節炎，抗核抗體陽性，白血球增加及肋膜炎  
(D)多發性關節痛，口腔黏膜潰瘍，抽搐及血清補體C3 降低
- (A) 35 對於嚴重之第四型狼瘡性腎炎，目前最被推薦之二種細胞毒害藥物 (cytotoxic drugs) 為何？  
(A)cyclophosphamide 或mycophenolate mofetil (B)cyclosporine 或cyclophosphamide  
(C)azathioprine 或methotrexate (D)azathioprine 或cyclophosphamide

- (C) 36 一位 70 歲男性淋巴瘤病人，分期為Ann Arbor 第四期，血清LDH 值6,500 U/L（正常＜200 U/L），患者在接受化學治療兩天後發生呼吸急促、寡尿、抽筋等症狀，此時抽血檢查，下列結果何者最不可能出現？  
(A)血鉀過高 (B)血中pH 值偏酸 (C)血磷過低 (D)血鈣偏低
- (B) 37 承上題，對於該患者之緊急處置下列何者最不需要？  
(A)靜脈注射NaHCO<sub>3</sub>，鹼化血中pH 值 (B)給予口服allopurinol  
(C)給予靜脈注射rasburicase (D)靜脈注射鈣離子
- (B) 38 在有慢性溶血疾病的病人，下列何種病毒感染會導致暫時性的再生不良性貧血（transient aplastic crisis）？  
(A)human immunodeficiency virus（HIV） (B)Parvovirus B19  
(C)Coxsackievirus (D)Enterovirus
- (C) 39 下列何種藥物會使Lambert-Eaton 肌無力症候群症狀惡化？  
(A)利尿劑 (B)氣管擴張劑 (C)鈣離子通道阻斷劑 (D)抗組織胺
- (B) 40 一位 40 歲女性病患，右側頸部有二個固定且無痛性腫塊，皆約2 2 公分，經切片檢查證實為瀰漫性B 細胞淋巴瘤（diffuse large B cell lymphoma），下列檢查或治療，何者最不適當？  
(A)抽血檢查lactate dehydrogenase (B)使用單株抗體藥物trastuzumab 治療  
(C)骨髓切片檢查 (D)電腦斷層檢查
- (C) 41 下列腫瘤在 advanced stage 時仍有治癒之可能，何者除外？  
(A)淋巴瘤 (B)生殖細胞瘤  
(C)肝癌 (D)神經母細胞瘤（neuroblastoma）
- (B) 42 一位 78 歲攝護腺癌病人對荷爾蒙療法已無效且發生全身骨骼轉移，疼痛指數常在7 分以上（0~10 分），該病人經評估後已不適合作化學治療及放射性療法，其疼痛已無法以一般止痛藥物控制，下列何者治療較恰當？  
(A)每週靜脈注射雙磷酸鹽zoledronate 及不定時使用短效嗎啡  
(B)口服短效嗎啡，每3~4 小時一次，調整劑量直到穩定後改為長效嗎啡  
(C)當病人發生疼痛時給予適量短效嗎啡，待穩定後改為長效嗎啡  
(D)直接給予長效嗎啡，避免影響患者睡眠
- (D) 43 承上題，上述病人在使用嗎啡之後，嗎啡成癮之機率大約為：  
(A)10% (B)5% (C)3% (D)小於0.1%
- (C) 44 一位 68 歲男性，罹患慢性阻塞性肺疾多年，近日咳嗽及呼吸困難加劇前往急診處就醫。身體診查發現患者意識清楚，呼吸急促，及胸部聽診有呼氣喘鳴聲。胸部X 光片沒有肺炎之現象，其呼吸空氣時動脈血液氣體分析顯示pH 7.274，PaCO<sub>2</sub> 78 mmHg，PaO<sub>2</sub> 40 mmHg，HCO<sub>3</sub><sup>-</sup> 36 mEq/L，BE +9 mEq/L。給予氧氣後，下列何者為最優先且適當之處置？  
(A)迅速給予氣管內插管及使用呼吸器以改善急性呼吸衰竭  
(B)給予重碳酸鈉輸液來改善酸血症  
(C)給予支氣管擴張劑吸入治療，並考慮使用非侵襲性呼吸器治療  
(D)給予口服類固醇治療
- (D) 45 有關白三烯素接受器拮抗劑（leukotriene receptor antagonist）之敘述，下列何者正確？  
(A)在氣喘控制方面，效果比吸入型類固醇為佳  
(B)在氣喘控制方面，效果比吸入型長效β<sub>2</sub>型交感神經刺激劑（inhaled long-acting β<sub>2</sub>-agonist）為佳  
(C)為成人氣喘控制藥物之首要選擇  
(D)為口服藥物，常用劑量為一天使用一次

- (C) 46 ras 基因突變在下列何種肺癌出現之比率最高？  
(A)小細胞肺癌 (B)鱗狀上皮細胞癌 (C)腺癌 (D)大細胞肺癌
- (B) 47 一位 24 歲平常健康之男性病人，突發高燒、咳嗽3 天、胸部X 光呈現右上肺葉segmental consolidation，則最可能之病原菌為：  
(A)*Hemophilus influenzae*  
(B)*Streptococcus pneumoniae*  
(C)*Pseudomonas aeruginosa*  
(D)*Chlamydia pneumoniae*
- (C) 48 承上題，下列何種檢查方法可最快且準確診斷上述病人之病原菌？  
(A)血清抗體檢測 (B)痰細胞培養  
(C)小便之抗原檢測 (D)喉頭擦拭之PCR 檢測
- (A) 49 一氧化碳擴散能力 ( $D_{LCO}$ )，在下列何種情況下會有增加表現？  
(A)鬱血性心臟衰竭 (B)間質性肺疾病  
(C)肺氣腫 (D)肺血管高壓 (pulmonary hypertension)
- (D) 50 有關 GOLD guideline 中COPD 之分期及治療，下列何者錯誤？  
(A) $FEV_1/FVC < 70\%$  且  $50\% \leq FEV_1 < 80\%$  預測值，為stage II, moderate COPD  
(B) $FEV_1/FVC < 70\%$  且  $30\% \leq FEV_1 < 50\%$  預測值，為stage III, severe COPD  
(C)吸入性類固醇在 $FEV_1 < 50\%$  且常有急性發作之患者，可規則長期使用  
(D)對於 $FEV_1 < 30\%$  預測值之穩定期COPD 患者，可長期使用低劑量之口服類固醇來減少發作之次數
- (C) 51 一位 73 歲男性患者，每天抽菸一包達50 年，目前仍持續抽菸，但減為每天半包。肺功能檢查 $FEV_1/FVC = 60\%$ ， $FEV_1 = 38\%$  預測值，胸部X 光片呈現兩側肺氣腫，右上肺葉有數個大型氣泡 (bullae)，病患去年有超過兩次因為呼吸困難急性加劇住院治療，下列敘述何者錯誤？  
(A)依據GOLD criteria，病患COPD 的嚴重度應該為stage III (severity = severe)  
(B)病患接受MDI (metered-dose inhaler) 治療，宜合併使用inhaled long-acting  $\beta$ -agonist 和 corticosteroids  
(C)lung volume reduction surgery (LVRS) 對本病患益處很少  
(D)長期口服corticosteroids 不適合用於本類病患
- (D) 52 尿酸結晶沉澱在腎小管 (renal tubules) 及集尿管 (collecting ducts) 引起尿流阻塞稱為：  
(A)痛風  
(B)腎結石  
(C)尿酸鹽腎病變 (urate nephropathy)  
(D)尿酸腎病變 (uric acid nephropathy)
- (C) 53 關於庫欣氏病 (Cushing' s disease) 三項內分泌測試結果：①1 mg dexamethasone 抑制試驗 ②2 mg dexamethasone 抑制試驗 ③8 mg dexamethasone 抑制試驗 下列那一個選項的敘述正確？  
(A)①②③皆抑制 (B)①②抑制③不抑制 (C)①②不抑制③抑制 (D)①②③皆不抑制
- (A) 54 有關於甲狀腺功能低下病人之相關敘述，下列那一項正確？  
(A)身體診查時可能發現甲狀腺有瀰漫性腫大  
(B)不會出現甲狀腺癌  
(C)如果是老年人，應立即給予足量甲狀腺素，使功能儘速恢復正常  
(D)一旦發現懷孕，應立即停用甲狀腺素

(A) 55 附圖為描述糖尿病發病過程的一些生理變化，甲、乙及丙三條曲線分別描述那些變化？



- (A)甲：血糖變化；乙：胰島素分泌量；丙：胰島素敏感度  
 (B)甲：胰島素分泌量；乙：胰島素敏感度；丙：血糖變化  
 (C)甲：血糖變化；乙：胰島素敏感度；丙：胰島素分泌量  
 (D)甲：胰島素敏感度；乙：胰島素分泌量；丙：血糖變化

(C) 56 承上題，I、II、III 及IV，那一點最可能是糖尿病發病之時間點？

- (A)I (B)II (C)III (D)IV

(D) 57 小明是一位人類免疫不全病毒 (human immunodeficiency virus) 感染發病者，目前正在接受抗反轉錄病毒藥物治療 (antiretroviral therapy)。下列相關敘述，何者錯誤？

- (A)肺囊蟲肺炎 (*Pneumocystis pneumonia*) 是愛滋病患最常見的肺部伺機性感染  
 (B)隨著抗反轉錄病毒藥物的使用，愛滋病患的伺機性感染已大幅減少  
 (C)服用抗反轉錄病毒藥物可能造成血脂肪上升、血糖上升等新陳代謝副作用  
 (D)接受治療者應定期追蹤CD3 淋巴球數與病毒量

(C) 58 下列關於旅遊相關的細菌性腹瀉處理的敘述，何者不恰當？

- (A)以含電解質及糖之液體補充體液  
 (B)嬰幼兒發燒超過24 小時，有血便，或腹瀉持續數天，應就醫進行診治  
 (C)嬰幼兒有血便及發燒，投予口服第一代cephalosporin  
 (D)老年人有血便及發燒，投予口服fluoroquinolones

(B) 59 下列何種臨床狀況可符合愛滋病 (AIDS) 的診斷標準？

- (A)發生肺囊蟲肺炎 (*Pneumocystis pneumonia*)，但愛滋病毒抗體陰性  
 (B)愛滋病毒抗體陽性，且CD4 淋巴球數已小於200 cells/mm<sup>3</sup>  
 (C)愛滋病毒抗體陽性，CD4 淋巴球數大於200 cells/mm<sup>3</sup>，但病毒量大於100,000 copies/mL  
 (D)西方墨點法 (Western blot) 檢驗愛滋病毒抗體呈現陽性

(C) 60 一位 40 歲男性，因為發燒4 日合併胸痛及呼吸困難而被送至急診，身體診查發現雙手手腕及手肘有多處扎針傷口，胸部X 光有多處散發性病灶，尿液檢查呈現heroin 陽性反應，血液檢查白血球數14,900/ $\mu$ L，segment 88%，lymphocyte 10%，monocyte 2%，兩套血液培養在48 小時後細菌室通報有革蘭氏陰性桿菌，此菌最有可能是：

- (A)*Salmonella* (B)*Escherichia coli*  
 (C)*Pseudomonas aeruginosa* (D)HACEK organisms

(C) 61 承上題，患者經合適抗生素治療二週後，仍然持續發燒，心臟超音波顯示在三尖瓣膜有一1.2 1.4 公分贅生物 (vegetation)，收縮壓100 mmHg，舒張壓60 mmHg，需要inotropic agent (dobutamine) 維持血壓，此時最需要且最合適的處理方式為：


- (A)繼續使用原本之抗生素，並考慮加上vancomycin 合併治療  
 (B)使用抗凝血劑heparin 以改善肺栓塞惡化及避免發生心臟血栓  
 (C)照會心臟外科考慮心臟瓣膜置換手術  
 (D)加上強心劑digoxin 與增加靜脈輸液 (生理食鹽水) 以改善心輸出能力



(B) 62 承上題，關於此病症的敘述，下列何者錯誤？

- (A)對於未曾接受抗生素治療之患者，血液培養發現致病菌之陽性率可高達95%
- (B)經胸壁心臟超音波（transthoracic echocardiography）檢查的敏感度約為90%
- (C)診斷此病症應在24 小時內由不同部位間隔1 小時執行3 套之血液培養
- (D)60%以上的患者有紅血球沉降速率（erythrocyte sedimentation rate）增加

(A) 63 一位 31 歲的女性，在最近4 年來兩側耳朵時有突發性的紅腫及疼痛（如附圖左）。經幾次發作之後，耳朵逐漸變形而軟骨也失去彈性（如附圖右）。患者的診斷為何？




- (A)relapsing polychondritis (B)pyogenic infection of ear auricles
- (C)eczema of ear auricles (D)tuberculous infection of ear auricles

(A) 64 承上題，本疾病在急性發作時，應給予那種治療最適當？

- (A)oral glucocorticoids (B)non-steroid anti-inflammatory drugs
- (C)local anesthetics injection (D)antibiotics

(B) 65 一位 67 歲男性，主訴兩週來漸發性呼吸困難，病患抽菸50 年，近半年來常感倦怠，常咳嗽且併有濃痰。身體診查血壓90/60 毫米汞柱，呼吸速率每分鐘30 下，脈搏每分鐘100 下，心臟的聽診發現心音變小（distant heart sound），但無心雜音，在鼻管通氧2 公升/分鐘下，動脈血氧飽和度SaO<sub>2</sub>：93%。胸部X 光如下：下列敘述何者錯誤？



- (A)患者之頸靜脈怒張
- (B)患者血壓呼氣時收縮壓下降幅度超過10 毫米汞柱
- (C)患者心電圖檢查之肢導極及胸前導極均呈低電壓
- (D)下一步應考慮安排心臟超音波檢查確診

(B) 66 下列何者是周全性老年評估（comprehensive geriatric assessment）的對象？

- (A)65 歲以上老人 (B)急性功能減退的老人
- (C)長期照護機構臥床老人 (D)接受重症治療中的老人



- (A) 67 一位 23 歲女性，已婚但未曾懷孕，來門診請你開立避孕藥。她過去沒有重大內科疾病，沒有偏頭痛，也不曾得過性病。身體診查發現她的血壓為160/100 mmHg，身高是162 公分，體重為82 公斤。下一步處置，以下何者最適當？  
(A)應更進一步詢問病史，並評估血壓問題後再決定是否給避孕藥  
(B)告訴病人她太胖了，應開給減肥藥，請病人一個月後複診  
(C)直接開給避孕藥，請病人定時服用即可  
(D)告訴病人她太胖了，不適合使用避孕藥
- (C) 68 在病情穩定的慢性病治療醫病關係中，下列何者是最合適的醫病互動模式？  
(A)權威引導模式 (B)獨立決策模式 (C)主動參與模式 (D)指導合作模式
- (A) 69 一位67 歲的男性退休行政人員，家族史有肝癌，過去並無特殊疾病史，平常無運動習慣，不抽菸且不喝酒。下列何項預防保健服務的建議，並無實證醫學的依據？  
(A)貧血篩檢 (B)憂鬱症篩檢 (C)體重測量 (D)視力篩檢
- (A) 70 接受高劑量腎上腺皮質素治療的兒童，在預防接種時需避免下列何種疫苗？  
(A)麻疹、腮腺炎及德國麻疹（MMR）疫苗 (B)B 型肝炎疫苗  
(C)白喉、百日咳及破傷風（DPT）疫苗 (D)小兒麻痺不活化病毒疫苗（沙克疫苗）
- (D) 71 王醫師發現有些醫師會使用腎上腺皮質素治療上呼吸道感染的症狀，他十分懷疑這種治療方式是否真的有效，他決定以實證醫學方式去解答他的問題。下列那一個問題最適合作實證醫學探索？  
(A)腎上腺皮質素對緩解上呼吸道感染症狀的實證醫學評估  
(B)腎上腺皮質素與一般症狀治療對緩解上呼吸道感染症狀的比較評估  
(C)腎上腺皮質素使用前及使用後對緩解上呼吸道感染症狀的比較評估  
(D)腎上腺皮質素與一般症狀治療對成年人上呼吸道感染症狀緩解的比較評估
- (D) 72 陳先生，32 歲，主訴腹瀉3 天，1 週前曾去泰國觀光。2 天前開始出現腹瀉的症狀，解出來的都是一些黃色稀便或水便，合併有輕微發燒、噁心、腹痛、腹脹及全身倦怠等症狀。他表示，曾經在泰國的路邊攤買一些已削皮、切好的水果來吃，此外也曾在當地自助餐廳吃了一些沙拉和生魚片。曾自行服用一些胃腸藥，但腹瀉狀況並沒有改善。下列有關此腹瀉病人的敘述何者錯誤？  
(A)病原菌以enterotoxigenic *E. coli* 最常見 (B)有20~50%原因不明  
(C)早期使用fluoroquinolone 可縮短病程 (D)建議下次出國時使用抗生素預防
- (A) 73 安寧緩和醫療包括身、心、社會和靈性照顧，其中心理靈性的照顧在生命末期愈顯重要，下列有關如何讓癌末病人維持希望的敘述，何者錯誤？  
(A)採取積極治癒性的治療以維持病人活下去的希望  
(B)給予疼痛的解除、家人的關懷和心願的達成  
(C)生命的回顧讓病人覺得這一生沒有白過  
(D)所謂希望是指在能力所及下有努力的目標，超越無作為的期待
- (D) 74 一位 60 歲女性，因胸痛和呼吸短促就醫，胸部X 光片和CT，如圖，則最正確的診斷應為：  
(A)縱隔腔腫瘤 (B)肺炎  
(C)肺癌（adenocarcinoma） (D)肺動脈栓塞（pulmonary embolism）
- (A) 75 操作 CPR 的口訣是「叫叫CAB」，有關B，下列那一項敘述正確？  
(A)如果吹第一口氣，胸部沒有起來，則將呼吸道打得更開一點  
(B)如果吹第一口氣，胸部沒有起來，表示呼吸道阻塞，則要去除呼吸道的阻塞  
(C)為了給病人足夠的通氣量，要深吸一口氣，然後大力的吹進病人的肺內  
(D)為了給病人足夠的通氣量，每一口氣要吹2 秒

- (D) 76 一位 65 歲女性因為發燒與乾咳來急診就醫。咳嗽自5 天前就開始，伴隨有些微呼吸困難。1 天前開始出現發燒發冷症狀，有噁心感但無腹痛。病人有高血壓病史，與家人同住，最近3 個月內沒出過國。身體診查發現右下肺有囉音（rales）與輕微哮鳴聲（wheezing）。血液檢查發現白血球為 $13,000/\text{mm}^3$ ，C-reactive protein（CRP）為 $15.3 \text{ mg/dL}$ 。胸部X 光顯示右下肺葉有浸潤（infiltration），懷疑為肺炎。你準備將此病人收住院治療，下列何種是初步最適當的抗生素選擇？  
(A) clindamycin + metronidazole  
(B) cefazolin + macrolide  
(C) ciprofloxacin + aminoglycoside  
(D) Augmentin（amoxicillin with clavulanic acid）+ macrolide
- (A) 77 一位 37 歲男性因2 小時前突發性腹痛入急診。病人為長期酗酒者，這幾年已陸續發作過5、6 次的胰臟炎而住院。以這位病人而言，下列何項敘述最合理？  
(A) 血液amylase 與lipase 有可能為正常，但不代表無胰臟發炎  
(B) 在急性期時使用Ranson criteria 能對預後有很精確的預測  
(C) 血液lipase 上升速度快，半衰期約2 小時，3 天內會回復正常  
(D) 血液amylase 或lipase 愈高，代表胰臟發炎愈嚴重
- (B) 78 一位 35 歲男性因2 小時前右踝關節突發性疼痛而入急診。病人表示2 年前有過一次類似情況，發生在左膝關節，經醫師打止痛劑後就緩解，不知原因為何。今天晚上與同事去聚餐。吃完海鮮大餐與啤酒後半小時就開始疼痛。身體診查發現體溫為 $37.3^\circ\text{C}$ ，右踝關節紅腫且有明顯壓痛。血中白血球為 $14,500/\text{mm}^3$ ，下列何者最能幫助進一步的鑑別診斷？  
(A) 血中尿酸值 (B) 關節液分析 (C) 踝關節X 光 (D) CRP
- (D) 79 一位 35 歲肝癌末期病患T，於腫瘤病房住院期間得知自己之病情，一開始非常震驚、哭泣，其後經過醫護人員與妻子之支持，情緒逐漸好轉；住院3 個星期之後，T 主動要求簽署「不施行心肺復甦術」之意願書，經腫瘤科主治醫師詳細評估並說明後，由T 親自簽署意願書。下列敘述何者較為合理？  
(A) 腫瘤科主治醫師未請精神科專科醫師評估T 之憂鬱症狀及自殺傾向，並不妥當  
(B) 某日T 因癌症臨終，多重器官衰竭，從南部趕上臺北之父母要求一定要急救，等待好日再讓T 過世，否則要告主治醫師醫療過失。為了避免被告，只好先急救再說  
(C) 某日T 因為與肝癌病情無關之感冒發燒併發肺炎時，醫護人員認為T 已經簽了「不施行心肺復甦術」之意願書，其實不需積極治療  
(D) T 出院之後，散步時因為肝癌末期之器官衰竭路倒，生命危急，被好心人送到醫院急診，急診醫師不知T 有簽署「不施行心肺復甦術」之意願書，為T 施行插管急救，保住T 之生命跡象。其後，在T 之妻的告知下，拔管讓T 離開急診回家
- (D) 80 某癌症專科醫院鑑於近年來基因檢測日益普及，再加上人體組織資料庫有助於基因醫學的研究，因此決定在所有病人住院時，將許多的基因檢測納入常規檢查，所有病人都要自費做。有關這樣的作法，下列那一個說法錯誤？  
(A) 病人應該可以選擇是否做基因檢測，不應該未告知即納入常規檢查  
(B) 病人常規檢查剩餘的血液，如果要留存做研究，應該明確告知病人  
(C) 基因檢測結果的告知應提供基因諮詢  
(D) 基於促進醫學研究，醫院增列自費常規檢查項目並無不妥