

《內外科護理學概要》

- (D) 1 腦脊髓液分析，若出現下列何者，表示異常？
(A)蛋白質 (B)葡萄糖 (C)氯離子 (D)紅血球
- (B) 2 有關關節鏡的敘述，下列何者錯誤？
(A)檢查後3週內，可恢復正常活動 (B)檢查後，需以10 kg 砂袋加壓傷口，預防出血
(C)可在門診執行 (D)可以做膝蓋刮除術 (patellar shavings)
- (C) 3 有關庫欣氏症候群的臨床表徵，下列何者正確？①水腫 ②高血鉀 ③高尿糖 ④皮膚有瘀斑
⑤皮質醇濃度清晨增高，夜間逐漸降低 ⑥憂鬱
(A)①②③⑤ (B)②④⑤⑥ (C)①③④⑥ (D)②③④⑥
- (B) 4 有關有機磷中毒的處置，下列何者錯誤？
(A)建立通暢的呼吸道 (B)靜脈注射拮抗劑epinephrine
(C)若病患清醒，可以催吐 (D)灌入吸附劑活性炭
- (A) 5 甲狀腺風暴病患不可服用下列何種藥物，以防增加血液中游離的甲狀腺素？
(A)Aspirin (B)Acetaminophen (C)Digoxin (D)Propranolol
- (D) 6 一位體重50 公斤使用呼吸輔助器的病患，下列何種現象表示其尚無法脫離呼吸器？
(A)肺活量600 mL (B)潮氣容積300 mL
(C)PaO₂ 85 mmHg (D)呼氣末正壓 (PEEP) 10 cmH₂O
- (B) 7 下列何者屬於癌症預防層次中之一級預防？
(A)腫瘤標記檢測 (B)確認生活型態危險因子
(C)癌症危險徵兆評估 (D)乳房復健計畫擬定
- (A) 8 有關中暑個案之護理措施，下列何者錯誤？
(A)使用冰食鹽水胃灌洗，急速將體溫降至37°C以下 (B)監測生命徵象及尿量
(C)提供100% 氧氣 (D)給與靜脈輸液補充
- (B) 9 有關副甲狀腺機能亢進症病患之飲食指導，下列何者錯誤？
(A)食用高纖飲食 (B)鼓勵多喝牛奶 (C)鼓勵多喝開水 (D)鼓勵多喝蔓越莓汁
- (D) 10 有關肺氣腫的臨床表徵，下列何者錯誤？
(A)桶狀胸 (B)呼吸短促 (C)呼吸音減弱 (D)皮膚呈藍紫色
- (A) 11 有關壓力性尿失禁的護理指導，下列何者正確？
(A)勤練凱格爾氏運動 (B)鼓勵多做伐爾沙瓦氏運動 (Valsalva maneuver)
(C)限制喝水量，每天低於1000 c.c. (D)每小時跑兩次廁所，預防漏尿
- (A) 12 上石膏病患接受蒼白試驗 (blanching test)，可評估下列何者？
(A)循環狀況 (B)感染情形 (C)疼痛程度 (D)活動力
- (D) 13 下列何者不是Nitroglycerin (NTG) 減緩心絞痛的藥物作用？
(A)降低前負荷 (B)降低後負荷 (C)降低心肌耗氧 (D)降低心跳速率
- (B) 14 有關口服葡萄糖耐量試驗的敘述，下列何者錯誤？
(A)檢查前3 日衛教病患採高糖飲食
(B)檢查前須禁食12 小時，中間絕對禁止喝水
(C)收集病患口服葡萄糖液之前及之後2 小時的尿液及血液檢體
(D)若口服葡萄糖液後之第2 小時，病患的血糖 ≥ 200 mg/dL 可診為糖尿病
- (B) 15 下列何種導致肺炎的細菌是在蓄水槽內繁殖？
(A)肺炎鏈球菌 (B)退伍軍人桿菌 (C)黴漿菌 (D)克雷白氏桿菌

- (D) 16 有關踝關節扭傷的立即處理，下列何者正確？
(A)熱敷受傷的關節 (B)持續用夾板固定關節3~5 天
(C)照X 光不能顯示軟組織的腫脹程度 (D)抬高受傷的關節
- (B) 17 下列何者屬於血管性休克？①低血容積性休克 ②心因性休克 ③敗血性休克 ④神經性休克
⑤過敏性休克
(A)①②③ (B)③④⑤ (C)①③⑤ (D)②④⑤
- (D) 18 下列何項檢查執行後，需特別留意有無血尿？
(A)靜脈注射腎盂攝影術 (B)腎動脈攝影術 (C)尿路動力學檢查 (D)膀胱鏡檢查
- (A) 19 病患在下列何種情況下，身體評估結果會出現Homan's sign？
(A)靜脈血栓 (B)動脈潰瘍 (C)動靜脈畸形 (D)微血管破裂
- (B) 20 有關泌尿道感染患者的護理措施，下列何者錯誤？
(A)監測生命徵象變化 (B)鼓勵多喝柳橙汁 (C)監測排尿情形 (D)鼓勵多攝取液體
- (C) 21 有關左手臂動靜脈瘻管手術的術後初期照護，下列何者正確？
(A)左手臂除量血壓外，其餘治療皆不可做 (B)左手臂需要放低以增進血流
(C)觸摸瘻管處可感覺到震顫 (D)必須以砂袋局部加壓傷口
- (B) 22 有關留鹽激素 (aldosterone) 不足所導致的症狀，下列何者錯誤？
(A)低血壓 (B)低血糖 (C)低血鈉 (D)高血鉀
- (D) 23 因車禍發生多重損傷之病患，由救護車送至醫院急診室，下列何者是優先處理的步驟？
(A)完整的身體評估 (B)固定骨折處
(C)建立靜脈注射導管 (D)維持呼吸道通暢
- (A) 24 類風濕性關節炎病患行全髖關節置換術後之護理措施，下列何者正確？
(A)觀察是否有血栓性靜脈炎的症狀 (B)維持髖關節屈曲大於90 度
(C)術後一星期內，絕對臥床休息 (D)每2 小時將病患翻向患側15 分鐘
- (C) 25 有關使用脈衝式血氧飽和儀 (pulse oximetry) 之敘述，下列何者正確？
(A)此儀器適用於監測血中二氧化碳飽和度
(B)此儀器可固定於手 (腳) 背、手指與腳趾
(C)使用儀器時，需注意使用部位的保暖及血液循環
(D)此儀器可以正確計算出動脈血中氧分壓
- (B) 26 有關部分甲狀腺切除術後護理措施，下列何者正確？
(A)清醒後仍維持平躺姿勢6~8 小時
(B)術後第1 天可給與冷飲
(C)說明頸部傷口有脹滿感是正常現象
(D)術後第1 天，每4 小時進行頸部屈曲伸展運動各15 次
- (D) 27 下列何種食物嘌呤含量最高，痛風病患應禁止攝取？
(A)牛奶 (B)菠菜 (C)鱈魚 (D)牡蠣
- (D) 28 原發性甲狀腺功能低下症的病患會出現下列何種徵象？
(A)血糖升高 (B)血中三酸甘油酯降低
(C)血中膽固醇降低 (D)甲狀腺自體抗體價數上升
- (A) 29 有關全身性紅斑性狼瘡 (SLE) 的護理措施，下列何項錯誤？
(A)採取低鈉、低鈣飲食 (B)服用抗瘡疾製劑之病患，應定期檢查視網膜
(C)避免直接曝曬在陽光下 (D)運動前可局部熱敷關節處
- (C) 30 有關服用Coumadin 之護理指導，下列何者錯誤？
(A)提醒病患注意大便的性質及顏色 (B)使用軟毛牙刷，注意牙齦出血
(C)多進食深綠色蔬菜，以維持正常排便 (D)進行侵入性措施前，先與醫師討論是否停藥

- (D) 31 有關末期腎衰竭病患的護理指導，下列何者錯誤？
(A)甜食不須特別限制 (B)可嚼口香糖，以刺激唾液分泌
(C)指甲須剪短，以避免抓破皮膚 (D)避免外出日曬
- (B) 32 有關腎膿瘍的敘述，下列何者錯誤？
(A)病患常呈現腹痛如腎絞痛 (B)尿液檢測為G(+)
(C)積極抗生素治療是有效的 (D)必要時可採手術方式引流膿液
- (C) 33 有關密閉式胸腔水下引流之目的，下列敘述何者錯誤？
(A)移除肋膜腔內的氣體與血液 (B)促使患側肺部的再度擴張
(C)給與肋膜腔藥物治療 (D)重建肋膜腔內的相對負壓狀態
- (A) 34 有關帶狀疱疹的敘述，下列何者正確？①由水痘疱疹病毒所引起 ②發病原因可能與其剛完成放射線治療有關 ③皮膚發疹前會有神經痛的症狀 ④此病不具感染力 ⑤可用Acyclovir藥膏來減緩神經痛的症狀
(A)①②③ (B)①③⑤ (C)②③④ (D)②④⑤
- (C) 35 有關類風濕性關節炎病患關節病變之敘述，下列何者正確？
(A)侵犯單處關節 (B)常呈不對稱性發生
(C)手指關節呈天鵝頸狀 (D)手指腫脹並橈側偏曲
- (B) 36 後天免疫缺乏症候群屬於下列何種免疫系統之反應？
(A)自體免疫 (B)免疫缺失 (C)過敏反應 (D)被動免疫
- (D) 37 有關氣喘之居家護理指導，下列何者錯誤？
(A)教導使用尖峯吐氣流速計 (B)教導避免接觸二手菸
(C)鼓勵執行噘嘴呼吸運動 (D)鼓勵夜間睡眠時吹冷氣
- (A) 38 為預防癌症病患發生感染，下列護理措施何者錯誤？
(A)嗜中性白血球絕對計數降至 $1,100\sim 2,000$ 個/mm³時，須採保護隔離
(B)每餐後及睡前，以生理食鹽水漱口抑菌
(C)應密切觀察體溫，避免測量肛溫
(D)鼓勵進食剝皮之水果
- (C) 39 有關聽診心雜音之敘述，下列何者正確？
(A)心雜音是由於通過瓣膜之血量減少所致
(B)心雜音只能在心尖位置聽到
(C)第四級以上的心雜音，通常伴隨著有震顫 (thrill)
(D)聽診器膜面可聽到低頻率的心音
- (D) 40 下列何者不是心臟移植術後排斥反應之徵象？
(A)體溫升高 (B)心臟腫大 (C)心臟功能指數異常 (D)心搏過慢
- (D) 41 下列何種肺部手術後，不需使用胸腔水下引流？
(A)楔形切除術 (B)肺節切除術 (C)肺葉切除術 (D)全肺切除術
- (A) 42 身體檢查時觸壓右上腹，病患於深吸氣時產生異常的疼痛，此為何種徵象？
(A)墨菲氏徵象 (Murphy's sign) (B)布魯伯氏徵象 (Blumberg's sign)
(C)霍納氏徵象 (Horner's sign) (D)透納氏徵象 (Turner's sign)
- (C) 43 有關腹腔鏡膽囊切除術之敘述，下列何者正確？
(A)常用於急性膽囊炎個案 (B)術後多補充水溶性維生素E
(C)手術前在腹腔內注入3~4公升CO₂ (D)手術後72小時即可出院
- (D) 44 有關第一型單純疱疹 (herpes simplex) 的敘述，下列何者正確？
(A)常侵犯人體生殖系統 (B)由水痘病毒感染所致
(C)水疱與神經痛一起出現 (D)易於壓力情境復發

- (B) 45 有關疥瘡之敘述，下列何者錯誤？
(A)主要經由直接接觸皮膚或與病患共穿衣物感染 (B)病灶部位通常分布於腰部以下處
(C)夜間睡覺後，皮膚劇癢最嚴重 (D)軍營、安養院、監獄等是好發場所
- (B) 46 有關惡性腫瘤細胞的特徵，下列何者錯誤？
(A)細胞膜含有腫瘤的特定抗原 (B)只會使用有氧代謝來製造能量
(C)具有獨特的破壞酵素（蛋白酶） (D)含較少細胞黏固劑，不會附著在鄰近的細胞
- (C) 47 有關肌肉骨骼手術後的復健運動，下列何者錯誤？
(A)主動或被動全關節運動 (B)股四頭肌運動 (C)等張阻力運動 (D)臀腹肌緊縮運動
- (B) 48 有關病毒性肝炎血清檢驗結果之敘述，下列何者正確？
(A)Anti-HAV IgM (+) 代表過去曾感染A型肝炎
(B)Anti-HAV IgG (+) 代表對A型肝炎具免疫力
(C)Anti-HBe (+) 代表曾注射肝炎疫苗
(D)Anti-HB_c (+) 代表對B型肝炎具免疫力
- (D) 49 有關多發性骨髓瘤的敘述，下列何者錯誤？
(A)導因為漿細胞惡性分化、增生
(B)X 光顯示病患骨頭有瀰漫性病灶
(C)尿液中常出現不正常的Bence Jones 免疫球蛋白
(D)常見低血鈣合併症，應予補充鈣離子
- (A) 50 有關結腸造瘻灌洗的護理措施，下列何者正確？
(A)灌洗筒懸掛於造瘻口上約45~50 cm
(B)灌洗液的溫度以25°C 最適宜
(C)灌洗液的量愈多清洗愈乾淨，至少1500 c.c.
(D)灌洗過程中腸道出現痙攣時，要繼續灌洗不可以停止
- (D) 51 大腸直腸癌病患，於手術治療後已無殘存的癌細胞，後續將採取下列何種化學治療？
(A)增強性 (B)姑息性 (C)救援性 (D)輔助性
- (A) 52 有關左側結腸直腸癌的症狀，下列何者錯誤？
(A)噁心、嘔吐 (B)裏急後重 (C)糞便變細 (D)腹部絞痛
- (C) 53 下列何種情況為扁桃腺切除術的禁忌？
(A)扁桃腺周圍膿瘍 (B)耳痛、耳聾之症狀
(C)血液惡病質 (D)頸部淋巴腺持續腫大
- (D) 54 有關改良型乳房根除術的手術前護理指導，下列何者正確？①手術後傷口出現劇痛是正常現象 ②需長期防護患肢淋巴水腫 ③術後第2天即可開始做抬手運動 ④討論義乳及胸罩的使用方法 ⑤練習術後的各種復健運動
(A)①②③ (B)②③④ (C)③④⑤ (D)②④⑤
- (B) 55 有關急性胰臟炎的臨床徵象，下列何項正確？
(A)胰澱粉酶、脂解酶、鹼性磷酸酶皆下降 (B)左上腹腹痛、嘔吐、發燒
(C)低血糖、心悸、發紺 (D)血清鈣升高、膽紅素降低、白血球數升高
- (B) 56 尿崩症病患使用Vasopressin 之主要作用為下列何者？
(A)降腦壓 (B)增加水分再吸收 (C)促進胰島素分泌 (D)降低肝醣合成
- (A) 57 下列何者表示病患已正確了解預防傾倒症候群 (dumping syndrome) 的護理指導？
(A)「要吃高脂肪、高蛋白及低醣的乾性食物。」
(B)「飯前多喝水，以減少進食量。」
(C)「吃飯時，最好湯泡飯一起吃。」
(D)「吃完飯後，應散散步幫助消化。」

- (D) 58 有關腰椎椎間盤突出，接受椎板切除術後病患之出院指導，下列何者正確？
(A)術後儘量多運動 (B)改坐較低、較軟的沙發 (C)最好採用盆浴 (D)避免便秘
- (C) 59 有關白內障的敘述，下列何者錯誤？
(A)對於黃、藍顏色的辨色力可能變差
(B)白內障成熟期時，觀察瞳孔的外觀是白色的
(C)白內障形成過程中，會有眼睛發紅及劇烈疼痛
(D)囊外白內障摘除術，可減少視網膜剝離的危險
- (B) 60 有關與「接受型失語症」病患溝通之技巧，下列何者正確？
(A)提高聲調 (B)併用非語言之溝通方式
(C)每次談論多個主題，以提高興趣 (D)使用背景音樂，使氣氛輕鬆
- (A) 61 有關癲癇的護理指導，下列何者正確？
(A)提醒服用Phenytoin (Dilantin)的病患，應注意口腔照護
(B)一旦症狀消失，就可停止服藥
(C)發作時，家屬應立即給與病患約束，以免傷到病患
(D)限制病患開車以免發生危險
- (A) 62 有關腎結核的護理措施，下列何者錯誤？
(A)應取夜間就寢前的尿液做培養
(B)指導病患定期服用藥物及門診追蹤
(C)平日病患應得到適當營養及充足休息
(D)長期追蹤至少每6個月做一次尿液細菌檢查
- (C) 63 頭部外傷病患用語言命令時，才會張開眼睛，對時間、地點有混亂情形，但能遵循命令做運動。其格拉斯哥昏迷指數(GCS)分數為何？
(A)11分 (B)12分 (C)13分 (D)14分
- (C) 64 有關急性漿液性中耳炎的敘述，下列何者正確？
(A)可能因金黃色葡萄球菌感染
(B)可能出現耳痛、耳漏及感覺神經性聽力喪失
(C)以耳鏡觀察可見紅腫而凸出的鼓膜
(D)鼓膜切開是急性漿液性中耳炎必要的手術治療
- (B) 65 下列何者可做為心臟衰竭病患接受氧氣治療後的療效指標？
(A)心電圖 (B)動脈血液氣體 (C)中心靜脈壓 (D)血液中電解質數據
- (D) 66 下列何種維生素吸收障礙，會導致肝硬化病患出現凝血功能異常？
(A)維生素A (B)維生素B (C)維生素D (D)維生素K
- (D) 67 在腦血管意外發生的48小時內，下列護理措施何者正確？
(A)避免給與止痛劑 (B)避免給與復健運動 (C)保持平躺 (D)暫停由口進食
- (A) 68 為早期偵測高血壓病患有無合併症的發生，護理人員應該特別評估下列何種感覺？
(A)視覺 (B)聽覺 (C)味覺 (D)觸覺
- (D) 69 長期使用Mannitol控制顱內壓升高(IICP)的病患，下列敘述何者錯誤？
(A)Mannitol的作用在於滲透性吸引水分離開腦組織
(B)Mannitol有利尿作用，以減少身體的水分
(C)須監測病患是否有脫水、電解質不平衡的副作用
(D)病患的IICP會有效改善，不會有反彈性回升現象
- (A) 70 下列何種喉切除病患，術後宜接受食道語(esophageal speech)復健？
(A)全喉切除術後吞嚥功能正常者 (B)手術合併接受放射線治療者
(C)施行頸部淋巴廓清術者 (D)接受下咽切除術者

- (C) 71 下列何者不會影響石膏乾燥所需的時間？
(A)石膏中的水分 (B)石膏的厚度 (C)石膏的重量 (D)空氣流通度
- (D) 72 有關發炎性心臟疾病病患須臥床休息的主要原因，下列何者正確？
(A)降低心臟後負荷 (B)降低心臟前負荷 (C)減少心臟輸出量 (D)減少心肌耗氧量
- (D) 73 急性心肌梗塞病患可接受下列何種藥物，以溶解冠狀動脈內的血塊？
(A)Coumadin (B)Dobutamine (C)Metaraminol (D)Streptokinase
- (B) 74 病患使用柺杖行走，以健肢支撐身體重量，兩支柺杖與患肢同時跨出，此為何種步態法？
(A)兩點步態法 (B)三點步態法 (C)四點步態法 (D)搖擺步態法
- (D) 75 有關抑制心臟移植排斥作用之藥物，下列何者錯誤？
(A)Solu-medrol (B)Cyclosporine (C)Imuran (D)Albumin
- (A) 76 下背痛病患所使用的骨盆牽引，是屬於下列何種牽引？
(A)皮膚牽引 (B)骨骼牽引 (C)伸展牽引 (D)平衡懸吊式牽引
- (C) 77 有關慢性腎衰竭之實驗室檢查結果，下列何者錯誤？
(A)血尿素氮 (BUN) 升高 (B)血清肌酸酐 (Cr) 升高
(C)肌酸酐清除率 (Ccr) 增加 (D)血尿素氮與血清肌酸酐比例增加
- (B) 78 陽壓呼吸器可能產生的生理不良反應，下列何者正確？
(A)胸腔壓力降低 (B)心輸出量減少 (C)吐氣量增加 (D)急性酸中毒
- (D) 79 下列何者為全身性紅斑性狼瘡病患在造血系統方面的臨床表徵？
(A)脾臟萎縮 (B)白血球過多 (C)血小板過多 (D)出現抗核抗體 (ANA)
- (D) 80 以韋伯氏試驗 (Weber's test) 測試病患的聽力，如病患表示左耳無法聽到聲音，代表病患有何種失聰？
(A)骨性聽覺喪失 (B)傳導性聽覺喪失 (C)混合性聽覺喪失 (D)感覺神經性聽覺喪失

【版權所有，重製必究！】