

# 《產兒科護理學》

- (C) 1 王太太自然生產，哺餵母乳，產後第3 天準備出院，出院衛教中應告知王太太，那一種情況必須立即回到醫院診治？  
 (A)乳頭有破皮疼痛的現象 (B) 10 天後在腹部摸不到子宮底  
 (C)惡露量突然增多，呈鮮紅色，並有血塊流出 (D)乳汁分泌量減少
- (D) 2 產後凝血因子、纖維蛋白、纖維蛋白原在產後恢復期濃度皆較高，其增加的功能主要是何者？  
 (A)維持電解質平衡 (B)防止血栓的發生 (C)預防產後之感染 (D)防止產後的出血
- (A) 3 以檢查棒由新生兒足跟劃至足趾，大腳趾會屈曲而其他腳趾頭會散開，這是新生兒的那種反射？  
 (A)巴賓斯基反射 (Babinski reflex) (B)摩洛反射 (Moro reflex)  
 (C)驚嚇反射 (startle reflex) (D)踏步反射 (stepping reflex)
- (D) 4 下列何者為產後之異常生理變化？  
 (A)產後2 小時，可下床走路 (B)產後第2 天，乳汁分泌  
 (C)產後第3 天，排尿量增加 (D)產後第4 天，惡露量較多且色紅
- (C) 5 新生兒體熱散失的途徑中，隨潮濕的體表或毛髮水分散失為下列那一種途徑？  
 (A)傳導 (B)對流 (C)蒸發 (D)輻射
- (C) 6 在雙胞胎的分類中，最易發生雙胞胎胎盤間血管有互通的情形，致使發生雙胞胎輸血症候群 (TTTs)，為下列何者？  
 (A)異卵雙胞胎 (B)雙羊膜、雙絨毛膜雙胞胎  
 (C)雙羊膜、單絨毛膜雙胞胎 (D)連體嬰
- (A) 7 妊娠時子宮頸變軟之敘述，下列何者正確？  
 (A)為古德爾氏 (Goodell's) 徵象，為動情激素 (estrogen) 的影響  
 (B)為古德爾氏 (Goodell's) 徵象，為濾泡刺激素 (FSH) 的影響  
 (C)希克斯 (Braxton Hicks) 收縮，為動情激素 (estrogen) 的影響  
 (D)希克斯 (Braxton Hicks) 收縮，為濾泡刺激素 (FSH) 的影響
- (D) 8 有關妊娠期血液組成之變化敘述，下列何者正確？  
 (A)妊娠期僅血漿容量會增加，其他組成皆下降  
 (B)妊娠期因紅血球總量未升高，所以產生妊娠生理性貧血  
 (C)血中纖維蛋白原及血小板會減少，以防止血栓的發生  
 (D)血中蛋白質總含量降低，可能是供應胎兒之所需
- (B) 9 孕婦早期破水時預防感染是很重要的護理措施，下列相關敘述何者錯誤？  
 (A)教導衛生棉應時常更換 (B)增加陰道內診次數，了解產程進展  
 (C)觀察陰道分泌物的色、味 (D)注意白血球數目有無異常升高
- 情況：陳太太第1 胎，子宮頸開7 公分，主訴手腳發麻，每次子宮收縮都感到無法呼吸，呼吸急促。依此回答下列第10 題至第11 題。
- (D) 10 陳太太的情形與下列何種現象最有關？  
 (A)代謝性酸中毒 (B)代謝性鹼中毒 (C)呼吸性酸中毒 (D)呼吸性鹼中毒
- (C) 11 此時應提供最合宜之護理措施為何？  
 (A)提供氧氣，1 分鐘10 L (B)提供背部按摩  
 (C)運用紙袋執行緩而慢的呼吸 (D)協助側臥

- (B) 12 產次 (para) 是指產下可存活週數嬰兒的次數，下列敘述何者正確？  
(A)根據定義，產次僅算活產次的嬰兒數  
(B)指產下妊娠20 週以上，不論死產或活產次數  
(C)指產下妊娠38~40 週以上，不論死產或活產次數  
(D)指產下500 公克以上活產的嬰兒之次數，多胞胎僅算1 次
- (A) 13 有關胎頭變形 (molding) 的敘述，下列何者正確？  
(A)生產時，胎頭受壓致使頭骨出現重疊不對稱的現象  
(B)生產時，胎頭受壓致使頭骨軟組織腫起來的現象  
(C)生產時，胎頭受壓致使頭骨表面與骨膜間血管破裂的現象  
(D)生產時，胎頭受壓致使頭骨受損，發育變形的現象
- (D) 14 李太太主訴：「我自從懷孕後都不敢拿剪刀，因為怕小孩會有兔唇顎裂。」此時護理師的反應，下列何者最合適？  
(A)「這是一種迷信。」 (B)「妳太緊張了，放輕鬆點。」  
(C)「這不是造成兔唇顎裂的原因。」 (D)「這是妳保護胎兒的一種方法。」
- (B) 15 有關以家庭為中心的婦嬰照護哲學原則，下列何者錯誤？  
(A)家庭有能力決定他們的照護 (B)專業人員在家庭育兒階段角色為權威者  
(C)生產是家庭關係重組的開始 (D)生產是家庭生活中正常事件
- (A) 16 待產時會使用按摩方法減緩疼痛之主要原理為何？  
(A)按摩是應用門戶控制理論 (gate control theory)  
(B)藉著刺激小神經纖維去促進大神經纖維的傳導  
(C)促進血液循環  
(D)藉由按摩過度刺激神經纖維，使疼痛傳導麻痺
- (B) 17 林小姐生過一胎唐氏症兒，目前懷孕約10 週，她可接受何項檢驗以早期偵測胎兒異常？  
(A)羊膜穿刺 (B)絨毛取樣 (C)高層次超音波 (D)臍帶血取樣
- (A) 18 陳太太向護理師詢問應多久餵母乳1 次時，下列的回答何者最適當？  
(A)早期約2 至3 小時需餵1 次，最好視新生兒需要調整間隔時間  
(B)早期奶量較少，應固定每3 小時餵1 次，以促進乳汁分泌，待泌乳量增加時再改為每4 小時1 次  
(C)維持每4 小時1 次，以養成新生兒生活的規律性，媽媽也可獲得休息  
(D)多久都沒有關係，媽媽可以自己決定
- (B) 19 唐氏症 (Down Syndrome) 是最常見的染色體異常疾病之一，其病因是在第幾對染色體出現異常？  
(A) 20 (B) 21 (C) 22 (D) 23
- (D) 20 有關產後運動之敘述，下列何者錯誤？  
(A)產後運動應自產後依身體情況逐漸開始  
(B)要注意著寬鬆的衣服，於空氣流通的環境中進行  
(C)產後運動可促進骨盆腔底的收縮和復舊，增強陰道口和尿道口的肌肉張力  
(D)產後運動第1 次執行時只要一種項目，接著依能力儘量執行多樣運動
- (B) 21 馮太太到產前門診表示月經已經晚了兩個週期，5 年前人工流產過1 次，現已確定懷孕。馮先生不知道如何協助太太渡過懷孕的過程，這時護理師給予馮先生最適宜的建議是：  
(A)儘量不要讓馮太太做任何家事，使她能夠充分的休息  
(B)接受馮太太懷孕初期的行為表徵，多與她溝通並了解她的感受  
(C)儘量讓馮太太做家事，增加活動量，幫助夜眠  
(D)立即申請產假，多陪伴太太

- (C) 22 有關使用胎心音電子外監測器的敘述，下列何者正確？  
(A)易導致子宮內感染 (B)具侵入性 (C)肥胖母親傳導困難 (D)破水方可裝置
- (D) 23 下列何項是待產婦「真陣痛」的特徵？  
(A)疼痛侷限在腹部附近  
(B)爬樓梯可以減輕疼痛  
(C)收縮時間及間隔不規則  
(D)子宮頸有擴張變化
- (B) 24 有關男性精液分析的結果，下列何者會造成不孕？  
(A)精液每c.c.多於2000 萬個精蟲 (B)精蟲的活動力低於50%  
(C)型態正常的精蟲超過70% (D)每次射精量有3 c.c.
- (A) 25 有關心臟疾患妊娠婦女減少心臟負荷量之護理指導，下列何者正確？  
(A)充足休息及睡眠，儘量採左側臥  
(B)配合醫療低蛋白飲食的遵行  
(C)增加體重，第二妊娠期至少應增加1 公斤/週  
(D)充分運動，心跳需超過140 次/分，以增加體能
- (D) 26 陳太太懷孕41 週，因破水入院，觀察3~4 小時之後，胎兒監視器呈現子宮收縮每10 分鐘1 次，進行催產素引產，則下列何者為合適的護理措施？  
(A)點滴注射期間注意有無尿量過多的現象  
(B)注意生命徵象，如有體溫過高，立即停藥  
(C)隨時注意子宮收縮變化，如收縮不好劑量每半小時調升，直到子宮收縮每1~2 分鐘1 次，不再調升  
(D)注意胎心率的變化，如有胎兒窘迫的情形應隨時停止藥物
- (C) 27 有關新生兒一出生「反應期」之敘述，下列何者錯誤？  
(A)此期通常可持續10~15 分鐘  
(B)新生兒是清醒、警覺且通常是饑餓的狀態  
(C)對刺激反應敏感，呼吸速率快速且規則  
(D)出現強而有力的吸吮反射，腸音通常聽不到
- (D) 28 下列何項狀況須進一步評估產婦為妊娠誘發性高血壓？  
(A)收縮壓高於原先基準值10 mmHg，或舒張壓高於10 mmHg 時  
(B)收縮壓高於原先基準值15 mmHg，或舒張壓高於10 mmHg 時  
(C)收縮壓高於原先基準值20 mmHg，或舒張壓高於15 mmHg 時  
(D)收縮壓高於原先基準值30 mmHg，或舒張壓高於15 mmHg 時
- (B) 29 下列那類婦女可以裝置子宮內避孕器？  
(A)月經過多者 (B)曾剖腹產者 (C)有子宮外孕病史者 (D)疑似懷孕者
- (C) 30 下列何者不屬於乳腺炎 (mastitis) 症狀？  
(A)乳房觸痛 (B)肌肉酸痛 (C)雙側乳房會同時發生 (D)疲憊
- (D) 31 梁女士產後第2 天，詢問新生兒沐浴的相關事項，下列回應何者錯誤？  
(A)幫新生兒洗澡是親子社交的良好時機  
(B)應在溫暖的房間為新生兒洗澡，以減少新生兒體熱散失  
(C)可使用無香料肥皂輕柔的洗淨，避免新生兒皮膚損傷  
(D)眼睛由外向內清洗
- (B) 32 黃女士 32 歲，已婚，最近感覺外陰部嚴重搔癢，且有黃綠色帶有泡沫及腥味的分泌物，引起黃女士陰道感染最有可能的疾病為何？  
(A)念珠菌感染 (B)滴蟲感染 (C)梅毒 (D)淋病

- (C) 33 張女士懷孕 30 週，因子宮規則收縮而住院，超音波掃瞄發現胎兒為臀位，今日張女士主訴下面有大量液體流出，胎心率監測器發現有變異性減速現象，則應採取下列何項措施較適當？  
(A)不做處理，先密切觀察 (B)協助採右側臥  
(C)改換姿勢並預備立即生產 (D)教導深呼吸放鬆
- (D) 34 有關RU486 的使用敘述，下列何者正確？  
(A)為管制藥品第四類，僅能在藥房及醫療院所中販售  
(B)當妊娠尿液試驗呈陽性反應者即可使用  
(C)為口服製劑，以便婦女可在家自行服用  
(D)服用RU486 後，須再合併使用前列腺素，以利胚胎排出
- (D) 35 有關經前症候群的敘述，下列何者錯誤？  
(A)均衡的飲食、規律的運動等生活習慣，有助於減輕經前不適的症狀  
(B)必要時可使用藥物，來緩解經前不適的症狀  
(C)必要時可使用穴位指壓等措施，來緩解經前不適的症狀  
(D)經痛時可以冰敷來減輕疼痛
- (B) 36 林女士 55 歲，已停經3 年，健康檢查時發現有數個小的良性子宮肌瘤，林女士擔心肌瘤是否需要手術處置，醫護人員此時給予的建議，下列何者較不合適？  
(A)至少6 個月追蹤1 次，觀察肌瘤成長的速度，再考慮是否須積極的處置  
(B)建議儘快將子宮切除，以免未來轉成惡性腫瘤  
(C)若沒有明顯不適的症狀，可暫時不須任何的治療  
(D)若有出血、腹痛情況，則須至醫院檢查治療
- (D) 37 有關心臟疾患孕婦之敘述，下列何者正確？  
(A)心臟疾病分類屬第四級者能順利通過生產過程  
(B)心臟疾病分類屬第一級者會儘量建議終止妊娠  
(C)不管那一分級的婦女均不建議其懷孕  
(D)不管那一分級的婦女均應限制妊娠期體重的增加
- (B) 38 有關婦女更年期熱潮紅的敘述，下列何者錯誤？  
(A)體溫調節中樞對熱反應較為敏感，藉由流汗、發熱來使體溫降低  
(B)熱潮紅若發生在晚上，睡眠易中斷，白天會疲倦，可建議白天多喝茶及咖啡提神，以保持清醒  
(C)應保持正常體重，如果太瘦，身體內的天然動情激素量就會減少，熱潮紅的症狀就較嚴重  
(D)教導儘量維持涼爽的環境與溫和的飲食，並保持心情的穩定
- (C) 39 劉太太 39 週自然產下一體重3000 gm 女嬰，有關女嬰呼吸系統的評估結果，下列何者異常？  
(A)呼吸速率每分鐘40~48 次 (B)處於深度睡眠時呼吸最規律  
(C)週期性呼吸停止約30 秒 (D)週期性呼吸但無心跳過緩或膚色改變
- (B) 40 李太太懷孕 32 週，因早發性子宮收縮入院治療，醫囑予以ritodrine (Yutopar) 靜脈滴注 20 c.c./hr，有關照護處置之敘述，下列何者正確？  
(A) ritodrine 藥性溫和無副作用，請李太太不須擔心  
(B)用藥期間應嚴密監測生命徵象、體重及胎心率變化  
(C)用藥期間為防止循環過度負荷，應限制水分的攝取  
(D)常見副作用為孕婦及胎兒心搏率變緩慢

- (B) 41 依照杜凡爾 (Duvall) 之家庭發展階段，下列何者為嬰兒期家庭之最主要的發展任務？  
(A)重組與延伸家庭的關係 (B)適應新父母與祖父母的角色  
(C)協調婚姻關係 (D)照顧祖父母健康問題
- (D) 42 有關核黃疸初期的臨床表徵，下列何者錯誤？  
(A)嗜睡、肌肉張力差 (B)無驚嚇反射 (C)無吸吮反射 (D)角弓反張、高音調哭泣
- (A) 43 有關嬰幼兒事故傷害的敘述，下列何者錯誤？  
(A)嬰兒乘坐轎車時，最好以汽車安全座椅固定於前座駕駛座旁，以方便照顧  
(B)嬰幼兒最容易發生異物哽塞或鉛中毒的危險  
(C)兒童事故傷害發生率最高的場所是在家中  
(D)陽台或樓梯圍欄的高度應高於85公分，欄杆間隔小於10公分為宜
- (C) 44 有關新生兒出生後1週內處於負平衡時期的敘述，下列何者錯誤？  
(A)脂肪消耗 (B)體液流失 (C)體循環改變 (D)去掉胎脂
- (D) 45 有關葡萄糖-6-磷酸鹽去氫酶缺乏症 (Glucose-6-phosphatase dehydrogenase) 兒童發生溶血性貧血時之臨床表徵，下列何者錯誤？  
(A)臉色蒼白 (B)黃疸 (C)尿液呈深褐色 (D)皮膚起皮疹
- (C) 46 吳小弟體重 12 公斤，被火灼傷而入急診，經評估為二度燒傷，燒傷體表面積為30%，依照帕克蘭公式 (Parkland formula)，最先緊急靜脈輸注的溶液是下列何者？  
(A) 5% 葡萄糖溶液 (B)血漿  
(C)乳酸林格氏溶液 (lactated Ringer's solution) (D) 0.9% 生理食鹽水
- (A) 47 5 歲的薇薇，因吃蒟蒻果凍不慎哽塞咽喉，現意識清楚、呼吸困難、無法發聲，依哈姆立克法 (Heimlich method)，護理師應如何協助薇薇？  
(A)讓薇薇站著，在薇薇背後以拳頭的拇指向其劍突下部位，快速向上重壓  
(B)讓薇薇彎下腰，以手掌在薇薇背後肩胛骨間拍擊5下  
(C)讓薇薇仰臥，在薇薇心外按摩的部位施行4次胸部重擊  
(D)讓薇薇側臥，以手掌在薇薇上腹部施壓
- (D) 48 護理師要為 2 歲的幼兒注射4 c.c. 抗生素在20 c.c. 的靜脈點滴中，並且要在30分鐘內滴完，使用的是每c.c.=60滴的精密輸液套，則每分鐘須維持的滴數為：  
(A) 12 (B) 24 (C) 36 (D) 48
- (B) 49 有關兒童甲狀腺機能亢進 (Grave's disease) 的臨床表徵，下列何者錯誤？  
(A)食慾增加，體重卻減輕 (B)皮膚乾燥而皮厚、脫皮  
(C)腸蠕動快，很容易腹瀉 (D)注意力不集中、情緒不穩
- (C) 50 新生兒有下列那兩項檢查結果，可診斷為敗血症？①C反應蛋白質 < 5 mm ②不成熟白血球與嗜中性白血球比  $\geq 0.2$  ③白血球計數  $> 5000/\text{mm}^3$  ④肝蛋白 < 200 mg/dL ⑤紅血球沉降率  $\geq 15 \text{ mm/hr}$   
(A)①② (B)①④ (C)②⑤ (D)③④
- (A) 51 大雄，17 歲，因腹股溝疝氣住院準備開刀，下列何項術前護理指導最合宜？  
(A)提供大雄「腹股溝疝氣開刀衛教手冊」並予討論  
(B)使用第三人稱說故事方式，向大雄解說開刀過程  
(C)使用角色扮演遊戲，向大雄解說開刀過程  
(D)提供大雄雙親「腹股溝疝氣開刀衛教手冊」並予討論
- (B) 52 6 個月大的恩恩因嘔吐、嗜睡，由父母抱入急診，父母表示恩恩曾哭鬧不安，在他們輪流大力搖晃後才安靜下來，下列何者為護理人員應優先執行的處置？  
(A)照會眼科醫師檢查視網膜是否出血 (B)應固定頸椎，予以保護  
(C)觸摸四肢，判斷有無疼痛、腫塊現象 (D)觀察胸腹部位是否有淤青現象

- (B) 53 琪琪，6 個月大，由媽媽抱來接種三合一疫苗，下列措施何者適當？  
(A)利用布偶及空針，說明即將注射的程序 (B)注射後請媽媽擁抱，並提供安撫奶嘴  
(C)注射部位貼上小膠布 (D)注射時儘可能的緩慢推注藥劑
- (C) 54 護理師為3 歲幼兒作丹佛 II 發展測驗 (DDST-II) 前，應向母親解釋此測驗的目的，是爲了測量下列何者？  
(A)物體恆存及保留概念的認知狀況 (B)記憶、推理、適應新情況及抽象想像的能力  
(C)社會適應能力、精細動作、粗動作及語言的發展 (D)性別認同及自我概念的發展
- (C) 55 臨床上，早產兒容易出現呼吸窘迫症候群 (RDS) 的主要原因爲何？  
(A)周邊化學感受器不敏感 (B)大腦呼吸調節中樞未成熟  
(C)肺泡表面張力素不足 (D)肋間肌的擴張力差
- (A) 56 32 週早產兒的照護措施，下列何者不適當？  
(A)氧氣罩 (O<sub>2</sub> hood) 給氧時，氧流量需低於5 L/min，以免氧中毒  
(B)抽痰的壓力控制在40~80 mmHg  
(C)採用的抽痰管的管徑爲5~8 Fr.  
(D)定期給與表面張力素 (surfactant)，以增加肺泡發育
- (D) 57 王小弟，10 歲，爲白血病末期患者，下列護理措施何者不適當？  
(A)協助王小弟完成心願 (B)使用一些措施來緩和王小弟痛苦的症狀  
(C)鼓勵王小弟說出心中的感覺 (D)避免與王小弟談到死亡
- (C) 58 患有高膽紅素血症的嬰兒，接受照光治療，下列護理措施何者不適宜？  
(A)若全血膽紅素值 > 18 mg/dL，需停止餵食母乳  
(B)照光前全身可以塗抹乳液，以減少皮膚乾燥、脫皮  
(C)易出現便秘，應給與軟便劑  
(D)代謝加速、體溫會微上升，宜多補充水分
- (D) 59 有關糖尿病酮酸中毒之護理措施，下列何者不適合？  
(A)觀察有無庫斯毛耳氏呼吸 (Kussmaul's respiration)，或低血鉀現象  
(B)使用短效胰島素可很快控制血糖  
(C)設立靜脈液體輸注管路，提供液體  
(D)立即補充可迅速吸收的醣類飲食
- (B) 60 「4D」是會厭炎 (epiglottitis) 臨床主要的四大表徵，而下列何者不屬於「4D」之表徵？  
(A)發音困難 (dysphonia) (B)言語困難 (dysphasia)  
(C)吞嚥困難 (dysphagia) (D)流口水 (drooling)
- (D) 61 有關預防日本腦炎的敘述，下列何者錯誤？  
(A)凡年滿15 個月的兒童即可開始接種日本腦炎疫苗  
(B)每年3~5 月爲日本腦炎疫苗接種期  
(C)需減少住家附近污水淤積，注意環境衛生  
(D)需撲滅傳染媒介埃及斑蚊
- (C) 62 小華因呼吸喘而緊急入院接受治療，醫師診斷爲外在因子所誘發之氣喘，其臨床血液檢驗指標會出現下列何種免疫球蛋白增加？  
(A) IgA (B) IgD (C) IgE (D) IgM
- (D) 63 下列何種情況，不宜執行胸腔物理治療？  
(A)肺炎 (B)支氣管炎 (C)哮喘 (D)肺栓塞
- (B) 64 有關法洛氏四重畸形 (TOF) 解剖上主要的四種缺損，下列何者除外？①心室中隔缺損 ②主動脈狹窄 ③肺動脈狹窄 ④主動脈跨位於心室缺損部位 ⑤心房中隔缺損 ⑥右心室肥厚  
(A)①④ (B)②⑤ (C)③⑤ (D)④⑥

- (D) 65 有關氣喘的臨床表徵，下列何者錯誤？  
(A)輕度時會有呼吸心跳增快，呼吸末期有輕微喘鳴音  
(B)中度時會有帶痰音的咳嗽，說話會喘  
(C)重度時，精神不安、發紺、呼吸喘鳴音很大聲  
(D)呼吸衰竭時，呼吸>30 次/分，心跳>120 次/分
- (B) 66 有關骨髓檢查的敘述，下列何者錯誤？  
(A)為確立白血病的依據  
(B)較大的兒童大多抽取胸骨的骨髓  
(C)正常兒童骨髓中未成熟的白血球只有5%  
(D)穿刺部位以紗布覆蓋加壓至少15 分鐘
- (D) 67 下列何種先天性心臟病會引起肺血流量增加，導致肺水腫？  
(A)主動脈瓣狹窄 (aortic stenosis)  
(B)主動脈狹窄 (coarctation of aorta)  
(C)肺動脈狹窄 (pulmonic stenosis)  
(D)心室中隔缺損 (ventricular septal defect)
- (A) 68 甜甜患有第1 型糖尿病，已接受胰島素治療，下列何種情形易引發酮酸中毒？  
(A)感染 (B)未進食 (C)胰島素過量 (D)運動量增加
- (C) 69 小立罹患先天性心臟病，按醫囑須服用Digoxin 及Lasix，護理師在提供父母飲食衛教的時候，建議多補充香蕉、柑橘等食物，主要目的是為了預防：  
(A)低血鈉 (B)低血鈣 (C)低血鉀 (D)低血磷
- (B) 70 有關重型β型海洋性貧血(β-thalassemia)的敘述，下列何者正確？  
(A)是一種體染色體顯性遺傳疾病  
(B)母親於懷孕初期可做絨毛膜穿刺術確定診斷  
(C)出生後即出現明顯的、嚴重的溶血性貧血症狀  
(D)不需定期輸血，當血色素低於4 gm/dL 時，才需輸血
- (D) 71 有關腎病症候群的敘述，下列何者正確？  
(A)主要是因β型溶血性鏈球菌感染  
(B)治療以抗生素為主  
(C)住院期間飲食採低鹽、低脂、低醣、低蛋白飲食  
(D)在類固醇治療期間應暫停注射常規疫苗
- (B) 72 有關白血病(leukemia)兒童潛在性感染的危險，下列敘述何者正確？  
(A)血小板過多，容易血管阻塞 (B)未成熟的白血球無法抵抗感染  
(C)紅血球的數目不足以攜帶氧氣 (D)凝血因子不足，無法止血
- (D) 73 有關膽道閉鎖(biliary atresia)的臨床表徵，下列何者錯誤？  
(A)解灰白色大便 (B)尿液呈暗茶色 (C)肝脾腫大 (D)心智障礙
- (B) 74 有關兒童泌尿道感染的敘述，下列何者正確？  
(A)1 歲以下女童發生率較男童高  
(B)最常見的致病原是大腸桿菌  
(C)體溫正常後，即可停止服用抗生素，重製必究！  
(D)多吃水果，以維持尿液的pH 值為8，可以有助於抑制細菌繁殖
- (A) 75 有關腸套疊(intussusception)之敘述，下列何者錯誤？  
(A)身體瘦弱的兒童較易發生 (B)有陣發性腹痛  
(C)解草莓果醬樣大便 (D)常使用鉭劑灌腸法或外科治療

- (D) 76 下列何種致病原引起的腸胃炎常併有上呼吸道感染，屬自癒性疾病，但傳染力很高？  
(A)志賀氏桿菌 (B)沙門氏桿菌 (C)鏈球菌 (D)輪狀病毒
- (A) 77 林小弟，3 個月大，因罹患幽門狹窄接受手術，有關手術後餵食的護理，下列何者錯誤？  
(A)在林小弟清醒後，即可嘗試餵食牛奶  
(B)餵食時頭部要略微抬高，餵食後則採半坐臥位  
(C)宜選擇適當大小的奶嘴，避免餵食過快  
(D)要密切觀察餵食量、餵奶時間及嘔吐情形
- (B) 78 細菌性腦膜炎病童的腦脊髓液檢查不會呈現下列何種結果？  
(A)白血球數量 $550/\text{mm}^3$  (B)葡萄糖濃度 $100 \text{ mg/dL}$   
(C)蛋白質濃度 $120 \text{ mg/dL}$  (D)腦脊髓液壓力 $200 \text{ mmH}_2\text{O}$
- (A) 79 協助吞嚥能力較差之腦性麻痺 (cerebral palsy) 兒童進食的措施，下列何者不適當？  
(A)選擇質細、纖維低、口味重的飲食，以促進其食慾  
(B)以三指下顎控制法協助兒童閉嘴、咀嚼及吞嚥  
(C)先熱敷兒童腭部，再予按摩，以放鬆僵硬的腭部  
(D)維持兒童頭部在正中位置，將食物置於舌頭後方，以利吞嚥
- (D) 80 幼兒罹患先天性髖脫位，以布萊安特氏 (Bryant's) 牽引器牽引時，應採何種姿勢？  
(A)垂頭仰臥，患肢利用牽引器向下牽引  
(B)側躺，患肢髖關節屈曲呈 $20^\circ$   
(C)半坐臥，將患肢拉高 $45^\circ$ 以砂袋固定  
(D)平躺、髖關節屈曲 $90^\circ$ ，雙腳向上牽引，臀部微離床面

建  
國

【版權所有，重製必究！】