

《基礎護理學概要》

- (C) 1 下列何者是輸血反應中急性溶血反應最常見的主因？
(A)過敏體質 (B)白血球產生抗體 (C)ABO 血型不合 (D)血液血漿蛋白過敏
- (C) 2 有關收集尿液培養檢體的敘述，下列何者正確？
(A)主要目的之一是檢查尿液是否有病毒感染
(B)尿液檢體最好在60分鐘內送檢
(C)尿液檢體放置過久，會造成尿液pH值升高
(D)若病人有存留導尿管，則將導尿管與蓄尿袋分離，再以空針從導尿管開口處抽取尿液檢體
- (D) 3 為尿失禁病人提供之護理措施，下列敘述何者錯誤？
(A)避免飲用茶、咖啡等飲料 (B)教導要定時解尿
(C)隨時保持會陰部乾燥與清潔 (D)限制液體量每日1000 c.c.
- (B) 4 有關誘尿的方法，下列何者不適當？
(A)會陰沖洗 (B)膀胱部位冷敷 (C)手握冰塊 (D)聽流水聲
- (C) 5 病人的出院準備計畫應由何時開始實施？
(A)出院前1天 (B)出院時 (C)入院第1天 (D)出院前3天
- (B) 6 有關糞便顏色的敘述，下列何者錯誤？
(A)綠色的糞便可能為腸道感染 (B)食用甜菜會使糞便成黑色
(C)服用鐵劑會使糞便成柏油色 (D)膽道阻塞時，會有灰白色糞便
- (B) 7 排便反射作用主要是受下列何部位的神經所控制？
(A)L4-L5 腰神經 (B)S2-S4 薦神經 (C)T1-T12 胸神經 (D)C1-C2 頸神經
- (C) 8 有關水劑藥物的準備，下列何者錯誤？
(A)給藥前需將藥液搖勻 (B)倒藥時藥杯與視線保持平行
(C)以液面最凸點為測量標準 (D)倒完藥液後藥物瓶口應以衛生紙由上往下擦拭
- (A) 9 接受血小板靜脈輸注之注意事項，下列敘述何者正確？
(A)輸注時，若為血小板濃厚液時，以每5分鐘輸入1單位為標準
(B)必須慢慢輸注，以免發生輸血反應
(C)若無法馬上輸注，可將血小板暫存於病房冰箱備用
(D)一般可在室溫下保存21天
- (B) 10 靜脈輸液套管內出現一大段空氣之處理，下列何者為首要步驟？
(A)抬高注射部位 (B)關閉管夾 (C)將輸液管拉直輕彈 (D)使用原子筆纏繞輸液管
- (B) 11 有關一般靜脈輸液主要目的，下列敘述何者正確？
(A)降低體溫 (B)補充體液及電解質 (C)減輕疼痛 (D)緩解焦慮
- (C) 12 護理人員正確給藥的職責包括：①與醫師討論存疑的醫囑 ②協助醫師調劑 ③評值藥物之作用與觀察副作用 ④未澄清的醫囑拒絕給藥
(A)①②③ (B)①②④ (C)①③④ (D)②③④
- (D) 13 執行眼藥水滴入法，藥水應滴入下列何部位？
(A)上眼瞼內 (B)角膜 (C)眼角 (D)結膜下穹窿
- (B) 14 有關管灌飲食的敘述，下列何者錯誤？
(A)溫度：37.8~40.5℃ (B)高度：液面與胃距離15~20 cm
(C)每次灌食量：250~300 c.c. (D)每次灌食時間：15~20分鐘

- (B) 15 下列何種飲食適用於無法由口咀嚼或吞嚥食物的病人？
(A)清流質飲食 (B)全流質飲食 (C)軟質飲食 (D)細碎飲食
- (C) 16 有關正常呼吸的敘述，下列何者錯誤？
(A)潮氣容積約500~700 c.c. (B)呼吸速率約12~20 次/分鐘
(C)吸氣與呼氣的比率約3：2 (D)呼吸與脈搏的比例約1：4
- (B) 17 下列那些情況會導致呼吸過緩？①顱內壓升高 ②酮酸中毒 ③服用嗎啡過量 ④發燒
(A)①② (B)①③ (C)②③ (D)②④
- (A) 18 下列何者是冰枕、熱水袋、酒精拭浴、冷熱敷達到其治療目的之主要機轉？
(A)傳導 (B)對流 (C)轉換 (D)輻射
- (C) 19 下列情況，何者不適用熱水坐浴療法？
(A)直腸手術後病人 (B)痔瘡病人 (C)不明原因腹痛病人 (D)自然生產後婦女
- (A) 20 下列那一情況會增加用冷治療的危險性？
(A)雷諾氏症候群 (B)口腔疼痛 (C)體內裝置心臟節律器者 (D)關節扭傷24 小時內
- (A) 21 約束個案肢體，末梢循環應多久觀察一次？
(A)15~30 分鐘 (B)1 小時 (C)2 小時 (D)4 小時
- (B) 22 一般而言，年齡與所需睡眠時間的關係為何？
(A)隨年紀增加而增加 (B)隨年紀增加而減少
(C)20 歲達高峰之後遞減 (D)50 歲達高峰之後遞減
- (B) 23 使用於背部護理之酒精濃度，下列何者正確？
(A)30% (B)50% (C)70% (D)90%
- (A) 24 下列何種關節僅可以做屈曲和伸展兩種關節運動？
(A)膝關節 (B)腕關節 (C)踝關節 (D)髖關節
- (C) 25 有關院內感染的敘述，下列何者錯誤？
(A)是指病人住院中得到的感染
(B)不包括住院前就已經潛伏的感染
(C)不包括病人出院24 小時內出現症狀的感染
(D)包括病人入院後到出院前就已經潛伏的感染
- (C) 26 下列何者為病人健康資料的最佳來源？
(A)醫師 (B)病歷紀錄 (C)個案本身 (D)家屬及親友
- (C) 27 下列何者為因輸血而感染愛滋病 (AIDS) 的傳染途徑？
(A)直接接觸傳染 (B)間接接觸傳染 (C)媒介傳染 (D)交互傳染
- (C) 28 下列何者不是長期醫囑 (standing order) ？
(A)Ampicillin 1# (250 mg) P.O. q6h (B)Demerol 50 mg I.M. q4h p.r.n.
(C)Glycerin enema 100 mL S.O.S. (D)Ativan 1# (0.5 mg) P.O. h.s.
- (B) 29 林小姐告訴你說：「我覺得腳扭傷時，中醫治療比西醫治療有效」，此時運用下列何項會談技巧較為適宜？
(A)讚賞 (B)不批評 (C)沉默 (D)質問
- (D) 30 下列何者為治療處方註明的「O.D.」？
(A)左耳 (B)右耳 (C)左眼 (D)右眼
- (C) 31 有關安全防護措施敘述，下列何者錯誤？
(A)隨時維持安全通道的通暢
(B)儲備足量的急救用藥品與器材
(C)定期檢測建築物基本結構，龜裂時應重新油漆
(D)化學藥品應分類存放，以防危險

- (D) 32 有關預防給藥錯誤的方法，下列敘述何者錯誤？
(A)給藥必須要有醫囑 (B)發藥時要稱呼病人全名
(C)麻醉藥物需放置於加鎖的藥櫃中 (D)過期未超過3天的藥物尚可服用
- (C) 33 利用視聽觸叩得知的病人狀況，是屬於下列何種觀察法？
(A)旁觀性觀察 (B)自省性觀察 (C)直接觀察法 (D)參與性觀察法
- (B) 34 依據哈佛腦死標準，下列何者不能作為死亡判定的依據？
(A)腦波圖呈一直線 (B)心跳停止、瞳孔放大
(C)無自然呼吸、無肌肉活動 (D)對刺激無感受、無反應
- (B) 35 護理腹瀉的病人時，最重要的目標是避免病人發生下列何種情形？
(A)全身虛弱無力 (B)體液電解質的不平衡 (C)肛門周圍皮膚疼痛 (D)體重下降
- (D) 36 陳先生血糖不穩定，order：q.o.d. check F/S，此表示應多久測1次血糖？
(A)每天 (B)每小時 (C)每4 小時 (D)每2 天
- (C) 37 在人際關係發展的週期中，下列何者為「護理人員與病人主動參與健康問題的確立」的階段？
(A)介紹前期 (B)介紹期 (C)工作期 (D)結束期
- (D) 38 臨床上注射結核菌素試驗後，下列何者為觀察反應的時間？
(A)1 小時以內 (B)4~6 小時 (C)12~24 小時 (D)48~72 小時
- (B) 39 病人輸血前，除做交叉試驗外，還需檢查那些項目？①血液電解質之成分 ②ABO血型 ③白血球分類 ④Rh因子 ⑤血容積比率
(A)①③ (B)②④ (C)③④ (D)④⑤
- (B) 40 林太太手術後第1天，需接受靜脈點滴注射，醫囑為D5W 500 c.c.+KCL 10 mEq及D5S 1500 c.c. I.V. q.d.，若採用普通輸液套管，下列何者為每分鐘應保持的滴數？
(A)13 滴 (B)21 滴 (C)33 滴 (D)50 滴
- (B) 41 下列那些為脫水之症狀與徵象？①皮膚飽滿度減少 ②口腔黏膜乾燥 ③體溫上升 ④血壓上升
(A)①②④ (B)①②③ (C)①③④ (D)②③④
- (D) 42 有關全靜脈營養療法 (TPN) 的合併症，下列何者錯誤？
(A)空氣栓塞 (B)敗血症 (C)高血糖 (D)低血鉀
- (B) 43 體溫調節反應器包括下列那些？①血管 ②下視丘 ③汗腺 ④骨骼肌 ⑤皮膚
(A)①②③ (B)①③④ (C)②③④ (D)③④⑤
- (C) 44 吳先生診斷為buccal cancer，頰部、耳部及頸部有多處轉移腫塊，不時的流出惡臭分泌物，護理人員依醫囑q.d.&p.r.n. 換藥，協助吳先生測量體溫時，最適宜採用下列何種方式？
(A)口溫 (B)耳溫 (C)腋溫 (D)額溫
- (B) 45 有關選擇靜脈注射部位，下列何者正確？
(A)長期靜脈輸注宜使用近端的大靜脈
(B)輸血治療宜選取較大的靜脈
(C)為使輸液順暢，宜選擇肌肉較發達、活動較多的手臂靜脈
(D)暫時性的靜脈輸注宜選用下肢靜脈
- (D) 46 為避免發生無音區而造成高血壓病人血壓值被低估的危險，應如何測量血壓？
(A)打氣至140 mmHg 才開始聽血壓值
(B)打氣至180 mmHg 才開始聽血壓值
(C)打氣至橈動脈搏動消失後，繼續向上打氣10 mmHg 才開始聽血壓值
(D)打氣至橈動脈搏動消失後，繼續向上打氣30 mmHg 才開始聽血壓值

- (B) 47 有關脈搏速率的敘述，下列何者錯誤？
(A)女性比男性脈率稍快 (B)體表面積愈大，脈率愈快
(C)平躺時脈率低於站立時 (D)嚴重且無法緩和的疼痛脈率會變慢
- (B) 48 有關影響「冷熱應用」效應的敘述，下列何者正確？
(A)使用於皮膚表層時，熱比冷敏感
(B)使用時間長，耐受力會增加，敏感度降低
(C)皮膚較厚處，對冷熱的敏感度大
(D)使用面積小者，效果及反應較大
- (A) 49 冷療法無法達到下列何種治療目的？
(A)肌肉鬆弛 (B)止血 (C)止痛 (D)抑制炎症反應
- (D) 50 在收集到的資料中，下列何者屬於主觀資料？
(A)測量血壓為100/70 mmHg (B)尿液呈現清澈淡黃色澤
(C)臉色蒼白、盜汗 (D)感覺肚子痛、悶悶的
- (B) 51 有關換氣過度的敘述，下列何者正確？
(A)常出現在腹水的病人 (B)病人會有手指發麻及頭暈
(C)主要是因為缺氧所致 (D)病人會出現空氣飢餓感 (air hunger)
- (B) 52 下列何者為痔瘡切除術採用之姿勢？
(A)膀胱截石術臥位 (B)截刀式臥位 (C)屈膝仰臥式 (D)膝胸臥式
- (B) 53 下列那些病人容易有口腔黏膜改變的問題，需給與特別口腔護理？①張口呼吸者 ②昏迷者
③腹部手術者 ④化學治療者
(A)①②③ (B)①②④ (C)①③④ (D)②③④
- (C) 54 有關壓瘡之敘述，下列何者錯誤？
(A)相同壓力，受壓面積愈大則局部壓力愈小
(B)壓力大於25~30 mmHg 會造成局部組織的缺血
(C)短時間承受大的壓力比長時間承受小的壓力傷害還大
(D)肌肉組織對缺血的敏感度高於皮膚
- (B) 55 下列何者不是長期臥床對心臟血管系統造成的影響？
(A)姿位性低血壓 (B)減少心臟負擔
(C)形成靜脈血栓 (D)增加伐耳沙伐氏操作 (Valsalva maneuver) 機會
- (A) 56 有關旋前 (pronation) 運動的敘述，下列何者正確？
(A)轉前臂使掌心朝下 (B)轉前臂使掌心朝上
(C)腳掌面向身體中線 (D)腳掌背離身體中線
- (B) 57 當病人皮膚出現水泡，且受傷部位已到達真皮層，此時病人處於壓瘡的那一期？
(A)充血期 (B)缺血期 (C)壞死期 (D)潰瘍期
- (C) 58 有關氧化乙烯 (E.O.) 滅菌法的敘述，下列何者錯誤？
(A)E.O.的有效濃度為10~20%
(B)E.O.滅菌的溫度一般是50~60°C
(C)濕度維持在40% 以下為宜
(D)滅菌時間依氧化乙烯之濃度、溫度、濕度改變的情況而定
- (B) 59 確立護理對象的現存健康問題是護理過程中的那一個步驟？
(A)護理評估 (B)護理診斷 (C)護理措施 (D)護理評估
- (D) 60 有關預期成果的敘述，下列何者最完整？
(A)病人能用柺杖走路 (B)能促進傷口癒合
(C)病人2 天內能減輕疼痛程度 (D)病人體重能於3 週內減少1 公斤

- (C) 61 有關潛在性危險性的護理診斷，下列敘述何者正確？
(A)出現症狀與徵象
(B)具定義性特徵
(C)訂定目標及措施，預防健康問題發生
(D)護理措施之重點在減輕症狀
- (A) 62 「每2 小時協助病人翻身1次」是屬於下列何種護理功能？
(A)獨立性護理功能 (B)相依性護理功能
(C)非獨立性護理功能 (D)醫囑性護理功能
- (D) 63 當病人出現數個健康問題，下列何者在安排護理診斷的優先順序上需作考量？
(A)護理措施的方便性 (B)大多數病人的共同問題
(C)人力的安排 (D)病人覺得健康問題的重要性
- (C) 64 有關使用無菌包的敘述，下列何者正確？
(A)解開無菌包後，有帶子的一角應置於操作者的近側
(B)打開包布時只要不碰到內裝的敷料就好，包布的內面可以碰觸
(C)取出所需敷料後應儘快將包布內角覆蓋剩餘敷料，以減少暴露時間
(D)無菌敷料包中剩下的敷料，即使仍在有效期限內也不可再使用
- (B) 65 有關護理目標書寫時的注意事項，下列敘述何者錯誤？
(A)目標書寫時應簡潔且扼要
(B)書寫時是以護理人員將達到的事項為目標
(C)具體目標應使用可測量或可觀察到的文字來敘述
(D)護理目標是執行護理措施之後做為評估時的依據
- (C) 66 使用甘油做潤唇液的濃度應為下列何者？
(A)100% (B)80% (C)50% (D)20%
- (B) 67 當病人告訴你他有神力可以飛行，你為其主護護理人員，下列何種反應最適當？
(A)「怎麼可能，我不相信。」
(B)「這真的令我難以相信！」
(C)心不在焉地點頭或「嗯」
(D)「我相信，那您可以飛給我看看嗎？」
- (B) 68 下列何者不是觀察病人之目的？
(A)作為擬訂護理計畫的依據 (B)作為幫病人下決定的依據
(C)作為醫療小組診斷治療之參考 (D)作為未來護理研究與發展的參考
- (C) 69 下列何者為醫院最常見的機械性傷害？
(A)燒燙傷 (B)觸電 (C)跌倒 (D)火災
- (B) 70 有關鋪床之注意事項，下列何者正確？
(A)應遵守外科無菌原則 (B)橡皮中單上應再加鋪布中單
(C)應使用肩部力量，而非手肘小肌肉力量 (D)鋪床後應將床鋪搖高固定
- (A) 71 給與病人背部按摩時，下列何者為開始與結束所使用之方法？
(A)按撫法 (stroking) (B)揉捏法 (kneading)
(C)重擦法 (friction) (D)敲擊法 (tapotement)
- (C) 72 協助病人使用烤燈的步驟，下列何者正確？
(A)照射前、後在局部皮膚塗上一層油劑
(B)烤燈至皮膚的距離為：40 瓦特數，25~30 吋
(C)烤燈使用時間以15~20 分鐘為限
(D)皮膚出現過度發紅、疼痛時，將距離拉遠

情況：王先生是一位大腸癌末期病人，目前無法由口進食、大小便失禁、無法下床活動，只能靠鼻胃管灌食攝取營養，生活機能完全需要由他人代勞。當王先生對護理人員說：「我這樣活著有什麼意義，不如讓我死了算了。」依此回答下列第73 題至第75 題。

- (C) 73 下列何者是護理人員回應王先生最適當的方式？
(A)「你不要灰心，我們一定會盡全力讓你康復的。」
(B)「你怎麼可以講這種喪氣的話。」
(C)「你不想跟我談一談？」
(D)「想一想你的家人，你死了他們怎麼辦？」
- (A) 74 王先生主訴：「我全身好痛，快給我打止痛針。」則護理人員應該採取下列何種護理措施？
(A)相信他所說的，依醫囑給與止痛劑
(B)轉移他的注意力以減輕疼痛
(C)懷疑他所說的，然後給與安慰劑
(D)跟他解釋用止痛劑會造成成癮現象，所以請他忍耐
- (B) 75 王先生因病情加劇不幸去世，家屬難忍悲痛痛哭失聲。護理人員應採取的措施，下列何者最適當？①將家屬帶到會客室 ②傾聽家屬之陳述，並陪伴家屬 ③請家屬先離開，以免影響其他病人 ④待家屬情緒較穩定時，引領家屬一同做屍體護理，送王先生最後一程
(A)①②③ (B)①②④ (C)①③④ (D)②③④
- (C) 76 有關硫酸鋇 (barium sulfate) 灌腸的敘述，下列何者正確？①屬於非保留灌腸中的診斷性灌腸 ②灌入量500~1500 c.c. ③檢查前須先做清潔灌腸 ④硫酸鋇會被腸黏膜吸收，無副作用 ⑤檢查前一天應進食低渣飲食，9 P.M.後即禁食
(A)①③ (B)①④ (C)②③ (D)③⑤
- (D) 77 有關輻射散熱的敘述，下列何者錯誤？
(A)人在室溫的休息狀態中，大約有50~70% 的熱是以輻射方式散失的
(B)其傳播是不需以其他物質作媒介的
(C)其熱源的散失是直接的，可把熱輻射至四面八方
(D)在溫度較高的環境中，輻射散熱的比例也較高
- (C) 78 有關坐臥姿之敘述，下列何者錯誤？
(A)可減少頸部術後的出血
(B)需用枕頭支托頸、背部，以維持脊椎正常曲線
(C)不可搖高床尾，以防壓迫膝膕神經
(D)勿快速更換姿勢，以防姿位性低血壓
- (B) 79 一位產婦向護理人員詢問有關玻璃奶瓶的煮沸消毒方法，下列敘述何者錯誤？
(A)消毒前，應先將奶瓶洗淨
(B)奶瓶應於水煮沸後，再放入
(C)煮沸時，水面應蓋過奶瓶1 吋以上
(D)消毒時間以水沸騰後，開始計時10 分鐘
- (B) 80 爲了增加憂鬱病人興奮刺激作用，應佈置下列何種色系的環境？
(A)粉紅色 (B)米黃色 (C)水藍色 (D)墨綠色