

《產兒科護理學》

- (D) 1 為維持婦女正常陰道生態環境，下列何項衛教正確？
(A)應使用衛生棉條，以維持內褲的乾爽
(B)不宜穿著純棉製品內褲，以減少過敏反應
(C)如廁後都應採溫水陰道灌洗，以減少菌叢滋生
(D)避免攝取過多碳水化合物，以減少重複性黴菌感染
- (C) 2 有關更年期荷爾蒙補充療法，下列敘述何者錯誤？
(A)荷爾蒙補充療法為緩解停經症狀，而非預防疾病
(B)當更年期症狀減輕後，可以在6~9 個月內逐漸減藥和停藥
(C)只要使用荷爾蒙補充療法，即可確保更年期婦女身心健康，並永保青春
(D)2002 年美國國家衛生研究院研究發現，荷爾蒙補充療法與罹患乳癌相關
- (C) 3 下列有關母奶的保存方式，何者錯誤？
(A)成熟奶放於冷凍庫，可放置3 至4 個月
(B)成熟奶放於25°C以下的室溫，可放置6~8 小時
(C)成熟奶放於冰箱4°C內冷藏，不可超過24 小時
(D)冰過的奶水不可以使用微波爐加熱
- (B) 4 產後評估深層靜脈血栓，進行伸直腿且足板背側彎曲的試驗稱為：
(A)希氏試驗 (Schultze test)
(B)霍曼氏試驗 (Homan's test)
(C)畢夏氏試驗 (Bishop's test)
(D)貝拉德試驗 (Ballard test)
- (C) 5 下列何者為哺乳婦女最佳的避孕方法？
(A)口服避孕藥 (B)觀察陰道黏液之分泌 (C)保險套 (D)計算安全期
- (D) 6 母乳中何種成分較配方奶粉含量低？
(A)乳糖 (B)乳清蛋白 (C)不飽和脂肪酸 (D)鐵鈣濃度
- (C) 7 黃女士G₁P₁，剖腹生產後第2 天，尚未排氣，主訴腹脹不適，目前束腹帶使用中，下列何項獨立性護理措施最適宜？
(A)鬆開束腹帶，使腹肌鬆弛，有助於腸蠕動之恢復
(B)請醫師給予塞劑或灌腸，促進腸蠕動，改善腹脹情形
(C)協助多翻身，並給予薄荷油擦拭腹部，以促進腸蠕動
(D)請醫師增加口服軟便劑量，改善腹脹情形
- (B) 8 陳女士G₂P₂，自然生產後第4~5 天，護理師觸診產婦腹部時發現肌肉張力差，此時應鼓勵作下列何項產後運動？
(A)凱格式運動 (Kegel's exercise) (B)頸部運動
(C)仰臥起坐 (D)膝胸臥式
- (C) 9 李女士G₁P₁，自然生產後第3 天，向護理師表示：「嬰兒吸吮乳房時，乳頭會痛」，下列護理指導何者正確？
(A)告知產後第一週哺餵時乳頭會痛是正常的現象
(B)教導停止讓嬰兒吸吮乳房
(C)確定餵奶姿勢及寶寶含乳的姿勢
(D)教導減少每次餵奶的時間

情況：朱女士懷孕39週，自然產下一男嬰。依此回答下列第10題至第11題。

- (A) 10 朱女士採純母乳哺餵，新生兒出生第3天發現有黃疸的情況，經醫師檢查無其他病理性疾病，下列何者為護理師最合宜的護理指導？
- (A)「這是正常現象，不必擔心」
(B)「應修正新生兒含乳的姿勢，減少哺餵母乳次數」
(C)「單純的母乳性黃疸，可能持續到2個月才會完全消退」
(D)「應等黃疸消退後才開始哺餵比較安全」
- (D) 11 朱女士要出院了，詢問新生兒沐浴的相關事項，下列回答何者不適當？
- (A)「為避免吐奶，先洗澡再餵奶比較恰當」
(B)「要經常幫新生兒洗頭髮，以避免頭皮上鱗屑的形成」
(C)「要控制環境的溫度，維持新生兒體溫是很重要的」
(D)「新生兒沐浴應先洗頭髮再洗臉部，最後洗軀幹」
- (C) 12 下列何者不屬於產後婦女的退行性變化 (retrogressive change)？
- (A)惡露排出 (B)子宮底下降 (C)乳汁分泌 (D)陰道及會陰裂傷修復
- (D) 13 林女士懷孕39週，3小時前剛以自然生產方式娩出一男嬰，評估其新生兒身體成熟度，下列敘述何者最正確？
- (A)體表皮膚粉紅光滑可見到血管，腳底沒有皺褶
(B)體表胎毛稀薄，耳翼扁平，腳前部有橫的皺褶
(C)體表胎毛豐富，陰囊有些皺褶，睪丸開始下降
(D)體表皮膚乾燥、脫皮看不見血管，睪丸已下降
- (A) 14 當新生兒的生命徵象 (體溫、脈搏及呼吸) 出現下列何種情形時，需立即通知醫師處理？
- (A) 36.5°C、90、20 (B) 36.6°C、120、30
(C) 36.8°C、130、45 (D) 37.1°C、150、60
- (A) 15 下列妊娠期間感染TORCH 症候群之敘述，何者正確？
- (A)孕期18週內，胎盤內滋養層細胞對胎兒有保護作用，故感染梅毒螺旋體不會影響胎兒健康
(B)若未具德國麻疹抗體且確定未懷孕者，可接種疫苗，但是須在接種2週後才可懷孕
(C)為避免感染巨細胞病毒，孕婦應避免與貓狗等寵物糞便接觸的機會
(D)疱疹病毒 (HSV-II) 多是經由胎盤傳給胎兒，易導致胎兒肝脾腫大，甚至死亡的後果
- (C) 16 心臟病孕婦於懷孕期間應避免：
- (A)高蛋白飲食 (B)適度的活動 (C)體重過重 (D)子宮頸抹片檢查

情況：張女士，懷孕31週，晨起上廁所時，突然發現自己陰道流出鮮血，由於沒有任何疼痛現象，因此沒有立即就診，而以電話諮詢醫院護理師。依此回答下列第17題至第18題。


- (A) 17 張女士較有可能的問題是？
- (A)前置胎盤 (placenta previa) (B)胎盤早期剝離 (abruptio placenta)
(C)脅迫性流產 (threatened abortion) (D)妊娠毒血症 (eclampsia)
- (D) 18 張女士詢問護理師目前應該如何處理，合宜的回答是？
- (A)「您先臥床休息並觀察是否繼續出血，若3小時後仍繼續出血，再到醫院來」
(B)「若是合併有腹部疼痛時，您就應該到醫院來」
(C)「請您休息並觀察症狀，若有羊水流出，則應立即到醫院來」
(D)「依您的症狀看來，應儘早就醫檢查及治療」
- (A) 19 子宮頸抹片檢查不適合用於下列何種情況的婦女？
- (A)急性子宮頸炎 (B)月經結束後第5天
(C)子宮頸曾行錐狀手術 (conization) (D)3天前有性生活

- (B) 20 有關子宮頸癌婦女接受體腔內放射線治療的護理計畫，下列何者錯誤？
(A)限制孕婦及孩童訪客
(B)採高蛋白高纖維飲食
(C)治療期間鼓勵執行床上運動
(D)評估血液檢查白血球在3000/mm³以上及血紅素在10 gm%以上才可以接受治療
- (D) 21 王女士罹患上皮性卵巢癌，已完成手術和化學治療，為了追蹤腫瘤復發可能性，須監測下列何種腫瘤指標？
(A)鱗狀細胞癌抗原 (SCC-AG) (B)血清CA-153
(C)人類絨毛膜性腺激素 (HCG) (D)血清CA-125
- (A) 22 某婦女目前服用口服避孕藥，因罹患念珠球菌陰道炎，外陰部搔癢，有白色乳酪狀分泌物，下列照護措施何者除外？
(A)口服抗生素metronidazole (Flagyl) (B)教導陰道塞劑使用方法
(C)外陰部塗抹類固醇藥膏 (D)暫停服用口服避孕藥
- (C) 23 陰道內診後，坐骨棘假想連線 (station) 為-2，其意義為胎兒先露部到達那個位置？
(A)坐骨棘連線上方2 指 (B)坐骨棘連線下方2 指
(C)坐骨棘連線上方2 公分 (D)坐骨棘連線下方2 公分
- (C) 24 下列何項描述是目前產科護理發展之趨勢？
(A)鼓勵實施親子同室，限制訪客以預防新生兒感染
(B)積極採用產科醫療或藥物，如無痛分娩減輕產痛
(C)尊重孕婦自主與決策權，協助規劃其生產計畫書
(D)產後2~3 天當產婦獲得足夠休息後開始母乳哺育
- (B) 25 自然生產前，醫護人員給予填寫同意書，並解說注意事項，是針對產婦的那一項權利？
(A)隱私權 (B)知曉同意權 (C)公平正義權 (D)不傷害權
- (C) 26 鄭女士產檢時向護理師表示陰道有白色分泌物且會陰有搔癢的情形，此時護理指導何者最正確？
(A)此為正常現象，不需任何處理 (B)此為正常現象，可採陰道灌洗減少不適
(C)此為異常現象，可請醫生再詳細檢查 (D)此為異常現象，可用硼酸沖洗會陰
- (D) 27 生產準備課程所介紹的各種減輕生產不適的方法，何者錯誤？
(A)給予薦骨重壓或按摩 (B)可坐在生產球上
(C)給予冷、熱敷 (D)抑制情緒、避免喊叫
- (C) 28 下列何種方法可判別胎兒肺部的成熟度？
(A)杜卜勒血流速度波形 (B)絨毛取樣術 (C)羊膜穿刺術 (D)臍帶穿刺術
- (B) 29 懷孕時母體的生理變化會影響藥物的代謝，下列敘述何者正確？
(A)胃的排空和腸的蠕動增加，藥物吸收率會減緩
(B)腎臟血流和腎絲球過濾率增加，藥物易被排泄
(C)懷孕時肝臟藥物代謝酵素活性減少，因此藥物不易被代謝
(D)血漿蛋白濃度增加，與藥物結合比例增加，降低藥物療效
- 情況：丁女士，30 歲，3 年前結婚，避孕半年後即計畫懷孕，但都未如願。因月經已延遲3 星期未來潮，而至婦產科門診求診。依此回答下列第30 題至第32 題。
- (B) 30 丁女士經醫師診察及尿液驗孕後證實已懷孕，下列何項敘述符合丁女士之狀況？
(A)以雷奧波德氏操作法 (Leopold's maneuvers) 確認出子宮體不對稱的脹大情形
(B)以陰道超音波檢查妊娠囊確實存在子宮內
(C)以腹部超音波掃描出胎兒心臟及心跳
(D)以杜卜勒 (Doppler) 聽診器可測得臍血流雜音

- (D) 31 若丁女士的最後一次月經為12月20日，以內格萊氏法則 (Nägele's rule) 推算出其預產期應為明年何時？
(A) 7月17日 (B) 7月27日 (C) 9月17日 (D) 9月27日
- (B) 32 丁女士知道懷孕後，即表示她原已計劃要出國考察半年，現在懷孕的時機很不恰當，真不知道是留還是放棄。門診護理師面對丁女士的反應，最適當的處理為何？
(A) 基於鼓勵生育的政策，請她不要胡思亂想
(B) 這是正常的矛盾反應，應以接受的態度傾聽她的想法
(C) 請她考慮清楚，若有需要可協助安排人工流產術
(D) 這是不正常的產前憂鬱症前兆，應轉診精神科予以心理輔導
- (C) 33 江女士第一胎，目前子宮頸開10公分，胎頭高度為+1，有便意感，此時最合宜之護理措施為何？
(A) 運用呼吸方法以避免用力 (B) 給予氧氣
(C) 教導用力 (D) 按摩腹部皮膚以轉移其注意力
- (B) 34 下列有關催產素Oxytocin 使用之敘述，何者正確？
(A) 胎心率過慢時仍可繼續使用，但須密切觀察
(B) 胎心率變異性減速時，應立即停止使用
(C) 可連續滴注72小時，漸進性增加劑量
(D) 因具利尿作用，易發生尿崩之合併症
- (C) 35 下列何項不是剖腹產可能的合併症？
(A) 肢體血栓靜脈炎 (B) 腹腔粘連 (C) 肛門瘻管 (D) 傷口感染
- 情況：吳女士G₁P₀，因陣痛入院待產，經過6小時待產，目前子宮頸口開3公分，宮縮每2~3分鐘一次，每次30~40秒，宮縮壓力：30~40 mmHg，TPR：36.8、82、24，BP：133/86 mmHg。依此回答下列第36題至第38題。
- (A) 36 主訴陣痛厲害無法忍受，希望醫生能立即提供其無痛分娩的處置，護理措施為何？
(A) 向吳女士解釋，目前產程尚無法採用無痛分娩，提供其他減輕產痛的護理措施
(B) 協助醫師準備無痛分娩之相關配備與措施，並向吳女士解釋可能的反應
(C) 根據吳女士宮縮壓力較低的情況研判，有誇大產痛的可能，因此宜提供心理支持
(D) 向吳女士建議採用局部會陰浸潤法 (local perineal infiltration) 較適合其目前的狀況
- (B) 37 吳女士接受meperidine (Demerol) 麻醉性鎮痛劑處置。子宮頸口開5公分，宮縮每3~5分鐘一次，每次30秒，宮縮壓力：30 mmHg，胎心率：140次/分，生命徵象正常且不再主訴產痛不適，並常安靜休息，最適當的護理處置為何？
(A) 產婦處於產程潛伏期，宜讓產婦多休息，避免進入待產室干擾
(B) 注意胎兒心跳與產婦呼吸是否受抑制，並備好naloxone 解毒劑
(C) 有產生心跳過慢、深肌腱反射抑制之虞，宜每小時評估生命徵象及深部肌腱反射
(D) meperidine 易導致胎兒心跳過速，故應監控胎心率在140~160次/分之間

【版權所有，重製必究！】

- (D) 38 吳女士接受meperidine 注射2 小時後，子宮頸口開5 公分，TPR：36.6、90、16，BP：110/70 mmHg，胎心音監控30 分鐘結果均如下圖示，仍安靜休息中，下列護理處置何者最恰當？



- (A)胎兒有早期減速 (early deceleration) 現象，宜調低meperidine 劑量，並協助產婦左側臥
 (B)胎兒有晚期減速 (late deceleration) 現象，宜協助產婦左側臥
 (C)胎兒有變異性減速 (variable deceleration) 現象，宜協助產婦左側臥及給氧
 (D)胎兒心跳變化皆在正常範圍，無須提供額外處置措施
- (A) 39 下面有關產痛 (labor pain) 的描述，何者較為正確？
 (A)分娩及生產期間的疼痛，是一正常生理現象
 (B)疼痛是一主觀經驗，當產婦感受到疼痛時，不一定是疼痛
 (C)產痛的形成大多與產婦的認知有關，而非子宮頸的伸展與壓力所致
 (D)產婦的焦慮與害怕會轉移分娩過程中的疼痛
- (D) 40 下列有關胎位為枕後位 (OP) 之敘述，何者錯誤？
 (A)子宮頸擴張較慢 (B)先露部下降較慢 (C)第一產程時間較長 (D)子宮收縮力比較弱
- (C) 41 有關兒童發展之原則，下列敘述何者錯誤？
 (A)發展是有順序可循的 (B)發展是身心變化的歷程
 (C)從身體遠心到近心的動作發展 (D)從簡單到複雜的動作發展
- (B) 42 奇奇，11 個月大，不慎被食物噎到而導致窒息，有關緊急處理的敘述，下列何者正確？
 (A)使奇奇俯臥跨於施救者手臂上，頭高於軀幹
 (B)施救者的手掌在奇奇背後肩胛骨間叩擊5 下
 (C)讓奇奇仰臥，以手掌置於其上腹部向劍突方向施壓
 (D)雙手環繞奇奇的腰部，以拳頭在劍突下連續5 次向上推擠
- (D) 43 玉珍就讀高中一年級，有一天同學告訴學校護士，玉珍常會提到「我真希望我死了」，為預防玉珍自殺，下列措施何者不適當？
 (A)請導師找玉珍聊聊，聆聽她的想法 (B)請導師關心玉珍，給予支持
 (C)說服玉珍一起尋找專業協助 (D)告訴玉珍，好好唸書不要胡思亂想
- (B) 44 3 歲的美麗，在家中誤喝漂白水，下列措施何者不適當？
 (A)在2 小時內，讓美麗喝水或牛奶，但勿超過15 c.c./Kg
 (B)在2 小時內，給予吐根糖漿 (ipecac syrup) 促使美麗嘔吐
 (C)帶著容器，儘早送美麗至醫院求診
 (D)依醫囑協助內視鏡檢查，以確立食道燒灼情形

- (D) 45 有關自閉症兒童的照護原則，下列何者正確？
(A)安排病童處於多變的環境之中，增加調適能力
(B)協助並且要求病童配合醫療單位的日常生活常規
(C)病童有溝通障礙時，安排病童參與團體活動
(D)持續、緊密性的觀察病童，維持安全的環境
- (A) 46 根據Erikson 的發展理論，適合10 歲兒童發展階段的住院照護重點為何？
(A)跟學校老師討論，避免因住院而落後學校進度太多的方法
(B)詳細回答病童的問題，並解釋疾病成因及治療過程
(C)自主性為此階段的發展重點，故讓病童自己決定照護方式很重要
(D)利用第三人稱說故事模式，鼓勵病童說出心中的感受
- (D) 47 下列有關男童生殖器官的檢查評估之敘述，何者正確？
(A)3 歲以上男童睪丸尚未下降是正常的情形
(B)兩側睪丸若位置高低不同，則需進一步評估
(C)檢查隱睪的方法之一為視診兩側腹股溝有沒有鼓起
(D)可以運用光線照射，辨別陰囊水腫與疝氣的情況
- (B) 48 丁小弟，3 歲，氣質評估為活動量大、偏向趨性、注意力易分散，有關教養上的建議，下列何者最適當？
(A)多提供靜態才藝課程，如畫圖，以降低其活動量
(B)常帶領其對新環境及活動作安全性的判斷
(C)教導下圍棋，協助其減少注意力分散的頻率
(D)每日安排運動的時間，以消耗其過剩的精力
- (D) 49 根據九法則 (rule of nine)，有關嬰兒與兒童燒傷面積評估的計算，下列那個部位的百分比不同？
(A)雙上肢 (B)前軀幹 (C)後軀幹 (D)雙下肢
- (C) 50 4 歲的玲玲有先天性心臟病，為準備其接受心導管檢查，下列何種護理措施較適當？
(A)因4 歲兒童在運思前期，故不需要特別向玲玲解說
(B)提供檢查過程影片，讓玲玲與母親一起觀看
(C)安排玲玲與母親參與指導性遊戲
(D)將心導管檢查衛教單張拿給母親看，再請母親向玲玲解釋
- (A) 51 10 個月大的嬰兒，目前依醫囑：piperacillin 5mg in 0.33% G/S 10mL drip for 30 minutes，精密輸液套管 (micro-drip set) 使用中，以下滴數何者正確？
(A) 20 gtt./min (B) 30 gtt./min (C) 40 gtt./min (D) 50 gtt./min
- (A) 52 小如，9 歲，因腦瘤才剛開始接受化學治療，出現嚴重嘔吐，所以小如的媽媽問護理人員：「看小如這麼痛苦，作化學治療真的對她好嗎？」下列護理人員的回答，何者較為適當？
(A)「我介紹另一位病童母親跟你認識，我們一起聊一聊。」
(B)「不要想太多，我知道你做的決定都是為小如好。」
(C)「小如很勇敢，我相信她一定可以撐過來的！」
(D)「別擔心！小如的化學治療反應都在醫師的掌握中。」
- (A) 53 關於末期病童臨終的生理變化，下列何者為最接近死亡的表徵？
(A)呼吸逐漸由深變淺
(B)尿量增加、顏色淡
(C)覺得冷，但身體摸起來是熱的
(D)睡眠時間變短

- (D) 54 蘇小弟，體重3.3 公斤，出生36 小時，血清膽紅素值為20 mg/dL，必須換血，下列護理措施何者不適當？
(A)準備新鮮血500 c.c.，輸入之血須加溫至35~37°C
(B)換血進行時間應維持在1~2 小時
(C)每換血100 c.c.須注射1 c.c.的10%葡萄糖鈣，預防低血鈣
(D)換血後1 小時內給予點滴注射白蛋白，可以提高換血的成效
- (A) 55 有關慢性病正常化 (normalization) 的敘述，下列何者錯誤？
(A)促使病童突破疾病的限制，達到如健康兒童一樣的體能標準
(B)以常態的眼光對待病童，以維持其有價值的社會角色
(C)父母親以同樣的家規及教養態度對待病童與其手足
(D)與病童一起計畫因應其健康狀況，調整日常生活
- (C) 56 有關猩紅熱的敘述，下列何者正確？
(A)為B 群 α 型溶血性鏈球菌感染
(B)一般好發於1~3 歲的兒童，會有輕微發燒
(C)出現針點狀紅疹，受壓時變白，質地粗糙如沙紙般
(D)早期舌面呈現紅色乳突似紅草莓舌，幾天後，紅膜脫落轉變為白色
- (D) 57 陳小弟，4 歲，診斷為哮吼症 (croup)，下列何種護理措施最合宜？
(A)限制水分的攝取
(B)使用人工呼吸器協助呼吸
(C)提供鼻胃灌食及靜脈輸液
(D)提供噴霧治療
- (C) 58 下列何者是水痘皮疹的特徵？
(A)首先在軀幹出現散佈性玫瑰紅斑點
(B)發疹到全部消失約3 天，故又稱三日疹
(C)在同一時間可在不同部位看到不同階段的發疹變化
(D)脫落的痂皮具有傳染性
- (D) 59 小強，5 歲，因急性氣喘發作而入院，醫囑Aminophylline 靜脈注射，護理師在監測此藥物的中毒症狀時，不包括下列何者？
(A)腸胃不適、噁心嘔吐 (B)心搏過速、心律不整
(C)頭痛、不安與失眠 (D)皮膚發熱、起丘疹
- (A) 60 40 週大的小明，出生體重2770 公克，媽媽為B 型肝炎帶原者，且e 抗原陽性，請問小明於出生多久需注射B 型肝炎免疫球蛋白？
(A) 24 小時內 (B) 24~48 小時 (C)一週後 (D)滿一個月
- (B) 61 有關黴漿菌性肺炎 (mycoplasma pneumonia) 之敘述，下列何者正確？
(A)病程進展非常快速，聽診時患部出現濁音
(B)具有高度的傳染性，主要侵犯肺下葉及支氣管周圍
(C)易罹患的年齡層為嬰幼兒，會有明顯高燒症狀
(D)以青黴素治療為主，預後差，易引起肋膜積水
- (B) 62 有關協助病童接受支氣管鏡檢查 (bronchoscopy) 的敘述，下列何者錯誤？
(A)可以檢查病灶所在，取得該部位組織，並同時進行治療
(B)檢查前需禁食，並給予epinephrine (Bosmin) 以減少咽喉分泌物及嘔吐反射
(C)檢查後需持續觀察生命徵象及是否有喉頭痙攣、呼吸困難
(D)待咳嗽及嘔吐反射恢復後，才可開始漸進式恢復正常飲食

- (D) 63 罹患心室中隔缺損 (ventricular septal defect) 的4 歲兒童，進行心導管檢查後之護理措施，下列何者不適當？
(A) 穿刺後第一小時，需每15 分鐘評估生命徵象
(B) 評估肢體末端溫度及顏色，以及足背動脈之搏動
(C) 鼓勵兒童臥床6 小時，維持穿刺側肢體平直
(D) 需禁食直到排氣後，方可進食
- (C) 64 小文，3 歲，因發燒持續5 日，使用解熱劑，效果不明顯，醫師診斷為川崎氏病 (Kawasaki disease)，下列臨床表徵何者非診斷指標？
(A) 軀幹皮膚可能出現皮疹
(B) 手掌、腳底可能泛紅、腫脹
(C) 關節痛及多發性關節炎
(D) 口腔嘴唇乾燥、泛紅、呈草莓舌
- (C) 65 林小弟，6 個月，因罹患法洛氏畸形心臟病 (Tetralogy of Fallot)，長期使用毛地黃 (Digoxin)，需教導媽媽當林小弟出現下列那些症狀時，應暫停給藥，立即就醫？
(A) 心跳大於100 次 / min (B) 皮膚紅疹、搔癢
(C) 厭食、噁心、嘔吐 (D) 哭鬧、無法入睡
- (D) 66 有關罹患後天免疫缺乏症候群 (acquired immune deficiency syndrome) 的兒童在家中及社區的照護敘述，下列何者正確？
(A) 兒童應該要待在家中不應去上學，避免散佈細菌
(B) 應採用嚴格防護措施，兒童接觸過的東西都要消毒
(C) 禁止兒童到游泳池游泳，避免傳染他人
(D) 處理兒童的切割傷或抓傷的傷口時，應戴手套
- (D) 67 陳小弟，10 歲，罹患缺鐵性貧血，醫囑予注射鐵劑Imferon，有關注射方式的敘述，下列何者錯誤？
(A) 抽藥後需更換新針頭
(B) 注射時需採用Z 字型肌肉注射
(C) 鐵劑注射後需略停5~10 秒鐘，再拔出針頭
(D) 注射後需揉搓注射部位，以促進藥物吸收
- (C) 68 有關癌症兒童在化學治療期間營養照顧之敘述，下列何者錯誤？
(A) 在一天中食慾最佳的時刻，給予高熱量及高蛋白的食物
(B) 在食慾不佳時，可採少量多餐，不強迫進食
(C) 為預防便秘，每日需大量補充高纖維的蔬菜、水果
(D) 口腔破皮時，給予溫度適中，不刺激的軟質食物，如布丁
- (A) 69 小如，5 歲，罹患威耳姆氏腫瘤 (Wilms tumor)，目前已接受手術切除腫瘤，請問小如手術後的護理措施，下列何者較不適當？
(A) 此腫瘤常轉移至腦部，不需監測神經功能
(B) 經常監測腎功能、體重、輸出入量及血壓
(C) 可利用繪畫或治療性遊戲讓小如表達感受
(D) 協助小如及家屬接受後續的治療
- (D) 70 有關先天性甲狀腺功能低下 (congenital hypothyroidism) 之敘述，下列何者正確？
(A) 出生時的身高、體重比正常足月兒低
(B) 可於出生24 小時內做新生兒代謝篩檢，以確定診斷
(C) 通常以L-thyroxine 治療，直到病情改善後一週為止
(D) 須觀察甲狀腺素之副作用，如躁動不安、心搏過速等

- (A) 71 小玲罹患苯酮尿症 (phenylketonuria; PKU)，護理師指導媽媽，小玲應避免何種飲食？
(A)含蛋白質高的食物，如：魚、肉、牛奶、蛋、豆類及麵粉製品等
(B)含乳糖的奶類製品，如：母乳、牛奶及一般配方奶粉
(C)含高鐵的食物，如：葡萄乾、麥片粥、肝、腎、深綠色蔬菜
(D)高熱量的飲食，如：高糖的糕點、蜜餞、水果
- (C) 72 李太太為6個月大的小剛換尿布時，發現尿布有輕微血尿且有魚腥味，入院檢查是否有膀胱輸尿管逆流 (vesicoureteral reflux; VUR) 情形，有關膀胱輸尿管的敘述，下列敘述何者正確？
(A)造成膀胱輸尿管逆流的病因為先天性遺傳
(B)膀胱輸尿管逆流的情形隨著年齡增加而趨嚴重
(C)排尿性膀胱尿道攝影 (VCUG) 可偵測膀胱輸尿管逆流的等級
(D)輕度的膀胱輸尿管逆流最常見的臨床表現為腎盂腎炎
- (D) 73 照顧急性腎絲球性腎炎 (acute glomerulonephritis) 的兒童，下列護理措施何者不適當？
(A)急性期需儘量臥床休息，以減少能量消耗
(B)每日測量體重及記錄輸出輸入量
(C)每4~6小時測量血壓一次
(D)食慾不佳應給予鹹蘇打餅乾以補充能量
- (C) 74 阿寶出生時並無異狀，慢慢出現生理性黃疸且持續2週，有關膽道閉鎖之病因及臨床表徵的敘述，下列何者錯誤？
(A)因膽汁無法排出至腸道，大便逐漸變成灰白色
(B)因缺乏膽鹽，無法吸收脂肪及脂溶性維生素
(C)間接膽紅素增加，造成皮膚呈現黃綠色
(D)尿液中含膽紅素，造成尿液呈現暗茶色
- (B) 75 黃小弟罹患唇腭裂 (cleft lip and palate)，有關餵食的注意事項，下列敘述何者錯誤？
(A)可將母乳擠在特殊奶瓶中餵食
(B)為避免噎到，瓶餵時宜選擇較硬且孔小的奶嘴
(C)餵食時，應將黃小弟抱成直立姿勢，且要常常拍背排氣
(D)若無法吸吮，可用塑膠滴管或湯匙緩慢餵食
- (A) 76 以膠帶黏拭肛門處收集蟲卵的方法，主要是檢查下列何種寄生蟲的感染？
(A)蟯蟲 (B)鈎蟲 (C)蛔蟲 (D)梨形鞭毛蟲
- (D) 77 有關細菌性腦膜炎 (bacterial meningitis) 病童的腦脊髓液檢查結果之敘述，下列何者錯誤？
(A)外觀較正常者混濁 (B)嗜中性白血球增加
(C)葡萄糖較正常者減少 (D)蛋白質較正常者減少
- (A) 78 有關癲癇兒童的生酮飲食治療方式，下列何種成分在飲食中的比例需高達70%~80%？
(A)脂肪 (B)蛋白質 (C)醣類 (D)纖維質
- (C) 79 有關重症肌無力 (myasthenia gravis) 病童的臨床表徵，下列敘述何者錯誤？
(A)新生兒期可能出現吸吮及吞嚥困難
(B)嬰兒期出現頭頸部控制不佳的症狀，重製必究！
(C)最早出現的症狀為步態改變的行動障礙
(D)肌肉無力症狀在活動後才逐漸顯現
- (A) 80 有關腦性麻痺兒童可能發生的健康問題，下列敘述何者錯誤？
(A)進行性神經病變 (B)肢體麻痺
(C)手眼協調困難 (D)發音或構音困難