

《基本護理學》

- (C) 1 在建立專業的人際關係要素中，有關「接納 (acceptance)」的作法，下列何者錯誤？
(A)嘗試了解病患所有的語言表達 (B)嘗試了解病患所有的非語言表達
(C)贊成病患所有的行為 (D)不批判病患行為的對與錯
- (A) 2 護理人員為取得剛入院個案的信任，可採用下列何種方法？
(A)表現出尊重個案的態度，並鼓勵其表達感受
(B)使用專業術語，讓個案對我們的能力有信心
(C)鼓勵個案參與護理計畫，並完全配合他的期望
(D)從閱讀相關疾病常見的護理問題中，確認個案的需求
- (C) 3 王小明就讀國中，因化療有脫髮現象，很在意同學看他的眼神。以馬斯洛 (Maslow) 需求理論來看，王小明有下列那一層次的需求？
(A)生理 (B)愛及歸屬感 (C)自尊 (D)自我實現
- (A) 4 賀小妹1歲，入院後不斷哭吵著要媽媽，賀小妹最可能是出現下列何種的心理狀況？
(A)分離焦慮 (B)失去控制感 (C)隱私受威脅 (D)未知恐懼
- (C) 5 有關臨終病患及其家屬的護理措施，下列敘述何者錯誤？
(A)病患張口呼吸時，須給予口腔護理，以保持口腔清潔與濕潤
(B)止痛藥的使用，以提供病患舒適為主，較不考慮副作用及成癮性
(C)提醒家屬勿告知病患疾病預後及診斷
(D)病患血液循環變慢，應給予適當的保暖
- (A) 6 解尿後尚留存於膀胱內的餘尿量，正常應少於多少c.c.？
(A) 50c.c. (B) 100c.c. (C) 150c.c. (D) 200c.c.
- (A) 7 林先生因呼吸衰竭而接受插管及呼吸器治療，但其意識清楚。有關其可使用之溝通方式，下列何者錯誤？
(A)可使用語言溝通 (B)可用書寫方式傳達訊息
(C)可使用面部表情傳達感受 (D)可用動作手勢進行溝通
- (A) 8 有關迎接新入院病患之護理常規，下列敘述何者錯誤？
(A)在檢視病患情況後，再準備病患單位
(B)測量病患生命徵象、身高及體重，並記錄之
(C)協助醫師檢查病患，並擬定初步的護理計畫
(D)交由病患使用之醫院財產，須列清單請病患簽收
- (A) 9 在個案資料的收集過程，下列何種資料是護理人員以間接觀察法取得？
(A)個案的會診檢查結果 (B)看到個案雙眼無神，一副疲憊的樣子
(C)測量個案的T.P.R. (D)檢視個案傷口引流液呈現紅色
- (B) 10 行為過程紀錄具有下列何種功能？
(A)主觀分析與個案互動過程的實質意義 (B)訓練護理人員的自我省察能力
(C)配合S.O.A.P.的方式，進行書寫練習 (D)訓練護理人員對個案做衛生教育
- (B) 11 有關徵象 (signs) 與症狀 (symptoms) 的敘述，下列何者正確？
(A)徵象是不須使用特殊儀器，所測出的異常情形
(B)症狀是指病患的憂慮、無力、疼痛等情形
(C)血壓、脈搏次數是客觀症狀
(D)病患皺眉、愁苦的表情是客觀徵象

- (A) 12 下列何種病患的狀況可進行灌腸？
 (A)肝昏迷 (B)產科安胎 (C)不明原因腹痛 (D)直腸潰瘍或狹窄
- (A) 13 下列那些因素可能導致病患解鮮紅色的糞便？①直腸癌 ②食道靜脈曲張 ③痔瘡 ④食用過多紅西瓜 ⑤吃過多麻辣火鍋
 (A)①③④ (B)①②③ (C)②③⑤ (D)②④⑤
- (A) 14 有關物理滅菌法的原理，下列敘述何者正確？
 (A)使細胞內蛋白質凝固 (B)破壞細胞壁 (C)改變細胞滲透性 (D)抑制酶的作用
- (A) 15 病患的右手因腕隧道症候群而入院開刀，左手接受靜脈注射治療，測量其血壓的部位應為下列何者？
 (A)下肢膝關節動脈 (B)右手橈動脈 (C)左手肱動脈 (D)左手橈動脈
- 情況：張先生42歲，124公斤，因急性心肌梗塞到急診求治。醫師建議其住院接受冠狀動脈繞道手術治療。請回答第16~17題。
- (A) 16 測量張先生之脈搏的理想部位為下列何者？
 (A)心尖脈 (B)橈動脈 (C)股動脈 (D)足背動脈
- (D) 17 張先生接受冠狀動脈繞道手術後，擬了解其下肢末梢的循環狀況時，應執行下列何種評估？
 (A)心尖脈聽診 (B)橈動脈觸診 (C)股動脈觸診 (D)足背動脈觸診
- (D) 18 下列那一種檢查可作為選擇抗生素的依據？
 (A)大便常規檢查 (B)尿液常規檢查 (C)血液常規檢查 (D)尿液培養
- (A) 19 造成糞便檢體呈柏油色的可能原因為下列何者？
 (A)上腸胃道出血 (B)下腸胃道出血 (C)肝、膽、胰臟疾病 (D)食入大量蔬菜
- (D) 20 醫院中最常見的機械性傷害為下列何者？
 (A)割傷 (B)壓傷 (C)燙傷 (D)跌倒
- (B) 21 下列何者不是醫院常見的院內感染？
 (A)泌尿道感染 (B)消化道感染 (C)手術傷口感染 (D)上呼吸道感染
- (D) 22 傾倒無菌溶液時之注意事項，下列何者錯誤？
 (A)確認溶液的名稱、濃度、有效期限
 (B)手握標籤面
 (C)打開瓶蓋後，將瓶蓋口朝上，置於桌面
 (D)在距離無菌區域20~30公分高度，傾倒出無菌溶液
- (C) 23 有關高壓蒸氣滅菌法之敘述，下列何者錯誤？
 (A)為目前最常用，且最普遍的滅菌法 (B)滅菌包間，須有1吋的間隔
 (C)非吸水性物品應置於吸水性物品上面 (D)有效保存期限為含滅菌日7日內
- (B) 24 有關內科洗手法的敘述，下列何者錯誤？
 (A)手上的手錶與飾品須除去 (B)衣袖須捲到腕關節上2吋處
 (C)用力搓揉雙手每一部位至少10次 (D)洗手過程中，雙手保持指尖與前臂朝下
- (C) 25 有關嚴重急性呼吸道症候群(SARS)的敘述，下列何者正確？
 (A)感染源是DNA輪狀病毒 (B)主要的傳染途徑是媒介物及病媒傳播
 (C)有效阻斷SARS傳染須確實執行內科無菌技術 (D)SARS病人應住正壓隔離病房
- (C) 26 有關血栓性靜脈炎的敘述，下列何者正確？
 (A)選擇較大靜脈注射，如股靜脈，可預防血栓性靜脈炎發生
 (B)發炎部位應給予輕觸按摩，以促進局部循環及回流
 (C)發炎部位可採用黃藥水(Rivanol)濕敷，以改善炎症反應
 (D)血栓性靜脈炎症狀為局部腫脹、蒼白、清涼感

- (B) 27 同一種藥物在不同給藥途徑中，使用劑量依序為何？
(A)皮下注射<口服給藥<靜脈注射<肌肉注射
(B)靜脈注射<肌肉注射<皮下注射<口服給藥
(C)肌肉注射<靜脈注射<口服給藥<皮下注射
(D)口服給藥<皮下注射<肌肉注射<靜脈注射
- (A) 28 王小姐因罹患乳癌而入院治療，因有噁心、嘔吐、食慾不佳症狀，所以主治醫師開立口服 primperan 1 #AC，此藥物應於何時服用？
(A)飯前 (B)飯後 (C)睡前 (D)立刻
- (B) 29 有關給藥的敘述，下列何者正確？①危急時刻護生能接受口頭醫囑 ②服用油類藥物可配合果汁，以去除味道 ③服用鐵劑時，應用吸管以防牙齒著色 ④為加速藥效作用，鎮靜劑可與溫牛奶一起服用
(A)①②③ (B)②③④ (C)①②④ (D)①③④
- (A) 30 林小妹1 歲3 個月，給予肌肉注射時，最理想的注射部位為下列何處？
(A)股外側肌 (B)上臂三角肌 (C)背臀肌 (D)腹臀肌
- (D) 31 有關靜脈輸注溶液之敘述，下列何者正確？
(A)高血壓及心臟病患須監測滴速，主要為預防空氣栓塞
(B)肝功能異常病患最適合輸注乳酸鹽溶液
(C)顱內壓升高病患適合輸注5% 葡萄糖溶液
(D)林格氏液不能與輸血併用，以防血液凝固
- (B) 32 李先生24 小時內須靜脈輸注N/S 1,000c.c.及D5 W 500c.c.。當使用微滴輸液套管 (microdrip set) 輸注時，滴注速度應為下列何者？
(A)45 滴/分 (B)63 滴/分 (C)78 滴/分 (D)93 滴/分
- (B) 33 病患接受靜脈輸液時，出現呼吸困難、焦躁不安情形。下列護理措施，何者宜優先採用？
(A)檢查急救車用物
(B)停止輸液，並通知醫師
(C)繼續觀察病患反應，給予心理安撫
(D)調快點滴速度，並安撫病患
- (C) 34 術後病患意識尚未清醒，腋溫35°C 且有寒顫現象，其最佳的保暖方式為下列何者？
(A)關閉冷氣 (B)給予水溫40.5~46°C 之溫水浸泡
(C)距離病患身體18~24 吋，給予40W 烤燈 (D)使用約46.1~51.7°C 之熱水袋
- (A) 35 護理人員協助個案溫水坐浴時，常用下列何種溶液？①一般溫開水 ②1：4000 的萊蘇 (lysol) 溶液 ③1：100 水溶性優碘 (Beta-iodine) ④1：400 沙威隆 ⑤10~50% 硫酸鎂 (MgSO₄) 溶液 ⑥1：1000 高錳酸鉀溶液 (P.P. solution)
(A)①③⑤ (B)①④⑥ (C)②③④ (D)②⑤⑥
- (C) 36 臨床上以溫水拭浴取代酒精拭浴之理由，主要為下列何者？
(A)酒精太貴，成本太高
(B)酒精拭浴須由醫師開立醫囑後才能執行，增加行政處理上的困擾
(C)酒精降溫速度很快，且具刺激性，易造成皮膚乾燥及噁心感
(D)酒精具揮發性，病患易有頭痛、暈眩與流鼻血的主訴
- (C) 37 有關等張性輸液特性的敘述，下列何者正確？
(A)溶液滲透壓約295~375 mOsm/L
(B)輸注液體過量會引起利尿作用
(C)適用於血量不足時給予
(D)禁用於腦血管損傷患者

- (D) 38 護理人員為病患灌入200c.c. 生理食鹽水執行清潔灌腸時，病患說：「我的肚子脹脹的，會痛。」此時護理人員應優先採取下列何種措施？
(A)讓病患到廁所去解便，解完後再灌注一次
(B)告知病患快好了，請其忍耐不要解出來，同時繼續緩慢灌注
(C)告訴病患這是正常感覺，請其深呼吸以轉移注意力，再繼續灌注
(D)暫時停止灌注，評估腹痛情形，等症狀消失後再灌注
- (A) 39 有關側臥姿勢 (lateral position) 之敘述，下列何者正確？
(A)身體的重量壓在下側的肩胛骨和髖骨
(B)彎曲兩腿的髖關節及膝關節，兩腿間不要置放支托物，以避免加重腿部及膝部壓力
(C)為鬆弛病人肢體，頭頸部與脊椎不要維持一直線
(D)須脫去足跟保護器，以避免過度壓迫踝關節外側
- (C) 40 有關床上沐浴原則，下列敘述何者錯誤？
(A)當病患的睫毛沾有眼部分泌物時，應先以濕毛巾敷眼瞼約2~3 分鐘後，再除去
(B)清洗臉部及頸部時，應先擦乾淨處，再擦較髒處
(C)清洗四肢時，應由近心端向遠心端擦拭
(D)皮膚乾燥者可以乳液取代酒精按摩背部
- (A) 41 王太太正接受膀胱訓練，有導尿管留置，下列護理措施何者正確？
(A)協助王太太每天至少攝取1,500c.c.液體
(B)每6 小時幫王太太鬆開導尿管約10~15 分鐘，使其膀胱定時排空
(C)訓練後期，晚上不需開放導尿管，以免影響訓練成效
(D)若測得的餘尿量小於150c.c.，則可為王太太拔除導尿管
- (A) 42 在急診處，護理人員測得外傷來院病患的血壓為 88/50 mmHg，此時正確的處置原則為下列何者？
(A)重新測量血壓，以確認病患有血壓過低現象
(B)病患可能失血過多，立即通知血庫，準備輸血
(C)多注射一瓶點滴，以增加體液容積量
(D)血壓尚可，持續觀察，按常規時間測量血壓
- (B) 43 有關影響冷、熱效用因素的敘述，下列何者正確？
(A)乾熱作用比濕熱作用迅速且顯著，對組織傷害性較大
(B)濕冷熱比乾冷熱效果佳，因水分子對皮膚的滲透能力比空氣佳
(C)為達同樣效果，濕冷溫度應低於乾冷，濕熱溫度應高於乾熱
(D)長期使用時，人體耐受力會增加，為維持效果，應減少或增加冷熱溫度
- (B) 44 有關身體產熱作用的敘述，下列何者錯誤？
(A)食物代謝是身體產熱最大的來源
(B)寒顫 (shivering) 是肌肉自主性收縮，可產生大量熱
(C)骨骼肌收縮會增加熱的產生
(D)身體產熱的主要部位為肌肉與肝臟
- (D) 45 病患因發燒、嘔吐而住院，下列何者為其合適的飲食種類？
(A)高鐵飲食 (B)低鈉飲食 (C)低蛋白飲食 (D)高鉀飲食
- (B) 46 長期臥床病患隨著制動 (immobility) 時間的增長，對心臟血管系統造成負面影響。下列敘述何者錯誤？
(A)負責調控血壓之神經血管反射會失調，易造成姿位性低血壓
(B)因下肢靜脈回流至心臟的血量增加，心臟負荷增加50%，脈搏次數較正常時減低
(C)骨骼肌幫浦活動減少，使下肢回流受阻，血液黏稠度增加易形成血栓

- (D)床上使用便盆與移動身體時，使用伐耳沙伐氏操作法（Valsalva's maneuver）機率增加，造成心跳速率改變及不適反應
- (C) 47 下列何者表示病患的營養狀況異常，須立即進行營養介入？
- (A)血清中白蛋白（albumin）數值 $> 3.5 \text{ gm/dL}$
 - (B)由口進食的食物量，平均每餐為餐盤的 $1/2 \sim 3/4$
 - (C)住院一週內，體重減輕 10% 以上
 - (D)住院期間，排尿功能正常，但有便秘現象
- (B) 48 有關執行鼻胃管插入的護理措施，下列何者正確？
- (A)必須戴上無菌手套，以保持鼻胃管的無菌狀態
 - (B)協助病患頭部向胸前微屈，以使會厭軟骨將氣管通道關閉
 - (C)鼻胃管中應留置水分，以利測試是否插入胃中
 - (D)插入前，先以凡士林潤滑鼻胃管前端，以減少摩擦阻力
- (A) 49 有關鼻胃管灌食前，反抽胃內容物的敘述，下列何者正確？
- (A)若反抽出的是胃液，應將抽出之胃液推回胃中，再開始灌食
 - (B)反抽發現有未消化的食物時，應暫停灌食一次
 - (C)反抽出胃中未消化的食物時，應將之移除，並灌食新的食物
 - (D)無論反抽之未消化食物殘量為何，都可以灌食新的食物
- (A) 50 有關糖尿病病患的足部護理措施，下列敘述何者錯誤？
- (A)應以乳液擦拭足底與趾間，以預防皮膚乾裂損傷
 - (B)不可用刺激性肥皂及熱水洗腳
 - (C)應穿乾淨及吸汗的襪子，鞋子須合腳
 - (D)足部出現紅、腫、熱、痛之不適時，須立即就醫
- (B) 51 有關壓瘡形成原因之敘述，下列何者錯誤？
- (A)壓力越大，則組織缺氧及廢物堆積的情況越厲害，對皮膚的威脅越明顯
 - (B)相同的壓力源，受壓面積越大則局部壓力越大，受壓面積越小則局部壓力越小
 - (C)長時間承受小的壓力，比短時間承受大的壓力傷害還大
 - (D)剪力是造成深層組織壓瘡的重要因素
- (B) 52 有關包紮時的注意事項，下列何者正確？
- (A)包紮時，應放低肢體，以防止血液循環不良
 - (B)由遠心端向近心端包紮，以促進靜脈回流
 - (C)將整個肢體完全包覆，不須露出肢體末端，以保暖
 - (D)包紮時，病患感覺發麻是正常現象，一般活動後，即會緩解
- (C) 53 協助病患約束時，應注意的事項，下列何者正確？
- (A)約束帶使用時應綁緊，以預防病患自行鬆脫
 - (B)每2 小時檢查被約束肢體的末梢循環
 - (C)約束時，肢體宜稍彎曲，以避免肌肉攣縮
 - (D)以雙套結方式固定於床欄上，以方便事後鬆開
- (C) 54 劉女士因車禍導致骨盆骨折，目前雙下肢感覺正常，左側可以感覺輕微肌肉收縮，但無法移動腿部，右側肢體可以在床上移動，但無法舉高。此時應給予下列何種肢體復健運動？
- (A)左側主動運動，右側加阻力運動
 - (B)左側加阻力運動，右側被動運動
 - (C)左側被動運動，右側協助作主動運動
 - (D)左側協助作主動運動，右側加阻力運動
- (D) 55 有關睡眠各週期的特質之敘述，下列何者正確？
- (A)非快速動眼期（NREM）第I 期至III 期出現 α 波，肌肉耗氧率減少，可能發生尿床、打鼾或夢遊

- (B)非快速動眼期 (NREM) 第IV 期出現 θ 波，新陳代謝加速，體溫上升
(C)非快速動眼期 (NREM) 第IV 期的胃酸分泌比正常多3~20 倍，造成胃潰瘍病患易胃痛
(D)快速動眼期 (REM) 出現 β 波，出現生動的夢境且記憶清晰，生長激素與腎上腺素分泌增加
- (C) 56 財團法人新設立 500 床之社區乙類教學醫院，其訂定之願景 (vision) 以下列何者最切合實際？
(A)培育優秀人才，成爲一流之教學醫院
(B)整合醫療資源，成爲全國一流之研究醫院
(C)創造一所文化融合，不斷追求卓越之親善醫院
(D)發展前瞻性管理，成爲世界一流服務品質之醫院
- (C) 57 由最高主管先核定預算的最高金額，再交由單位管理者擬訂預算，是屬於下列何種預算？
(A)開放式預算 (open-ended budget) (B)彈性預算 (flexible budget)
(C)固定限額預算 (fixed ceiling budget) (D)零基預算 (zero-base budget)
- (D) 58 有關護理工作模式的敘述，下列何者錯誤？
(A)實習生實習時，適合採用個案護理
(B)當人力嚴重短缺時，較適用功能性護理
(C)綜合性護理可融合成組護理的分組方式，及全責護理的自主精神
(D)功能性護理可使新進人員更有整體性的學習
- (A) 59 有關「健康與疾病」關係的敘述，下列何者正確？①老化會影響個體在健康與疾病連續線上的位置 ②健康與疾病連續線上的一端是健康極佳，另一端爲死亡 ③健康與疾病，二者之間是一種經常改變的狀態，彼此是絕對的關係 ④健康與疾病，二者之間有非常清楚的分界
(A)①② (B)③④ (C)②③ (D)①④
- (C) 60 護理長已先公告12 月之病房月會將討論過年排班，但李護士因故未出席月會，事後對被安排的班別不滿意，而要求重新排班。護理長應如何處理爲宜？
(A)不必理會 (B)重新排班
(C)說明月會討論的經過及決議事項 (D)聯合其他同事一起抵制李護士
- (D) 61 有關編列預算之目的，下列何者錯誤？
(A)提供管理的功能 (B)能有效地運用資源 (C)提供溝通的功能 (D)提供擴編的功能
- (A) 62 提高生產力的要訣爲下列何者？
(A)輸入量不變，輸出量增加 (B)輸入量增加，輸出量不變
(C)輸入與輸出量皆增加 (D)輸入與輸出量皆減少
- (D) 63 爲提升護理人員洗手之正確性，病房經討論後，決定以護理專案方式來改善，此爲下列何種理論之應用？
(A)L 理論 (B)X 理論 (C)Y 理論 (D)Z 理論
- (B) 64 護理長對林護士表示：「對於給藥錯誤要求你寫異常事件報告，你有什麼想法？」是屬於下列何種溝通行爲？
(A)諒解型 (B)詢問型 (C)直言型 (D)警戒型
- (A) 65 某小型醫院的損益平衡點是800 萬元，而每月實際收入爲1500 萬元，則其損益平衡點的比率爲53%，請問該醫院的營運指標爲何？
(A)安泰 (B)健全 (C)虧損 (D)危險
- (B) 66 下列何者不是我國推行臨床專業能力進階制度的主要原因？
(A)提昇病患照護品質 (B)增加護理單位的收益
(C)提昇工作滿意度 (D)留任優秀護理人才

- (C) 67 護理專業能力進階N3 層級須接受下列何種訓練課程？
 (A)基本護理 (B)重症護理 (C)臨床護理教學 (D)護理行政
- (C) 68 篤信佛教之李小姐，擬應徵甲類社區基督教醫院時，最易引起價值觀衝突的是下列何者？
 (A)同儕間之人際關係 (B)個人之薪資
 (C)協助醫院達到宣教之任務 (D)協助病患靈性之需求
- (AB) 69 由護理長依據單位工作需要與靈活運用人力來排班，是屬於下列何種排班方式？
 (A)集權式排班 (B)分權式排班 (C)自我排班 (D)民主排班
- (C) 70 某一個病房有16 位病人，第一類病人嚴重度為0.5，第二類病人嚴重度為1，第三類病人嚴重度為2，第四類病人嚴重度為4，每類病人各4 位，則其工作量指數為下列何者？
 (A) 15 (B) 20 (C) 30 (D) 35
- (B) 71 院方接獲醫策會通知，醫院評鑑日期為6 個月後。於是組成2~3 人之專案經理人，負責評鑑之規劃、統籌、準備及調度事宜，並由護理部主任直接管轄。此種組織結構屬下列何者？
 (A)扁平式 (B)矩陣式 (C)中央集權 (D)功能式
- (C) 72 一般病房人力安排在不同工作時段的特性，下列何者為宜？
 (A)白班20%、小夜30%、大夜50%，假日與平常日人力需求相同
 (B)白班30%、小夜30%、大夜40%，假日比平常日人力需求為低
 (C)白班50%、小夜30%、大夜20%，假日比平常日人力需求為低
 (D)白班40%、小夜40%、大夜20%，假日與平常日人力需求相同
- (A) 73 跌倒造成之傷害比率，正確的公式為下列何者？
 (A) $\frac{\text{住院病患因跌倒造成傷害事件數}}{\text{住院病患有紀錄的跌倒件數}} \times 100\%$
 (B) $\frac{\text{住院病患因跌倒造成傷害事件}}{\text{住院病患之總人數}} \times 100\%$
 (C) $\frac{\text{住院病患之跌倒事件數}}{\text{住院病患之總人日數}} \times 100\%$
 (D) $\frac{\text{住院病患因跌倒造成傷害事件數}}{\text{住院病患之總人日數}} \times 100\%$
- (D) 74 護理長將閱讀臨床路徑 (Clinical Pathway) 相關書籍安排在每天早晨6~7 點，因這是他頭腦最清楚的時段。此為運用下列何種時間管理原理？
 (A)巴瑞多 (Pareto) 80/20 原理 (B)帕金森 (Parkinson) 時間底限原理
 (C)ABC 系統原理 (D)黃金時段原理
- (C) 75 有關績效考核的敘述，下列何者錯誤？
 (A)對懶怠怠惰員工的「正式警惕」 (B)對優秀勤勉員工的「績效肯定」
 (C)是懲罰員工最合理的手段 (D)是管理程序中「控制」的功能
- (D) 76 護理長因未完成護理部之年度目標，因此主任認為其服務態度、學識能力均差，此種考核有下列何種偏差？
 (A)向日葵作用 (B)中央趨勢 (C)情緒化作用 (D)觸角效應
- (A) 77 下列何種團體決策的優點為時間有彈性，且減少專家同時聚在一起的會議支出？
 (A)德菲 (Delphi) 技巧 (B)記名團體技巧 (C)腦力激盪 (D)統計性綜合法
- (B) 78 護理長認為：「單位主管應該要讓單位內的護理同仁感到備受重視，護理同仁才會因而更加努力工作。」護理長的主張最接近下列那一項理論的觀點？
 (A)古典學派理論 (B)行為學派理論 (C)系統學派理論 (D)現代學派理論

- (B) 79 下列何者與護理主管編列預算的能力無關？
(A)瞭解護理工作目標 (B)具高階學位 (C)具成效分析能力 (D)具執行力
- (D) 80 護理人員與病患一同檢視所訂的目標是否達成，這是護病關係發展那一期的工作？
(A)互動前期 (preinteraction phase) (B)介紹期 (orientation phase)
(C)工作期 (working phase) (D)結束期 (termination phase)

高
點
·
建
國

【版權所有，重製必究！】