

《內外科護理學概要》

- (C) 1 下列何者不是白內障病患的症狀？
(A)中間視力漸喪失 (B)白色瞳孔 (C)眼睛疼痛 (D)複視
- (A) 2 有關青光眼病患之護理指導，下列何者正確？
(A)隅角開放性青光眼病患須終生用藥
(B)雷射治療後眼壓即可恢復正常
(C)手術後日常生活即無任何限制
(D)教導自行調整滴注服藥的次數及劑量
- (D) 3 有關燒傷病患使用藥物Silver Nitrate 之敘述，下列何者正確？
(A)對焦痂穿透力強 (B)可能會誘發代謝性酸中毒
(C)不會影響傷口深度的判斷 (D)可能造成血鈉過低
- (C) 4 有關燒傷水療之敘述，下列何者正確？①水療前30 分鐘由肌肉注射止痛劑 ②水療時間超過30 分鐘可能造成鈉流失 ③水療前必須清洗水療池 ④為去除焦痂可將水療時間延長至60 分鐘
(A)①② (B)③④ (C)②③ (D)①④
- (D) 5 吳太太體重60 公斤，燒傷面積35%，依照帕克蘭公式 (Parkland formula)，第一個24 小時須補充液體總量為多少？
(A) 3,100c.c. (B) 4,200c.c. (C) 6,200c.c. (D) 8,400c.c.
- (B) 6 有關愛迪生氏症病患的飲食指導，下列何者正確？①多喝水 ②少攝取高醣類食物 ③多攝取高蛋白食物 ④減少鹽分攝取 ⑤少攝取高鉀食物
(A)①②④ (B)①③⑤ (C)②④⑤ (D)③④⑤
- (D) 7 以手輕敲臉部時，下列何種病患會出現局部臉頰肌肉抽搐？
(A)黏液水腫 (B)肢端肥大症 (C)甲狀腺功能亢進 (D)副甲狀腺功能低下
- (D) 8 下列何者不是引起庫欣氏症候群的病因？
(A)腎上腺皮質增生
(B)腎上腺瘤
(C)長期服用糖皮質素 (Glucocorticoids)
(D)下視丘分泌過多促腎上腺皮質賀爾蒙釋放素 (CRF)
- (A) 9 有關副甲狀腺功能亢進病患預防發生腎結石的護理指導，下列何者正確？
(A)每日攝取3~4 公升的水 (B)攝取富含維生素C 的食物
(C)鼓勵每4 小時排尿一次 (D)每年定期接受膀胱鏡檢查
- (A) 10 有關甲狀腺風暴的敘述，下列何者錯誤？
(A)因甲狀腺素及三碘甲狀腺素的合成與分泌過少所致
(B)未適當治療會引起充血性心臟衰竭而死亡
(C)體溫升高、心搏過速及意識改變是甲狀腺風暴的重要表徵
(D)甲狀腺切除術前，未服用足夠的抗甲狀腺藥物是危險因子
- (A) 11 有關服用放射性碘製劑的敘述，下列何者錯誤？
(A)嚴重甲狀腺亢進病患，應儘速接受放射性碘製劑的治療
(B)接受大劑量放射性碘製劑治療的病患，必須隔離數日
(C)接受低劑量放射性碘製劑治療的病患不需要住院
(D)放射性碘製劑藉破壞甲狀腺，以減少甲狀腺素的合成與分泌

- (C) 12 有關尿崩症 (diabetes insipidus) 的敘述，下列何者正確？
(A)因抗利尿激素分泌過多所引起 (B)出現血漿滲透壓下降
(C)呈現多尿、劇渴、脫水 (D)尿比重 > 1.030
- (D) 13 有關嗜鉻細胞瘤病患心輸出量改變的護理措施，下列何者錯誤？
(A)鼓勵充分休息，避免緊張的情緒 (B)教導避免喝含咖啡因的飲料
(C)監測每日的輸入量及輸出量 (D)觀察有無脫水及低血壓的徵象
- (A) 14 有關脊髓損傷病患進行膀胱訓練，導致自主神經過度反射所出現的臨床表徵，下列何者錯誤？
(A)心搏過速 (B)高血壓 (C)豎毛肌痙攣 (D)搏動性頭痛
- (D) 15 脊髓損傷病患之復健訓練共有四階段，下列何者為第二階段之訓練項目？
(A)深呼吸 (腹式呼吸) 訓練
(B)抗阻力肌肉訓練
(C)下肢麻痺者，執行伸展上臂的擴胸運動
(D)久坐輪椅者，須每10~15 分鐘撐起身體10~15 秒
- (B) 16 有關上運動神經元脊髓損傷病患排便訓練之敘述，下列何者正確？
(A)飯前60 分鐘，給予Ducolax 栓劑
(B)飯後30 分鐘，戴手套用手指刺激肛門
(C)飯後60 分鐘，再按摩腹部，以排淨大便
(D)選擇午餐及晚餐前進行排便訓練
- (A) 17 有關使用顯影劑之電腦斷層掃描的敘述，下列何者錯誤？
(A)常用來檢查腦血管瘤及動靜脈畸形 (AVMs)
(B)輻射量相當於病患做一次胸部X 光攝影
(C)檢查前，應先詢問病患是否對碘或貝類過敏
(D)注射顯影劑時，病患有發熱感是正常現象
- (C) 18 有關脊髓手術後病患之護理措施，下列何者錯誤？
(A)建議睡硬板床，以維持脊椎直線排列
(B)頸椎損傷者，應預防肺擴張不全和肺炎等合併症
(C)選擇低而軟的椅子，以維護安全
(D)鼓勵攝取高纖維食物
- (D) 19 有關中風病患身體活動障礙的護理措施，下列何者正確？
(A)每小時翻身一次，但絕對不可睡向患側
(B)避免讓病患俯臥，以免病患髖部屈曲變形
(C)使用粗隆捲軸，置放於腸骨嵴延伸至大腿中間之部位，可預防垂足
(D)除非有醫囑限制，否則中風後24 小時內，要執行四次被動全關節運動
- (B) 20 與阿茲海默症 (Alzheimer's disease) 病患溝通時，下列敘述何者錯誤？
(A)如果病患只能說出單字或短句，護理人員也用相同的方式與其溝通
(B)溝通時，最好採高音調、低音量及緩慢的速度
(C)當病患出現眼神避開，往下看的動作時，表示不明瞭溝通內容
(D)當病患受到挫折時，可能會增加手部的運動型活動
- (AC) 21 有關顱內壓增高 (IICP) 的敘述，下列何者正確？
(A)腦脊髓壓力若超過200 mmH₂O，則稱為顱內壓增高
(B)將腦與脊髓間之腦脊髓液循環阻斷時，腰椎內壓力及顱內壓均上升
(C)減少腦部血容量為IICP 之第二種代償型式
(D) IICP 中期易發生腦疝脫症候群

- (C) 22 有關三叉神經痛病患術後的護理措施，下列何者錯誤？
(A)教導眼角膜受損病患執行眼睛護理 (B)教導病患使用噴水式裝置清潔口腔
(C)教導病患用健側咀嚼食物且儘快進食 (D)評估病患是否有肺吸入情形
- (B) 23 有關頭部外傷 (head injury) 病患的護理措施，下列何者錯誤？
(A)定時測試意識程度及瞳孔反應
(B)維持呼吸道通暢，採平躺，保持頭頸在平直位置
(C)避免給液過多，須記錄輸出入量，維持水分平衡
(D)創傷初期，腸蠕動未恢復前，必須禁食
- (C) 24 有關腰椎椎間盤突出 (HIVD) 病患日常生活的注意事項，下列何者錯誤？
(A)應避免俯臥或睡高枕 (B)須長時間站立時，可彎曲一腿以緩解下背部壓力
(C)抬物品時，宜多利用背部肌肉之力量 (D)多走路或游泳，可強健背部的肌肉
- (D) 25 有關為成人進行心外按摩的敘述，下列何者正確？
(A)確定病患無呼吸才可進行心外按摩 (B)心外按摩時，兩手掌根置放在胸骨中段
(C)心外按摩時，兩手臂垂直下壓約1 吋 (D)以頸動脈的脈跳決定是否繼續心外按摩
- (D) 26 進行成人的心肺腦復甦術 (CPCR)，下列敘述何者正確？
(A)二人施救時，心外按摩與人工呼吸的比率為5：1
(B)對於異物阻塞的孕婦應使用腹部推壓法來急救
(C)倘若病患胸部未隨吹氣而起伏，應立即改由鼻部吹入
(D)CPCR 成功的徵象為瞳孔縮小、眨眼及開始自動呼吸
- (A) 27 下列何者為心絞痛病患服用鈣離子阻斷劑之目的？
(A)促進冠狀動脈擴張 (B)增加心肌的耗氧量
(C)加快心跳速率 (D)增進心室收縮力量
- (D) 28 有關心因性休克之敘述，下列何者正確？
(A)因為體內循環量減少所致 (B)造成皮膚潮紅、心輸出量減少
(C)給予抗組織胺的藥物治療 (D)必要時給予毛地黃或電擊治療
- (D) 29 下列何者不是造成肺心症的原因？
(A)肺泡換氣不足 (B)心輸出量不足 (C)吸入氧氣不足 (D)冠狀動脈栓塞
- (B) 30 下列何者是造成癌症病患出現瀰漫性血管內凝血 (disseminated intravascular coagulation, DIC) 的病因？
(A)不明肝臟疾病 (B)敗血症 (C)接受抗凝血劑治療 (D)病灶處轉移
- (A) 31 抽菸為何會增加罹患冠狀動脈疾病的危險性？
(A)會使血管收縮 (B)會使血脂增加 (C)會使心跳減慢 (D)會使血鉀降低
- (D) 32 心肌梗塞病患最不可能出現下列何種心電圖變化？
(A) Q 波出現 (B) T 波倒置 (C) ST 間段上升 (D) QRS 波變大
- (A) 33 下列何種心臟病大多由病毒所引起？
(A)心肌炎 (B)心內膜炎 (C)心包膜炎 (D)心瓣膜炎
- (C) 34 有關惡性高血壓的敘述，下列何者錯誤？
(A)屬於內科急症 (B)舒張壓超過120 mmHg
(C)出現右心室衰竭 (D)血管快速退化，重製必究！
- (C) 35 使用Warfarin Sodium (Coumadin) 出現出血合併症時，可採用下列何種拮抗劑？
(A) KCl (B) Heparin (C) Vitamin K (D) Protamine Sulfate
- (C) 36 依據斐爾科三要素 (Virchow's triad) 分析，下列何者是長期接受靜脈注射病患最可能出現深層靜脈血栓的原因？
(A)靜脈血流停滯 (B)凝血能力增加 (C)靜脈管壁損傷 (D)靜脈瓣膜閉鎖

- (D) 37 有關支氣管擴張症的敘述，下列何者錯誤？
(A)主要為慢性細菌性感染所引起 (B)因重力影響，多發生在肺下葉
(C)支氣管壁彈性組織會受損 (D)典型症狀為咳血與發燒
- (C) 38 有關肺水腫的敘述，下列何者錯誤？
(A)咳嗽時，會出現泡沫及血絲的痰 (B)會影響氣體交換
(C)通常是右心衰竭的症狀 (D)給予毛地黃增加心輸出量，可改善肺充血情況
- (D) 39 有關肋膜炎的敘述，下列何者正確？
(A)最常見為突然發作且侵犯雙側
(B)常會造成模糊胸痛症狀
(C)肋膜腔積水時會聽到肋膜摩擦音
(D)若肋膜腔積水量多時，會出現乾咳、呼吸困難等症狀
- (C) 40 有關成人呼吸窘迫症候群 (ARDS) 的敘述，下列何者正確？
(A)最早的臨床表徵是呼吸用力、變慢 (B)胸部X 光顯示單側、間質性慢慢浸潤變化
(C)提高FiO₂ 時，不再有反應性低血氧 (D)病患應與親友隔離，以免被感染
- (A) 41 有關肺部栓塞導致之肺部生理變化，下列何者錯誤？
(A)肺部分流增加 (B)氣管痙攣 (C)肺高壓症 (D)肺部死腔增加
- (C) 42 下列何者是氣喘病患使用類固醇類藥物治療之主要目的？
(A)促進痰液液化 (B)加速纖毛傳送 (C)抑制炎症反應 (D)增加橫膈收縮
- (B) 43 有關扁桃腺炎之敘述，下列何者正確？
(A)發燒症狀消退後，即應停止使用抗生素
(B)可以溫的生理食鹽水做咽喉灌洗或漱口
(C)避免吞嚥造成疼痛，宜減少水分及食物的攝取
(D)若合併有耳痛症狀，不宜施行扁桃腺切除術
- (D) 44 有關急性闌尾炎的敘述，下列何者正確？
(A)起初腹痛在肚臍周圍，然後轉移至左下腹部 (B)白血球總數會減少
(C)腹痛時，可熱敷促進血液循環 (D)臨床表徵會出現洛夫辛徵象 (Rovsing's sign)
- (A) 45 有關食道癌之敘述，下列何者正確？
(A)擴散速度快，5 年存活率低 (B)最早出現之典型症狀為聲音嘶啞
(C)最常見為食道上皮細胞癌 (D)與習慣性進食冰冷食物有關
- (B) 46 有關急性膽囊炎病患的疼痛評估與處置，下列何者正確？
(A)左上腹或上腹中央疼痛，會輻射至背部
(B)觸診膽囊有壓痛，且吸氣時更嚴重
(C)可注射Morphine 以緩解疼痛
(D)可服用膽鹽以消除膽道痙攣
- (B) 47 有關炎症性腸道疾病恢復期的飲食治療原則，下列何者正確？
(A)高蛋白、高脂肪、低醣 (B)高蛋白、高熱量、低纖維
(C)高熱量、低脂肪、高纖維 (D)高脂肪、低纖維、高礦物質
- (D) 48 感染B 型肝炎病毒後，下列何種血清學檢驗呈現病患的傳染力減弱？
(A)HBsAg (+) (B)anti-HBc (+) (C)HBeAg (+) (D)anti-HBe (+)
- (D) 49 有關腹部身體檢查與評估之結果，下列何者正確？
(A)正常情況下可聽到腹主動脈血流嘈音
(B)肚臍周圍皮膚顏色有瘀血變化，表示有腹膜後出血
(C)反鈎法常用於脾臟觸診
(D)嚴重腹水時，可測到轉移性濁音

- (A) 50 有關病患痔瘡手術後的護理措施，下列何者錯誤？
(A)教導病患排便後不宜溫水坐浴，以防傷口感染
(B)教導病患每日規律運動，至少攝取2~3 公升液體
(C) 8 小時內若有二塊以上的會陰敷料浸濕，表示傷口過度出血
(D)監測病患排尿情形，以防發生尿瀰留
- (B) 51 下列何者不是胃食道逆流疾病 (GERD) 常見的症狀？
(A)吞嚥困難 (B)飢餓痛 (C)心口灼熱 (D)反胃 (regurgitation)
- (D) 52 有關急性腎衰竭的護理措施，下列何者正確？
(A)詳細記錄輸出入量，每日液體補充量為前一日的尿排出量
(B)每日量腹圍，以了解水分瀰留情形
(C)觀察是否出現高血鈣及低血磷的症狀
(D)飲食採高熱量、低蛋白、限鈉飲食
- (B) 53 有關急性腎衰竭病患所呈現的電解質不平衡現象，下列何者錯誤？
(A)高血鉀 (B)高血鈉 (C)低血鈣 (D)高血磷
- (C) 54 有關急性腎絲球腎炎的敘述，下列何者錯誤？
(A)是一種免疫系統的障礙 (B)致病原常發生在呼吸道或皮膚感染
(C)金黃色葡萄球菌是常見致病原 (D)減輕壓力可以降低腎臟受損程度
- (A) 55 有關多囊性腎臟病的敘述，下列何者錯誤？
(A)是性染色體隱性遺傳疾病 (B)腰椎鈍痛及後腰窩絞痛為常見之臨床表徵
(C)此病會破壞腎元導致腎衰竭 (D)泌尿道感染是常見的合併症
- (D) 56 有關泌尿道造瘻口術後的居家照護，下列敘述何者錯誤？
(A)造瘻口周圍皮膚可用清水清洗乾淨
(B)強鹼性尿液易造成造瘻口周圍結晶形成
(C)造瘻口保護底座若無滲漏可使用5~7 天才更換
(D)造瘻口可採用印度樹膠 (karaya) 保護底座
- (A) 57 下列何者是睪丸癌最主要的危險因素？
(A)隱睪症 (B)抽菸 (C)精索曲張 (D)暴露於化學環境中
- (B) 58 逆行性射精為經尿道前列腺切除術 (TURP) 後合併症，下列敘述何者錯誤？
(A)病患的尿液呈混濁現象 (B)病患的精液是射入輸尿管中
(C)病患會出現性高潮 (D)病患會出現勃起現象
- (B) 59 有關牽引的敘述，下列何者錯誤？
(A)頸部牽引力量約5~15 磅，可採低半臥式，以對抗牽引
(B)皮膚牽引時間勿少於1 個月
(C)伸展牽引病患須臥於床正中央，並預防垂足
(D)剛移除牽引初期，病患可能有姿位性低血壓
- (B) 60 全髖關節置換術後，強調患側髖關節屈曲不可大於90° 的理由為何？
(A)預防感染 (B)預防關節脫位 (C)預防關節攣縮 (D)預防血栓形成
- (B) 61 指導病患服用碳酸鈣補充鈣質時，下列敘述何者錯誤？
(A)胃酸有助於溶解碳酸鈣，故宜在飯後服用
(B)須預防碳酸鈣引起之腹瀉
(C)補充維生素D，以促進小腸對鈣質之吸收
(D)不宜與茶或咖啡一起服用
- (C) 62 關節扭傷時之立即處理，下列何者正確？
(A)平放患肢 (B)按摩扭傷部位 (C)給予冰敷 (D)徒手復位

- (B) 63 移除石膏後的護理措施，下列何者錯誤？
(A) 拆除石膏的肢體避免立即下垂，以免腫脹疼痛
(B) 新生未脫皮的皮膚應開始常曬陽光，以促進骨頭癒合及皮膚的新陳代謝
(C) 應協助病患做石膏肢體的主動性或被動性運動
(D) 在運動過程中如有疼痛發生，應立即停止
- (B) 64 痛風病患使用Probenecid (Benemid)，其主要作用為何？
(A) 抑制尿酸的形成 (B) 降低腎小管再吸收尿酸
(C) 抑制尿酸形成所需的酶 (D) 分解關節中之痛風石
- (D) 65 結核菌素皮膚試驗屬於何種過敏反應？
(A) 立即性過敏反應 (B) 細胞毒性過敏反應
(C) 免疫複合體過敏反應 (D) 遲發性過敏反應
- (A) 66 下列何種疾病病患會咳出鐵 色痰液？
(A) 肺炎雙球菌性肺炎 (B) 綠膿桿菌性肺炎 (C) 黴漿菌性肺炎 (D) 病毒性肺炎
- (D) 67 有關全身性紅斑性狼瘡 (SLE) 之診斷檢查，下列何者正確？
(A) 白血球數目升高 (B) 血小板數目升高
(C) 血清補體C3、C4 升高 (D) 紅血球沈降速率上升
- (B) 68 全身性紅斑性狼瘡 (SLE) 病患因疲勞或疼痛而出現活動無耐力時，下列護理措施何者不宜？
(A) 處於惡化期時，囑其臥床休息以節省能量
(B) 為避免無耐力持續惡化，須按計畫達到每日預定的活動量
(C) 放慢活動，若脈搏或呼吸加速時，應讓病患休息
(D) 每4 小時提供未受侵犯之關節的活動，以防僵硬
- (B) 69 造成愛滋病病患體內免疫功能缺失的主要原因為何？
(A) 絕對嗜中性白血球 (ANC) 數目過少 (B) 輔助性T 淋巴球受侵犯
(C) 單核球過少 (D) B 淋巴球功能異常
- (A) 70 有關單純性疱疹 (herpes simplex) 之敘述，下列何者正確？①第一型單純性疱疹可能因唾液傳染 ②罹患第二型單純性疱疹期間，應避免與人有親密性接觸 ③第二型單純性疱疹之水疱通常長在胸部 ④注射抗生素療效最佳
(A) ①② (B) ②③ (C) ③④ (D) ①④
- (C) 71 照顧一位接受間質素-2 (Interleukin-2) 治療的病患，下列那一項症狀表示可能有毒性反應？
(A) 多尿 (B) 高血壓 (C) 食慾減低 (D) 甲狀腺功能亢進
- (D) 72 癌症七大警訊不包括下列那一項？
(A) 牙齦無故出血 (B) 咳嗽持續不停 (C) 傷口長久不癒 (D) 突然停經
- (C) 73 有關鼻咽癌之敘述，下列何者正確？
(A) 以化學藥物治療為主
(B) 癌細胞之分化好、惡性度低
(C) 致病原因與EB 病毒 (Epstein-Barr virus) 感染有關
(D) 在台灣，女性比男性病患預後差
- (C) 74 有關放射線治療引起口腔炎的病患衛教，下列何者錯誤？
(A) 多飲水 (B) 採清淡飲食
(C) 以雙氧水加水，調成1：1 的稀釋液漱口 (D) 採用溫水漱口
- (D) 75 骨髓移植可有效治療下列何種貧血？
(A) 海洋型貧血 (B) 鐮刀形血球貧血 (C) 惡性貧血 (D) 再生不良性貧血

- (B) 76 引發癌症病患出血之因素，下列何者正確？
(A)紅血球沈降速率下降 (B)血小板數目減少
(C)中性白血球增加 (D)血紅素降低
- (B) 77 下列那些含水溶性纖維的多醣類食物可鼓勵糖尿病病患攝取？①果凍 ②燕麥 ③蘋果 ④紅蘿蔔 ⑤芋頭 ⑥紅豆
(A)①③⑤ (B)②③④ (C)①②⑥ (D)④⑤⑥
- (C) 78 有關丹毒 (erysipelas) 之敘述，下列何者正確？
(A)由白色念珠球菌感染所引起 (B)侵犯的部位是皮下組織
(C)患部皮膚呈紅色，有清楚的邊緣 (D)患部熱敷可以減輕疼痛不適
- (C) 79 下列何種抗生素不會造成耳毒性的副作用？
(A) Amikin (B) Streptomycin (C) Cefamezin (D) Garamycin
- (B) 80 林小姐登山健行時，被雨傘節 (毒蛇) 咬傷右腿，下列敘述何者正確？
(A)雨傘節的毒液具有出血性毒素 (B)應儘速注射抗毒蛇血清
(C)使用阿斯匹林類止痛劑 (D)冰敷傷口可減緩毒素擴散

建國

【版權所有，重製必究！】