

《內外科護理學概要》

- (D) 1 有關腰椎穿刺檢查的注意事項，下列何者正確？
 (A)可用來檢查顱內壓升高程度
 (B)針穿過硬膜時，若有些微疼痛，表示長針位置錯誤，應立即拔出
 (C)第一個收集的腦脊髓液試管檢體，是用來檢測是否含血
 (D)穿刺後，鼓勵多喝水，以減輕頭痛
- (D) 2 病人發生車禍後，發現手臂功能正常，但較軟弱無力；胸部中線以下沒感覺，其脊髓損傷部位可能在何處？
 (A)第五頸椎 (B)第六頸椎 (C)第七頸椎 (D)第八頸椎
- (BD) 3 罹患催乳激素瘤之男性病患會出現下列何種症狀？
 (A)嗜睡 (B)性慾降低 (C)聲音粗啞 (D)溢乳症 (galactorrhea)
- (B) 4 下列何者不是暫時缺血性發作 (TIA) 常見的症狀？
 (A)視力突然模糊 (B)小便失禁現象 (C)一側肢體突然無力 (D)心智遲緩
- (D) 5 有關重症肌無力的敘述，下列何者正確？
 (A)病患的疲倦及無力，在運動後會改善
 (B) 80%病人血液中的乙醯膽鹼受器抗體，有減少的情形
 (C)男性的罹病率高於女性
 (D)抗膽素脂酶藥物之測試可確立此病
- (D) 6 急性脊髓損傷休克期的病患，在損傷部位以下，會出現下列何種現象？
 (A)血壓上升 (B)肌肉痙攣 (C)肺擴張不全 (D)膀胱張力消失
- (C) 7 下列何者為巴金森氏症之主要病灶位置？
 (A)大腦灰質 (B)大腦白質 (C)大腦基底核 (D)延腦黑質
- (C) 8 有關畢羅氏II型（胃空腸吻合）手術後合併症，下列何者錯誤？
 (A)傾倒症候群 (B)輸入腸道症候群 (C)胃排空變差 (D)鹼性逆流性胃炎
- (B) 9 肝硬化病患因動情激素過多，會出現下列那些症狀？①紫斑 ②紅掌 ③脾腫大 ④男性女乳
 (A)①③ (B)②④ (C)①④ (D)②③
- (A) 10 下列何者不是消化性潰瘍藥物治療的原則？
 (A)促進胃排空速率 (B)減少胃酸分泌 (C)中和胃酸 (D)保護胃黏膜障壁
- (A) 11 痔瘡切除手術採不縫合傷口之護理措施，下列何者正確？
 (A)在肛門口塗抹氧化鋅軟膏，以減輕疼痛 (B)手術後可立刻熱敷，以減輕疼痛
 (C)採仰臥休息，以紗布彈繃壓迫傷口 (D)預防傷口感染，避免採溫水坐浴
- (C) 12 有關急性胰臟炎疼痛之敘述，下列何者錯誤？
 (A)疼痛是突發且持續的 (B)疼痛位置出現在上腹部
 (C)疼痛會輻射到雙手臂 (D)採膝胸臥式可緩解疼痛
- (D) 13 下列何種腸造瘻會排出成形便？
 (A)迴腸造瘻 (B)升結腸造瘻 (C)橫結腸造瘻 (D)乙狀結腸造瘻
- (A) 14 有關腹膜炎的治療與護理措施，下列何者錯誤？
 (A)以metronizole 治療嗜氧菌感染的腹膜炎
 (B)補充水分、電解質及膠質溶液
 (C)急性期應禁食，予插鼻胃管抽吸及減壓
 (D)手術後協助病患採半坐臥姿勢

- (D) 15 有關剖腹膽囊切除術後之護理措施，下列何者錯誤？
(A)放置鼻胃管減壓，可改善噁心、嘔吐 (B)靜脈輸注補充體液
(C)進食採少量多餐方式 (D)飲食採用高碳水化合物、高脂肪及高蛋白質食物
- (A) 16 有關上石膏病人的護理措施，下列何者錯誤？
(A)需測量石膏近端的皮膚溫度 (B)需注意患肢遠端的拇指活動情形
(C)注意患肢的活動度 (D)評估石膏上的冷點、熱點及濕點
- (C) 17 對痛風病患之飲食建議，下列何者錯誤？
(A)多進食柑橘類水果 (B)避免喝肉湯、濃湯 (C)多進食菇類及黃豆製品 (D)避免脫水
- (D) 18 骨折後患肢不會出現下列何種表徵？
(A)畸形 (B)瘀血 (C)疼痛 (D)肌肉鬆弛
- (C) 19 全髓關節置換手術後的護理措施，下列何者錯誤？
(A)鼓勵攝取高纖維食物 (B)增加舒適性，減輕疼痛
(C)每日飲水不得超過1,000 c.c. (D)預防出現譫妄、壓瘡等合併症
- (A) 20 有關荷爾蒙補充治療之敘述，下列何者錯誤？
(A)動情素須在停經前3年起規律服用，才有預防骨質疏鬆效果
(B)動情素和黃體素配合使用，以預防子宮內膜增生
(C)服用期間須定期檢查子宮內膜及乳房
(D)子宮內膜癌病患，不可採用動情素，以預防骨質疏鬆症
- (A) 21 有關骨質疏鬆症的飲食指導，下列何者錯誤？
(A)避免攝取綠色葉菜類 (B)多攝取高鈣食物
(C)避免抽菸 (D)每天需攝取維生素D 400 IU
- (B) 22 預防骨折病人發生脂肪栓塞合併症，下列護理措施何者正確？
(A)骨折發生後給予類固醇藥物，減少游離脂肪酸反應
(B)股骨骨折後1~2天內，要留意有無對肺部的直接傷害
(C)當病人出現感覺遲鈍、肌肉無力時，立即放置氣管內管
(D)骨折部位固定後，限制病人下床活動
- (B) 23 下列何者會造成傳導性聽力喪失？
(A)糖尿病 (B)耳垢填塞 (C)長期曝露於噪音中 (D)老化
- (C) 24 病人主訴出現閃光幻視及浮動黑點，初步診斷最可能是罹患下列那一種疾病？
(A)青光眼 (B)白內障 (C)視網膜剝離 (D)高血壓視網膜病變
- (B) 25 下列何者是急性隅角閉鎖性青光眼常見之臨床表徵？
(A)中心視野缺損 (B)頭痛及眼痛 (C)閃光幻視 (D)眼前浮動的黑點
- (C) 26 有關鼻中膈彎曲病人之術後護理措施，下列何者正確？
(A)病人不斷吞嚥口水是正常現象 (B)鼓勵病人咳嗽，以預防呼吸道感染
(C)鼻部冰敷可緩解疼痛與止血 (D)術後24小時可自行取下鼻填塞物
- (A) 27 有關扁桃腺切除術及術後護理的敘述，下列何者正確？
(A)手術適應症為扁桃腺炎一年發作超過四次，每次超過七天
(B)扁桃腺炎急性發作時，進行手術治療效果最佳
(C)術後鼓勵病患用力咳嗽，將血塊咳出
(D)手術後感覺有血流入咽喉是正常現象
- (D) 28 急性心肌梗塞病人需要每日服用Aspirin 最主要的目的為何？
(A)解熱 (B)鎮痛 (C)促進血栓溶解 (D)抑制血小板凝集
- (B) 29 有關心絞痛病人的護理措施，下列何者錯誤？
(A)給予氧氣治療 (B)鼓勵跑步運動 (C)提供少量多餐 (D)計畫適度減重

- (D) 30 醫囑給予心衰竭病人使用morphine 的主要目的是為改善下列何種症狀？
 (A)噁心 (B)濕囉音 (C)發紺 (D)焦慮
- (A) 31 有關感染性心內膜炎病人發燒時的護理措施，下列何者錯誤？
 (A)限制水分和鹽分攝取 (B)給予靜脈注射抗生素治療
 (C)給予高蛋白、高醣飲食 (D)臥床休息
- (C) 32 心臟移植失敗導致死亡的主因為下列何者？
 (A)出血 (B)休克 (C)排斥 (D)壞死
- (B) 33 下列何者是機械性瓣膜置換術病人，可能會終生服用的藥物？
 (A) digoxin (B) warfarin sodium (Coumadin) (C) vitamin C (D) protamine sulfate
- (A) 34 有關長期高血壓所導致的心血管變化，下列何者正確？
 (A)血管硬化 (B)血管管腔擴張 (C)心肌萎縮 (D)動脈充血，靜脈血流降低
- (A) 35 心導管檢查後，以砂袋加壓病患的右鼠蹊部傷口之目的為何？
 (A)止血 (B)消腫 (C)化瘀 (D)制動
- (B) 36 處理放射線污染源時，宜倒入下列何種材質之容器內？
 (A)玻璃 (B)鉛 (C)不銹鋼 (D)塑膠
- (B) 37 有關缺鐵性貧血的護理指導，下列何者錯誤？
 (A)教導病人使用吸管吸食液態鐵劑，以免牙齒染色
 (B)鼓勵病人餐前服用鐵劑，以增加鐵劑的吸收率
 (C)鼓勵多攝取富含維生素C 食物，以助鐵質吸收
 (D)肌肉注射鐵劑時，應採Z 字型注射，以減少局部組織的刺激
- (C) 38 行政院衛生署建議停經後婦女應於何時做乳房自我檢查？
 (A)每日沐浴時 (B)每週1 次 (C)每月固定1 日 (D)每半年至醫療院所受檢
- (B) 39 有關何杰金氏症的敘述，下列何者錯誤？
 (A)病患體內有許多的Reed-Sternberg 細胞增生 (B)疾病初期，病患不直接接受放射線治療
 (C)好發於20~40 歲的男性 (D)發燒和頸部無痛性淋巴結腫大，為常見的症狀
- (D) 40 下列何種腫瘤標記可做為大腸癌預後指標？
 (A) PAP (B) CA-125 (C) AFP (D) CEA
- (D) 41 有關預防疥瘡再發或傳染給他人之護理措施，下列何者錯誤？
 (A)護理人員接觸病人時，應穿隔離衣及戴手套
 (B)使用過的毛巾、床單及衣物應用熱水清洗
 (C)感染者的家屬、密友必須一併接受治療
 (D)每晚沐浴後，自頭部以下到腳底塗抹抗疥蟲藥物

情況：許先生，50 歲，體重65 公斤，燙傷面積占30%體表面積，依此回答下列第42 題至第43 題。

- (A) 42 依帕克蘭公式 (Parkland 或Baxter formula) 計算，第1 個24 小時給予許先生的輸液，下列何者正確？
 (A)乳酸林格氏液7,800 c.c.
 (B)乳酸林格氏液3,900 c.c.
 (C)乳酸林格氏液2,925 c.c. + 膠體975 c.c. + 5%葡萄糖水2,000 c.c.
 (D)生理食鹽水1,950 c.c. + 膠體1,950 c.c. + 5%葡萄糖水2,000 c.c.
- (C) 43 許先生燙傷一段時間後，其手臂接受部分皮層自體移植 (split-thickness skin autografts) ，下列敘述何者正確？
 (A)移植全部的表皮及真皮 (B)移植內容包括毛囊及汗腺
 (C)取下的皮膚可延展成網狀 (D)補皮區需儘早開始運動

- (B) 44 有關執行乳房自我檢查的敘述，下列何者錯誤？
(A) 20 歲以上的婦女需要執行此檢查 (B)應在每月月經結束後7 天做檢查
(C)需用指腹按壓乳房 (D)以旋轉觸壓方式，仔細檢查乳房的每一個部位
- (B) 45 護理人員在照護後天免疫缺乏症候群病人不慎發生針扎時，下列那一項措施不適當？
(A)立即以大量清水沖洗傷口 (B)於72 小時內給予單株抗體
(C)立即通報，並進行抽血檢驗 (D)於事件發生後6、12、24 及48 週進行追蹤檢查
- (C) 46 有關全身性紅斑性狼瘡之臨床表徵，下列何者錯誤？
(A)關節炎 (B)心包膜炎 (C)便秘、腹痛 (D)發燒
- (B) 47 有關全身性紅斑性狼瘡的診斷檢查，下列何者正確？
(A)紅血球沈降速率 (ESR) 明顯下降 (B)補體C3、C4 的量會減少
(C)白血球總數會上升 (D)抗核抗體 (ANA) 呈陰性反應
- (A) 48 類風濕性關節炎病患的關節僵硬及疼痛情形，通常下列何時最嚴重？
(A)早晨 (B)中午 (C)傍晚 (D)深夜
- (D) 49 有關器官移植後服用藥物的護理指導，下列何者錯誤？
(A)定期監測發燒及肝腎功能異常的排斥徵象
(B)定時服用免疫抑制劑，不可自行調藥
(C)避免出入公共場所，因抗排斥藥物會增加感染機率
(D)建議至少移植3 年後，才考慮懷孕
- (D) 50 有關輸血過敏反應之臨床表徵，下列何者錯誤？
(A)血尿 (B)腰背痛 (C)蕁麻疹 (D)高血壓
- (B) 51 有關急性呼吸窘迫症候群 (ARDS) 之護理措施，下列何者正確？
(A)維持與監測每小時尿量大於100 c.c.
(B)依醫囑監測容積控制型呼吸器的使用成效
(C)協助每2 小時採取頭低腳高的俯臥姿勢引流痰液
(D)維持與監測動脈血中氧分壓 (PaO₂) 大於150 mmHg
- (B) 52 有關肺癌病人術後之護理措施，下列何者正確？
(A)教導病人儘量平躺，維持生命徵象之穩定
(B)教導病人橫膈式及噁嘴呼吸，有助肺部擴張
(C)鼓勵病人儘早執行手臂運動，有助傷口癒合
(D)教導病人術後1 年內不得提重物，以免影響神經肌肉功能
- (D) 53 進行胸腔放液穿刺術 (thoracentesis) 時，病患不宜採下列何種姿位？
(A)於床緣採取坐直姿勢 (B)面向椅背，手臂抱椅背跨坐
(C)無法坐起者躺向健側 (D)手臂張開平臥於床上
- (C) 54 有關胸部物理治療叩擊技巧的護理指導，下列何者錯誤？
(A)雙手交替節律性執行 (B)叩擊時避開骨頭部位
(C)每個部位叩擊各10 次 (D)飯前2 小時執行叩擊
- (B) 55 下列何者是慢性阻塞性肺疾病個案採用橫膈式呼吸訓練的成果？
(A)增加呼吸速率 (B)降低呼吸作功 (C)減少潮氣容積 (D)降低肺泡換氣
- (D) 56 有關氣喘患者使用定量吸入器 (MDI) 藥物治療，下列何者錯誤？
(A)使用前先搖勻 (B)完全吐氣後吸氣 (C)緩慢而持續吸氣 (D)2 次劑量連續噴入
- (D) 57 有關肺部挫傷 (contusion) 病患的醫療處置，下列何者錯誤？
(A)排除痰液 (B)疼痛處理 (C)給予抗生素 (D)補充大量液體
- (C) 58 下列何項數值可代表血液含氧程度？
(A)碳酸氫根離子 (B)二氧化碳分壓 (C)氧分壓 (D)酸鹼值

- (D) 59 有關尿道改道手術後，控制異味的護理指導，下列何者錯誤？
(A)告知避免攝取蘆筍、乳酪等使尿液味道強烈的食物
(B)告知可服用維生素C，以抑制尿液的異味
(C)告知可在引流囊底部滴入稀釋的白醋，以減輕異味
(D)教導在引流囊內放入Aspirin 藥片來去除異味
- (D) 60 有關預防膀胱癌的護理指導，下列何者錯誤？
(A)遠離二手菸 (B)多喝水 (C)避免染髮 (D)補充維生素E
- (C) 61 急性腎絲球腎炎病患不需要限制下列何種飲食？
(A)水 (B)蛋白質 (C)醣 (D)鈉
- (B) 62 為收集成人病患的尿液做細菌培養，下列何者正確？
(A)收集清晨第一次尿液 (B)收集中段尿
(C)使用導尿管者由集尿袋中抽取 (D)應一律採用單導方式收集尿液
- (C) 63 下列何者不是腹膜透析的優點？
(A)飲食限制較少 (B)對生活干擾較少 (C)蛋白質流失較少 (D)噁心、嘔吐比較不會發生
- (B) 64 有關尿毒症患者皮膚搔癢不適的護理措施，下列何者錯誤？
(A)告知其為尿素霜或鈣磷沈積所致 (B)可採熱敷以降低不適
(C)沐浴後使用Calamine 乳劑 (D)修剪指甲避免抓傷
- (D) 65 下列何種腎結石患者應增加柑橘類的攝取？
(A)草酸鈣 (B)磷酸鈣 (C)磷酸胺鎂 (D)胱胺酸
- (A) 66 下列何者為下泌尿道感染的典型症狀？
(A)排尿時有灼熱感 (B)尿液呈淡黃色 (C)上腹部疼痛 (D)每次解尿量過多
- (C) 67 格雷氏症 (Grave's disease) 患者不會出現下列何項臨床表徵？
(A)眼球突出 (B)心搏過速 (C)對冷的耐受力降低 (D)對壓力的耐受力降低
- (C) 68 有關庫欣氏症候群 (Cushing's syndrome) 之臨床表徵，下列何者正確？
(A)四肢肥胖 (B)體重減輕 (C)骨質疏鬆 (D)皮下脂肪增厚
- (A) 69 黏液水腫 (Myxedema) 患者不會出現下列何種問題？
(A)服用甲狀腺藥物後，產生血糖降低 (B)代謝率降低導致體重增加及營養不平衡
(C)對冷敏感，保暖不佳易誘發黏液水腫昏迷 (D)貧血及腦循環血量不足，產生智力減退
- (B) 70 有關副甲狀腺功能亢進病人之護理指導，下列何者正確？①鼓勵多攝取奶類及乳製品 ②每天多攝取水分，預防脫水 ③鼓勵多喝酸灰性飲料，預防腎結石形成 ④減少纖維量的攝取
(A)①② (B)②③ (C)③④ (D)①④
- (C) 71 有關尿崩症病患之診斷檢查結果，下列何者正確？①體重減輕5% ②尿比重1.010 ③血漿滲透壓升高 ④尿液滲透壓降低 ⑤血鈉值降低
(A)①④ (B)②③ (C)③④ (D)④⑤
- (C) 72 有關第一型糖尿病和第二型糖尿病的比較，下列何者正確？
(A)第一型糖尿病常發生於30 歲以上的成人
(B)僅第二型糖尿病人會出現「多吃、多喝、多尿」症狀
(C)第二型糖尿病人常發生高血糖高滲透性非酮性昏迷合併症
(D)第二型糖尿病人體內可發現胰島素的自體抗體
- (A) 73 有關愛迪生氏症病人的護理措施，下列何者正確？
(A)拔牙時，告訴醫師，以便增加類固醇藥物的劑量
(B)避免造成身心壓力，儘量在家臥床休息
(C)鼓勵少喝水、採低鈉、高蛋白飲食，以預防水腫發生
(D)監測愛迪生氏危機的徵象：高血糖、低血鉀

- (D) 74 有關痛風之敘述，下列何者正確？
(A)緩解急性發作期疼痛最有效的藥物是Allopurinol
(B)最常受侵犯的關節是腳的小拇趾第一個關節
(C)發生率女性高於男性，且具家族遺傳性
(D)急性發作期之紅血球沉降率及血清中尿酸值升高
- (D) 75 一位孕婦用餐時，突然說不出話，開始咳嗽。此時應採取下列何項急救措施？
(A)鼓勵咳嗽 (B)輕拍肩膀 (C)背擊法 (D)胸戳法
- (A) 76 下列何種個案應該先進行CPR，再打電話求救？
(A)溺水 (B)休克 (C)過敏 (D)中毒
- (C) 77 有關癌症預防方法，下列何者錯誤？
(A)選擇新鮮蔬果、均衡飲食 (B)養成規律運動習慣
(C)長期服用雌性素 (D)學習自我身體檢查
- (C) 78 將仰臥病人之頭部由床上抬起時，出現兩側大腿在髖部屈曲，以及踝部與膝蓋彎曲之動作。此種現象稱為下列何者？
(A)格拉斯科徵象 (Glasgow's sign)
(B)雙向病徵 (Double sign)
(C)布魯金斯基氏徵象 (Brudzinski's sign)
(D)克爾尼格式徵象 (Kernig's sign)
- (D) 79 2 位醫護人員為成年人進行 CPR 時，胸外按壓與吹氣比，下列何者正確？
(A) 5:1 (B) 15:1 (C) 15:2 (D) 30:2
- (AB) 80 有關心因性休克的臨床表徵，下列何者正確？
(A)心搏過速 (B)尿量減少 (C)皮膚溫暖潮紅 (D)血壓上升

【版權所有，重製必究！】