

《基本護理學與護理行政》

- (B) 1. 依據疾病自然史發展，在疾病的易感染期欲將危險因子去除或減至最低，可提供何種預防方法？
A. 早期診斷早期治療
B. 促進健康
C. 限制殘障
D. 復健
- (C) 2. 有關內科無菌技術的敘述，下列何者正確？
A. 為避免交互感染，可以戴手套來取代洗手
B. 高於肘部的刷手為一種內科無菌技術
C. 綁帶式外科口罩上下兩條帶子均需繫上，須同時蓋住口、鼻部
D. 指執行侵入性治療時，保持滅菌物品或無菌區域無菌狀態的技術
- (C) 3. 手術縫合針使用後以容器收集，應使用下列何種醫療廢棄物處置方式處理？
A. 福馬林消毒
B. 冰凍處理後掩埋
C. 滅菌後粉碎
D. 紫外線消毒
- (C) 4. 病房中設有護理師專門負責所有病人的傷口換藥工作，屬於下列何種工作模式？
A. 全責護理 B. 成組護理 C. 功能性護理 D. 個案護理
- (B) 5. 護理計畫的健康問題優先順序的排列原則，下列何者錯誤？
A. 威脅病人生命的須優先解決
B. 護理人員覺得最重要的優先解決
C. 依馬斯洛（Maslow）的需要層次理論排列
D. 相關的護理問題儘量排在一起
- (C) 6. 下列何者是護理評估的客觀資料（objective data, O）？
A. 家屬：「我媽媽血壓偏低」
B. 病人：「清晨2～3點才入睡」
C. 護理師：「白血球10,000/mm³」
D. 看護：「病人一直在叫痛」
- (C) 7. 下列何者是相依性護理活動？
A. 執行每日疼痛評估
B. 靜脈輸注PRBC 2U STAT
C. 肌肉注射PRN止痛藥物
D. 教導病人胰島素注射方法
- (B) 8. 有關完全電子病歷優點的敘述，下列何者錯誤？
A. 資料可供同體系共享，維持資料一致性
B. 醫療流程管制與修改方便，且不會留有紀錄
C. 資料完善，具結構化，可促進醫學研究
D. 不必有紙本病歷，可以減少醫院的成本
- (C) 9. 病人抱怨：「你們醫院的高血壓藥品質不好，吃了好像都沒有效果！」護理人員回覆：「不會吧！我們醫院的藥物都是用最好的。」護理人員的回覆為下列何種非治療溝通技巧？

A.過度負荷 B.批判的態度 C.防衛性態度

D.改變話題

(C) 10.下列何者為執行一次就自動失效的醫囑？ ①Dulcolax 1# supp. HS ②Ketoprofen 1 amp. I.M. STAT ③Valium 1# P.O. HS SOS ④Demerol 40 mg I.M. Q6H PRN

A.①③ B.①④ C.②③ D.②④

(D) 11.小樂3歲，持續發燒不適，拒絕服藥，醫師開立Voren® 12.5 mg/supp 1# supp. STAT，護理師衛教小樂媽媽肛門栓劑的使用，下列敘述何者錯誤？

A.肛門栓劑應保存在冰箱中冷藏

B.可在栓劑前端塗抹少量潤滑劑

C.栓劑插入肛門內約2吋深

D.塞入後維持原姿勢或右側臥15分鐘

(C) 12.就藥物劑型而言，下列口服藥物何種吸收最快？

A.acetylcysteine powders B.acetaminophen tablet C.brown mixture syrup D.ampicillin capsule

(C) 13.醫囑開立oxacillin 1 gm Q6H I.V. drip，oxacillin藥瓶標示為250 mg/vial，每次給藥時應抽幾瓶（vial）？

A.1 B.2.5 C.4 D.6

(B) 14.下列靜脈輸液何者不是低張溶液？

A.0.33% NaCl

B.Lactated Ringer's solution

C.Half Saline

D.2.5% Glucose Water

(B) 15.有關「靜脈採血」的執行步驟，下列何者正確？

A.成人可使用27號針頭抽血

B.避免從正接受靜脈輸液治療的部位抽血

C.以酒精棉球消毒後，以手搨風加速酒精揮發

D.將抽得的血液沿著試管壁快速注入，並充分搖晃試管

(A) 16.病人因泌尿道感染，醫囑：Gentamycin® 10 mg in N/S 30 mL drip 30 min，有關使用精密輸液套管加藥的步驟，下列敘述何者錯誤？

A.打開輸液瓶與精密輸液袋（bag）間之阻斷夾，以手擠壓精密輸液袋（bag）到所需之量，關閉阻斷夾

B.精密輸液袋（bag）內之溶液到所需之輸液量後，關閉輸液瓶與精密輸液袋（bag）間之阻斷夾

C.以酒精棉片消毒精密輸液袋（bag）加藥口，將藥物注入精密輸液袋（bag）

D.藥物滴完後，打開輸液瓶與精密輸液袋（bag）間之阻斷夾，使精密輸液袋（bag）內流入適量溶液，沖洗輸液管路

(A) 17.有關溫水坐浴（Warm Sitz Bath）常用溶液及其使用目的之敘述，下列何者錯誤？

A.1：8水溶性優碘（Beta-iodine），用於產後會陰部傷口之消毒

B.1：4,000高錳酸鉀（P.P. solution），用於肛門、會陰部傷口的消腫與抑菌

C.10～50%硫酸鎂（MgSO₄），用於痔瘡切除術後傷口，具有收斂作用

D.38～40℃之溫水，用於清潔及促進傷口癒合

(C) 18.有關冷療的應用，下列何者正確？ ①濕冷敷較乾冷的穿透力佳，對組織的傷害亦較小 ②冰袋及冰枕，不能直接用於皮膚 ③冰領適用於甲狀腺術後的止痛與止血 ④臨床上低溫毯用於心臟手術病人的目的是促進新陳代謝率

A.①② B.①③ C.②③ D.③④

- (A) 19. 有關臥姿與其目的之敘述，下列何者正確？
A. 採俯臥式可預防髖部關節攣縮
B. 採屈膝仰臥式可改善子宮後傾引起的經痛
C. 仰臥姿可用於接受痔瘡切除術病人
D. 採膝胸臥姿可促使下腹部感染局部化
- (C) 20. 有關灌腸的相關敘述，下列何者正確？
A. 保留灌腸溶液需在腸道內保留5~10分鐘
B. 保留灌腸常用於協助病人解除便秘
C. 麻醉劑可使用保留灌腸方式給與
D. 清潔灌腸是最常見的保留灌腸
- (D) 21. 有關尿液性質的敘述，下列何者錯誤？
A. 泌尿道感染病人尿液中的白血球可能高於正常值
B. 糖尿病病人的尿液中可能出現葡萄糖
C. 長期嘔吐者的尿液中可能出現酮體
D. 肝臟疾病者的尿液中可能出現圓柱體
- (B) 22. 下列何種設備，能有效協助呼吸困難的病人維持舒適姿勢？
A. 床上護架
B. 床上桌
C. 氣墊床
D. 蛋型床墊
- (A) 23. 肺癌合併胸椎、肋骨等多處骨頭轉移的病人，皮膚乾燥，因長期臥床導致足部靜脈栓塞。護理師協助病人沐浴與身體按摩，下列照護何者適當？
A. 以41~43℃溫水擦澡後，再塗擦乳液
B. 清潔四肢時，由近心端往遠心端擦拭
C. 沐浴後，協助背部叩擊增進舒適
D. 協助熱水足浴後，進行足部按摩
- (B) 24. 病人發燒時的護理措施，下列何者最不適當？
A. 每4小時或更密切的監測體溫
B. 協助調節室溫27~28℃
C. 增加水分攝取，至少3,000 mL/day
D. 給與口腔護理
- (C) 25. 關於影響呼吸頻率的因素，下列敘述何者錯誤？
A. 年齡越小，呼吸越快
B. 體溫下降，呼吸減慢
C. 血壓下降，呼吸減慢
D. 高海拔地區，呼吸越快
- (C) 26. 使用水銀血壓計測量成人血壓時，於數值140 mmHg時開始聽到輕敲聲，至130 mmHg時開始聽到更清脆更強的敲聲，至70 mmHg時轉為較低沉聲音，至56 mmHg時聲音消失，其血壓值紀錄，下列何者正確？
A. 140/70 mmHg
B. 130/70 mmHg
C. 140/56 mmHg
D. 130/56 mmHg
- (C) 27. 下咽癌病人行全咽喉切除術，併放射線療法後食道狹窄，下列何種方式最適合病人的

長期腸道營養支持？

A.由口進食 B.鼻胃管灌食 C.胃造口灌食 D.腸造口灌食

(D) 28.病人因車禍接受右側膝關節上方的截肢手術，下列何者最適用於術後殘肢包紮？

A.使用環形包紮法，再以8字形包紮法定帶
B.使用8字形包紮法，再以人字形包紮法定帶
C.使用緩螺旋包紮法，再以回反摺形包紮法定帶
D.使用回反摺形包紮法，再以環形包紮法定帶

(D) 29.病人左側肢體無力，有關協助病人坐入輪椅的敘述，下列何者正確？①下床前，需測量病人脈搏、呼吸，並視需要量血壓 ②將輪椅放在病人左側床尾，輪椅置於與床尾之間呈90度角處 ③護理師協助病人移動時，身體重心離病人越遠會越省力 ④教導病人要準備坐下輪椅前，先將身體微前傾，再緩慢彎曲膝關節，使重心下降

A.②③ B.②④ C.①② D.①④

(B) 30.有關壓力性損傷（壓瘡）形成因素的敘述，下列何者錯誤？

A.當壓力高於組織中血管的壓力時將阻礙血流供應，造成組織缺氧
B.相同的刺激，受壓面積越大對組織的傷害越大
C.長時間承受小的壓力比短時間承受大的壓力傷害還大
D.剪力是造成深層組織壓力性損傷（壓瘡）的重要因素

(B) 31.構成牙齒及骨骼的礦物質，除了鈣之外，主要成分還包括以下何者？①鋅 ②鉀 ③鎂 ④磷

A.①② B.③④ C.①④ D.②③

(C) 32.臺灣立法保障尊重自然死，下列有關「安寧緩和醫療條例」的敘述何者正確？

A.末期病人才可以簽署「預立安寧緩和醫療暨維生醫療抉擇意願書」
B.意識昏迷「無最近親屬者」（如單身無親者），轉介社工由轄區里長填具「不施行心肺復甦術同意書」
C.意願人得預立醫療委任代理人，並以書面載明，於其無法表達意願時，由代理人代為簽署意願書
D.意識昏迷者，有最近親屬代理簽署「不施行心肺復甦術同意書」，父母排序優先於配偶

(A) 33.有關臨終病人的護理措施，下列何者正確？①協助個案減少不適 ②病房環境應昏暗，以減少對眼睛的刺激 ③與個案說話要清楚、緩慢，以免增加其焦慮 ④避免個案使用止痛劑，預防成癮

A.①③ B.②④ C.②③ D.①④

(A) 34.護理人員執行遺體護理時，下列措施何者正確？

A.有鼻胃管者須先引流後再移除管路 B.如有假牙者，需在屍僵發生後再裝上 C.將病人遺體側臥以利口腔分泌液引流 D.用30℃的溫水擦拭病人遺體

(B) 35.以普通針具收集血液標本，進行常規檢查，下列敘述何者正確？①通常採動脈血進行血球計數的標本 ②若檢測血糖、膽固醇等病人須先禁食 ③針筒血液需沿著試管壁以45度角注入 ④血液注入試管內需快速用力搖動以能與抗凝劑相融合

A.①② B.②③ C.③④ D.①④

(B) 36.有關使命或任務之敘述，下列何者正確？

A.是做策略性規劃的最後步驟
B.應以顧客的需要為主要依據
C.應依據評鑑標準之要求訂定
D.為指引員工行為的基本準則

- (A) 37.彼得杜拉克 (Peter F. Drucker) 提出的目標管理，屬於下列何種管理模式？
A.參與式管理 B.權威式管理 C.放任式管理 D.民主式管理
- (D) 38.有關管理理論之敘述，下列何者正確？
A.修正管理理論和傳統管理理論主要差異在參與式決策和團體價值觀 B.行為科學學派著重人性化管理，以日本企業管理的Z理論最具代表性 C.管理程序學派重視全盤性經營管理，以戴明 (Deming) 為代表性人物 D.管理科學學派主張運用數學計量處理問題，所有效益都用數字來表示
- (D) 39.某地區醫院一年的總營業收入為1,000萬元，變動成本為600萬元，固定成本為400萬元，其損益平衡點為多少萬元？
A.200 B.400 C.600
D.1,000
- (D) 40.護理長於年度考核前一週，與平時工作表現良好且深獲肯定的護理師起爭執，故給予該名護理師較低的考評分數。此行為屬於下列何種績效考核問題？
A.寬厚錯誤 B.向日葵效應 C.膨脹壓力
D.觸角效應
- (C) 41.有關病人分類系統的實施原則，下列敘述何者最適當？
A.要確保資料的完整性，不宜設置稽核機制
B.考量臨床實務，不宜太重視分類量表的信效度
C.方便易操作，不可影響臨床護理照護時數
D.為強化效益，分類系統應採單一功能發展
- (B) 42.某護理之家員工共計100人，去年每位員工工作240天，有25人請假，共計請假60天，則該機構去年缺勤率為何？
A.0.10% B.0.25% C.1.00%
D.2.50%
- (A) 43.有關集權式組織的優點，下列敘述何者正確？
A.減少工作重複及成本 B.員工覺得自由受尊重 C.職權和職責階層完整 D.部門間容易相互溝通
- (B) 44.某病房以病人照護技術需求為工作分配原則，屬於下列何種護理照護模式？
A.成組護理
B.功能護理
C.綜合護理
D.個案護理
- (C) 45.有關護理師常見的人因性職業傷害，下列何者錯誤？
A.下肢血管靜脈曲張
B.背部扭拉傷 C.自律神經失調 D.椎間盤凸出
- (A) 46.對於工作意願低，工作能力也低的員工，下列何種管理策略最為適當？
A.移轉策略 B.激發策略 C.增強策略 D.發展策略
- (B) 47.有關資訊系統能提升護理效能的敘述，下列何者正確？① 使用條碼辨識病人，可減少給藥三讀五對流程 ②減少護理紀錄重複抄寫時間 ③增進護理管理效率 ④衛教資料資訊化，不用花費時間衛教
A.①② B.②③ C.③④
D.①④
- (C) 48.應用PDCA (Plan-Do-Check-Act) 於老人跌倒品質改善，下列何者正確？
A.Plan：依照事先想好的計畫執行老人跌倒預防措施 B.Do：擬定改善老人跌倒計畫及

執行預防措施 C.Check：查核跌倒評估的落實度及浴廁扶手使用率 D.Act：依照跌倒原因採取可行的行動方案

(C) 49.有關問題解決的原則，下列敘述何者正確？

- A.主管親自解決問題以縮短處理時間
- B.避免透過外部專家協助處理以免影響聲譽
- C.優先處理影響組織利益最大的問題
- D.主管須注意小細節以免問題再發生

(C) 50.因醫療處置結果不如預期而產生之醫療糾紛的處理原則，下列何者應優先？

- A.請醫院院長應立即出面道歉
- B.收集發生醫療不良結果之前例
- C.勇敢出來誠實面對病人或家屬
- D.說明任何醫療行為均可能有風險

高
點
醫
護

【版權所有，翻印必究】