

《內外科護理學》

- (D) 1. 有關巴金森氏症病人服用抗膽鹼激性製劑 trihexyphenidyl (Artane®) 之敘述，下列何者正確？
- A. 長期服用會出現姿位型低血壓
 - B. 副作用少見，偶有情緒改變和頭痛情形
 - C. 常與抗病毒製劑合併使用，可有效控制失眠和頭痛
 - D. 需要監測眼壓變化，預防青光眼
- (B) 2. 多發性硬化症病人之日常活動護理指導，下列敘述何者正確？
- A. 運動前給予溫熱敷會增加肌肉強直和關節攣縮
 - B. 避免在運動後洗熱水澡以免疾病惡化
 - C. 可以增加多次且密集的運動，防止肌肉無力和強直
 - D. 若疾病加重導致長期臥床，應避免執行全關節運動
- (B) 3. 有關頭部外傷相關合併症的敘述，下列何者正確？
- A. 封閉性比開放性頭部外傷更易產生癲癇後遺症
 - B. 創傷後症候群症狀可持續數個月到數年
 - C. 腦脊髓液瘻管是因腦脊髓液循環路徑阻塞或吸收有問題
 - D. 當頭部外傷損及視丘時，會引起抗利尿激素 (ADH) 分泌失調
- (A) 4. 有關癲癇 (epilepsy) 發作處置，下列敘述何者錯誤？
- A. 電腦斷層檢查可確定異常放電位置
 - B. 發作時，可將頭偏向一側以利唾液流出
 - C. 發作時，若病人意識不清，不須試圖喚醒病人
 - D. 驟然停藥為重積性癲癇常見的原因
- (B) 5. 有關左側大腦損傷可能引起的功能缺失症狀，下列敘述何者正確？ ①計算能力降低 ②空間缺損 ③半側忽略 ④語言障礙
- A. ①②
 - B. ①④
 - C. ②③
 - D. ③④
- (A) 6. 有關胃食道逆流症的護理指導，下列敘述何者錯誤？
- A. 進食後應立即平躺
 - B. 避免在睡前 2～3 小時進食
 - C. 少量多餐細嚼慢嚥
 - D. 肥胖的病人應減重
- (C) 7. 有關大腸癌的高危險因子，下列敘述何者正確？
- A. 常攝取蔬菜及高纖維質
 - B. 幽門螺旋桿菌感染
 - C. 有家族型腺瘤性息肉症病史
 - D. 胃酸分泌過多症
- (A) 8. 肝性腦病變的病人給與 Lactulose 的目的，下列何者正確？
- A. 酸化糞便以減少氨在腸道吸收
 - B. 抑制腸內細菌以減少氨的分解
 - C. 預防發生肝腎症候群
 - D. 減輕腹水的產生
- (C) 9. 有關胰臟炎急性發作及其治療的敘述，下列何者錯誤？

- A.上腹部中央疼痛或輻射到背部，疼痛為突發、持續且劇烈
 - B.血清澱粉酶（amylase）升高、脂肪酶（lipase）上升、血鈣下降
 - C.放置鼻胃管的目的是為抽出胰澱粉酶，以避免發炎加劇
 - D.當病情穩定可開始進食時，應採低脂肪、低蛋白、高醣飲食
- (B) 10.有關食道憩室的敘述，下列何者正確？
- A.常見胸口灼熱感症狀
 - B.可做鋇劑食道攝影確定位置
 - C.餐後平躺可減緩不適
 - D.一旦發生須儘速以手術治療
- (A) 11.有關痛風性關節炎護理指導之敘述，下列何者正確？
- A.避免服用Aspirin，以預防血中尿酸升高
 - B.採取高脂飲食，以促進尿酸鹽排出
 - C.多喝小紅莓汁，以預防尿酸結石產生
 - D.多攝取肉汁、海鮮，以促進嘌呤代謝
- (A) 12.有關肌肉骨骼系統身體檢查評估結果之敘述，下列何者正確？
- A.湯瑪斯試驗（Thomas test）陽性反應表示病人對側髖關節攣縮
 - B.浮動試驗（Ballottement test）陽性表示病人膝半月板有損傷
 - C.抽拉試驗（Drawer test）若能將小腿向後牽引6mm表示副韌帶鬆弛
 - D.廷內爾氏徵象（Tinel's sign）陽性反應表示後十字韌帶鬆弛
- (B) 13.有關骨質疏鬆症處置之敘述，下列何者正確？
- A.每日飯前服用碳酸鈣（calcium carbonate），以增加鈣吸收
 - B.鼓勵日曬及攝取維生素D，以促進鈣吸收
 - C.每日飯後服用雙磷酸鹽類（bisphosphonates），以減少骨流失
 - D.每天使用副甲狀腺素（teriparatide）鼻噴劑，以增加骨質量
- (C) 14.下列何者為充滿血管可以供應眼球及視網膜血液及營養的構造？
- A.鞏膜 B.角膜 C.脈絡膜 D.睫狀體
- (A) 15.有關扁桃腺炎（tonsilitis）病人接受扁桃腺切除術之敘述，下列何者錯誤？
- A.急性發炎期時應儘快安排手術
 - B.術前可用溫食鹽水漱口，減輕咽喉不適
 - C.疑似扁桃腺腫瘤是手術適應症
 - D.術後有持續吞嚥動作時，可能為傷口出血的現象
- (C) 16.進行心臟復健時如出現活動耐力不足時應停止，下列何者不是其判斷依據？
- A.心律不整或心跳上升或下降超過20次／分鐘以上
 - B.血壓上升或下降超過20 mmHg以上
 - C.體溫大於37°C
 - D.出現胸悶、胸痛、眩暈、盜汗、虛弱、疲倦
- (D) 17.有關裝置永久性心臟節律器病人居家護理指導之敘述，下列何者錯誤？
- A.每天需測量橈動脈1分鐘
 - B.住家頂樓避免裝設手機基地台
 - C.可使用微波爐，但應保持安全距離
 - D.持續打嗝時，可做伐式操作法（Valsalva）緩解
- (D) 18.有關心衰竭之敘述，下列何者正確？
- A.右心衰竭會出現心搏過速、心室肥大、第三心音
 - B.右心衰竭常出現乾咳或帶有泡沫及血絲痰

- C.左心衰竭早期徵象是下肢水腫、頸靜脈怒張、腹水
D.左心衰竭常見症狀為呼吸困難、端坐呼吸
- (C) 19.有關急性心肌梗塞引起的心因性休克給予的藥物處置，下列敘述何者錯誤？
A.Dobutamine滴注可以增加心肌收縮力及心輸出量
B.利尿劑主要目的為降低心臟前負荷
C.嗎啡主要是緩解疼痛，對心臟前、後負荷沒有影響
D.血管擴張劑nitroglycerin (NTG) 滴注可以擴張周邊血管而減輕心臟負荷
- (A) 20.有關靜脈剝除結紮手術 (stripping and ligation) 術後照護之敘述，下列何者錯誤？
A.術後臥床期間避免於床上進行全範圍關節運動
B.抬高床尾15度，膝部不彎曲
C.術後下床時均應穿彈性襪
D.應監測末梢血循環變化及是否有感覺異常
- (C) 21.正在接受體外放射線治療的癌症病人表示：「臉和頸部的皮膚發紅刺痛、脫屑，甚至有些部位會濕濕的，很不舒服」，下列處置何者正確？
A.清水洗淨後塗擦凡士林保濕
B.可局部溫濕敷以緩解不適症狀
C.0.9% N/S沖洗後以親水敷料 (DuoDerm) 覆蓋
D.刮鬍子時用刮鬍膏潤滑刮鬍刀以免刮傷
- (C) 22.顆粒性白血球低下的癌症病人之食物選擇，下列何者最適切？
A.溏心蛋：補充單白質
B.泡菜：補充纖維質防便秘
C.柑橘：補充維生素C
D.優格：補充鈣質、維生素
- (D) 23.中樞神經系統癌症病人，若選用難以通過血腦障壁之化學治療時，下列何者為最適切之給藥途徑？①Port-A ②Ommaya reservoir ③Hickman catheter ④intrathecal injection
A.①③ B.①④ C.②③ D.②④
- (B) 24.為一位乳癌骨轉移合併脊髓壓迫的病人進行身體評估時，下列症狀或徵象何者最不常出現？
A.背部疼痛指數7分 (滿分10分)
B.布魯辛斯基氏徵象 (Brudzinski's sign) 陽性
C.大小便失禁情形
D.巴賓斯基氏徵象 (Babinski's sign) 陽性
- (A) 25.下列何者接受自體移植治療後的5年存活率最高？
A.急性骨髓性白血病第一次完全緩解後接受自體骨髓移植
B.急性骨髓性白血病第一次完全緩解後接受自體周邊血液幹細胞移植
C.急性淋巴性白血病第一次完全緩解後接受自體骨髓移植
D.急性淋巴性白血病第一次完全緩解後接受自體周邊血液幹細胞移植
- (D) 26.有關致癌因子及其相關癌症的敘述，下列何者需進一步提供護理指導以澄清誤解？
A.「我看你還是少吃點檳榔吧，不然口腔癌可能會找上你喔」
B.「平時喝酒適量即可，過量可能會導致肝癌、乳癌、食道癌的發生」
C.「我老公平時是油漆工，聽說長時間接觸那些苯胺染料，可能和膀胱癌的發生有關」
D.「上次我去看醫師，他跟我說我有幽門螺旋桿菌，可能和食道癌的發生有關」
- (D) 27.有關帶狀疱疹臨床症狀之敘述，下列何者正確？
A.帶狀小水疱群聚常會環繞軀幹一圈

- B.最常發生在頭頸部
C.口腔有乳白色的斑塊
D.淋巴腺腫與水疱同時發生、同時消失
- (B) 28.有關皮膚腫瘤之敘述，下列何者正確？
A.表皮囊腫（epidermal cysts）是一種惡性腫瘤，通常包裹著乳白色的粉狀物質
B.脂漏性角化症（seborrheic keratoses）是一種良性的表皮角質過度增生
C.纖維瘤（fibroma）是一種脂肪細胞常見的腫瘤
D.蜘蛛狀血管瘤（spider hemangioma）與血液中黃體激素升高有關
- (C) 29.林先生因熱燒傷接受植皮手術，有關術後注意事項之敘述，下列何者正確？
A.供皮區應使用石膏夾板固定至少3～7天
B.術後應鼓勵病人移植部位多接受日照
C.肩部燒傷應使病人採俯臥，手臂位置遠離身體
D.膝蓋受傷部位應採屈曲姿位，膝下墊一枕頭
- (D) 30.有關後天免疫缺乏症候群（AIDS）臨床表徵之敘述，下列何者錯誤？
A.急性HIV感染可能出現類感冒症狀如淋巴腺腫大、發燒、肌肉關節疼痛
B.臨床潛伏期可能持續10年或更長時間
C.卡波西氏肉瘤是愛滋病人最常見的惡性腫瘤
D.愛滋病人可能出現口腔紅斑症
- (C) 31.為降低排斥反應，下列何者為器官移植前進行組織配對的常見檢驗？①C型肝炎檢驗
②人類白血球抗原（HLA）③混和性淋巴細胞反應④交叉配對試驗⑤人類免疫缺乏病毒（HIV）篩檢
A.①②③ B.①④⑤ C.②③④ D.③④⑤
- (A) 32.病人因車禍送到急診，身體評估出現下列何者時，應懷疑可能有氣胸？
A.一側聽不到呼吸音或呼吸音減弱
B.二側肺葉有喘鳴音
C.二側肺葉於吸氣時聽到囉音
D.一側肺葉叩診出現濁音
- (D) 33.有關急性呼吸窘迫症候群（ARDS）之敘述，下列何者正確？
A.因為外分泌腺分泌異常，而導致黏液聚集在肺泡中
B.因為肺部疾病，而引起右心肥大與肥厚
C.因為肋膜腔內積聚空氣，而導致肺部塌陷
D.因為肺泡微血管膜的通透性受損，而產生肺水腫
- (A) 34.下列何者不屬於動脈血液氣體分析（arterial blood gas analysis）可以直接偵測之項目？
A.呼吸困難
B.酸鹼度
C.重碳酸鹽含量
D.血氧飽和度
- (D) 35.下列何種給氧方式能提供最高的氧氣吸入濃度（FiO₂）？
A.卞德里面罩 B.單純型面罩 C.氧氣鼻套管 D.非再吸入面罩
- (A) 36.有關肺膿瘍病人的護理評估，下列何者最可能出現？
A.呼吸音減弱有時會出現肋膜摩擦音
B.叩診出現鼓音
C.上肺葉吸氣期出現喘鳴音
D.叩診出現過度反響音

- (A) 37.有關高血鉀導因之敘述，下列何者正確？①使用血管收縮素轉換酶抑制劑 ②使用醛固酮拮抗劑③使用噻嗪類利尿劑（thiazide diuretics） ④代謝性鹼中毒
A.①② B.①④ C.②③ D.③④
- (C) 38.尿液分析中出現紅血球的病因，下列何者錯誤？
A.輸尿管結石 B.前列腺肥大 C.子癲前症 D.尿路感染
- (C) 39.陳先生，88歲，因全身水腫，呼吸喘至急診求治，診斷為急性腎衰竭，下列敘述何者正確？
A.血鉀7.5 mg/dL，心電圖T波低而寬長
B.可能因前列腺肥大，導致腎性急性腎衰竭
C.24小時尿量約300 c.c.，正處於腎衰竭少尿期
D.腎臟超音波檢查，顯示雙側腎臟大小為7.5 cm
- (A) 40.有關腎臟功能檢測血清肌酸酐（creatinine）之敘述，下列何者錯誤？
A.易受飲食影響可用以估算排泄能力
B.是用來估算腎臟功能最佳指標
C.升高時代表腎功能已損傷50%以上
D.升高時代表腎絲球過濾率功能已降低
- (D) 41.有關預防泌尿道感染復發的護理指導，下列何者錯誤？
A.減少不必要的導尿管留置 B.排便後，應由前往後擦拭 C.洗澡避免盆浴，儘量採淋浴
D.症狀減輕沒發燒就可以停藥
- (B) 42.有關糖尿病酮酸中毒（DKA）之處置，下列何者正確？①建立靜脈輸液，由低劑量胰島素開始給與②最初2小時，給與0.45%生理食鹽水維持電解質平衡 ③等尿液排出量恢復正常，應補充鉀離子④血液pH值>7.1時，則與以重碳酸鈉（NaHCO₃）
A.①② B.①③ C.②④ D.③④
- (B) 43.有關服用治療甲狀腺機能亢進之放射性碘（¹³¹I）的敘述，下列何者正確？
A.食物會延遲放射性碘（¹³¹I）吸收，服用前一天午夜後及服用後2小時應禁食，以利吸收
B.服用治療劑量於8~30 μ Ci 的病人應限制訪客，第一週最好單獨睡，避免接觸孕婦
C.服用一個星期後會經由尿液、糞便排出，這段時間在使用馬桶後，宜沖水2~3次
D.服用高劑量者10年後易出現甲狀腺功能亢進，故需定期追蹤血清T3是否上升
- (A) 44.有關肢端肥大症之症狀，下列何者錯誤？
A.泌尿系統：低血鈣症、腎結石 B.骨骼系統：關節痛、肌肉無力 C.神經系統：腕隧道症候群、嗜睡 D.皮膚系統：皮膚增厚、油脂增多
- (B) 45.有關尿崩症病人之護理處置，下列何者錯誤？
A.應鼓勵病人多喝開水，以維持水分和體液電解質的平衡
B.噴灑鼻噴劑型desmopressin時，教導病人應吸氣以增加藥效
C.腎因性尿崩症應給與Thiazide利尿劑及限鹽攝取，以緩解症狀
D.Vasopressin Tannate是油性懸浮液，抽藥前需先溫熱與搖勻
- (D) 46.有關糖尿病足病人運動時鞋襪選擇之建議，下列何者錯誤？
A.鞋頭要寬，可讓腳趾自由伸展
B.穿鞋前要先檢查鞋內有無異物
C.襪子選擇棉質易吸汗為佳
D.運動時需穿鞋保護雙足，偶爾不穿襪沒關係
- (B) 47.有關2020年美國心臟醫學會（American Heart Association, AHA）公告準則，啟動院內心臟停止（IHCA）生命之鏈（chain of survival）的次序，下列何者正確？①提供

高品質心肺復甦 ②去顫 ③早期監測與預防 ④心臟驟停後照護 ⑤復原 ⑥啟動緊急應變系統

- A. ①→②→③→⑥→⑤→④
 B. ③→⑥→①→②→④→⑤
 C. ⑥→①→③→②→④→⑤
 D. ⑥→②→③→①→⑤→④

(A) 48.72歲男性，有心臟病病史，夏天逛露天賣場時不明原因昏倒，臉色潮紅，皮膚乾熱，呼吸24次／分，脈搏強而快，體溫41.5℃，下列何者為其最可能診斷？

- A.熱中暑（heat stroke）
 B.熱性痙攣（heat cramp）
 C.熱衰竭（heat exhaustion）
 D.熱暈厥（heat syncope）

(C) 49.有關輸血品項與適應症之敘述，下列何者錯誤？

- A.血小板濃厚液適用於治療血小板減少症
 B.2單位紅血球濃厚液適用於提高成年人血色素約1～1.2 gm/dL
 C.全血適用於過敏性休克病人
 D.新鮮冷凍血漿適用於發生瀰漫性血管內凝血之病人

(D) 50.有關登革熱的敘述，下列何者正確？

- A.臉部出現不痛不癢的紅斑
 B.病毒從呼吸道檢體分離是確診的主要依據
 C.為第三類法定傳染病
 D.馬鞍狀發燒，發燒3天後體溫下降1～2天後，又再度發燒

【版權所有，翻印必究】