《內外科護理學》

(D) 1.張先生發生嚴重車禍，重創C6～T2，目前處於急性脊髓損傷休克期，有關此期依醫囑的護理措施，下列敘述何者錯誤？
A.立即為病人插上存留導尿管協助排尿
B.使用輕瀉劑排空腸道
C.協助病人穿上彈性襪
D.病人易出現陣發性高血壓

(B) 2.有關阿茲海默氏症的護理措施，下列敘述何者正確？①教導病人隨身配戴識別卡 ②協助晚期能行走的病人使用導尿管，以解決尿失禁的問題 ③鼓勵病人在安全的環境下完成日常生活活動 ④運用小抄和不同顏色的標記協助病人增強其定向感 ⑤中後期病人因為夜間活動增加，為了保有體力，建議白天能有長時間睡眠
A.①②⑤
B.①③④
C.②③④
D.③④⑤

(D) 3.多發性硬化症之臨床表徵，下列敘述何者正確？①肌腱反射消失 ②四肢無力、運動失調 ③尿急或頻尿 ④出現感覺異常和疼痛，但不影響震動感 ⑤有發音困難、說話模糊不清的問題
A.①②③
B.①④⑤
C.②③④
D.②③⑤

(C) 4.接受內視鏡逆行性膽胰攝影檢查前後護理，下列敘述何者錯誤？
A.教導病人在檢查前禁食6～8 小時
B.檢查後須等嘔吐反射恢復才能喝開水與進食
C.檢查前1～2 天須先安排消化道鋇劑攝影
D.若病人有接受取石術等治療須等候醫師指示才能進食

(C) 5.有關十二指腸潰瘍的敘述，下列何者正確？
A.胃酸分泌量正常或減少
B.疼痛部位常見於左上腹部
C.飢餓時疼痛，進食後緩解
D.嘔血比解黑便常見

(C) 6.引發肝硬化腹水之原因，下列敘述何者錯誤？
A.血管內膠體滲透壓減少
B.肝門靜脈壓太高
C.雄性素分泌減少
D.留鹽激素（醛固酮）過多

(A) 7.有關膽結石與膽道感染病人，下列敘述何者錯誤？
A.膽結石所引起的疼痛有時會輻射到左肩的情形
B.併發膽囊炎時可能會出現墨菲氏徵象（Murphy's sign）
C.結石可能與膽汁中膽固醇成分過度飽和有關
D.膽汁排到腸道受阻時會解茶色尿及灰白便

(D) 8.有關急性胰臟炎病人澱粉酶（amylase）、胰脂酶（lipase）、血清鈣三者之檢驗結果，下列何者正確？
A.澱粉酶降低、胰脂酶降低、血清鈣升高
B.澱粉酶升高、胰脂酶降低、血清鈣升高
C.澱粉酶降低、胰脂酶升高、血清鈣降低
D.澱粉酶升高、胰脂酶升高、血清鈣降低

高點醫護【版權所有，翻印必究】

(A) 9.有關急性運動傷害的處置，下列敘述何者錯誤？
A.扭傷應立即按摩，以預防損傷範圍擴大
B.維持患肢抬高至心臟上方，以促進血液回流
C.拉傷部位可用彈繃固定，以促進癒合
D.適度的負載運動，恢復的效果比較好

(D) 10.有關扁桃腺炎（tonsilitis）的敘述，下列何者錯誤？
A.抗生素需使用到症狀消退後48～72 小時才可停止
B.最常見的致病原為鏈球菌
C.炎症侵犯耳咽管時會有耳鳴、聽力減退的症狀
D.術後可立刻進食流質飲食

(A) 11.王先生55 歲，有氣喘病史與高血壓家族史，因工作關係經常應酬、抽菸飲酒、暴飲暴食、肥胖。此次因頭痛、血壓170/120 mmHg 至醫院就醫，經診斷為高血壓。依序回答下列3 題。有關王先生高血壓疾病與治療方式，下列敘述何者錯誤？
A.因有高血壓家族史，推測其高血壓應為續發性高血壓
B.經常應酬，推論其高血壓可能因肥胖、抽菸飲酒、飲食不當導致
C.其高血壓可能演變為惡性高血壓，會造成心臟後負荷增加
D.其高血壓治療方式應包含非藥物之生活型態調整

(C)12.有關王先生的護理指導，下列敘述何者正確？①為減少酒精之攝取，應酬時建議以啤酒代替烈酒 ②為減少鈉攝取，建議以天然辛香料取代鹽、醬油、沙茶醬等調味 ③減重，維持身體質量指數（BMI）於正常範圍 ④規律的等長運動增加心肺耐力
A.①③
B.①④
C.②③
D.②④

(D) 13.下列何類藥物不宜作為王先生控制血壓的藥物？
A.amlodipine（Norvasc®）
B.furosemide（Lasix®）
C.prazosin（Minipress®）
D.propranolol（Inderal®）

(B) 14.劉姓專櫃銷售人員，經醫生診斷有下肢深部靜脈栓塞的問題，下列護理指導何者正確？
A.為促進血液循環，可以多按摩下肢
B.為促進血液回流，可抬高患肢
C.為避免下肢壓力增加，不宜穿彈性襪
D.為促進下肢活動，坐姿可雙腳交叉

(C) 15.下列何者是 doxorubicin（Adriamycin®）最適切的給藥途徑？
A.口服
B.Ommaya
C.Port-A
D.皮下注射

(C) 16.有關癌症放射線治療，下列敘述何者錯誤？
A.分裂生長快速或含氧高的癌細胞對放射線治療較敏感
B.體內非封閉式照射者，尿液具大量輻射性，須排於馬桶冲水至少2 次
C.與接受體內放射線治療病人的距離，若由1 呎拉長為3 呎，則輻射暴露量能減少至1/3
D.體外放射線治療完畢後，身體及分泌物即不具輻射性

(D) 17.癌症病人注射Filgrastim（G-CSF）之主要目的，下列敘述何者正確？
A.刺激嗜酸性白血球生成
B.刺激淋巴球生成

高點醫護 版權所有，翻印必究

C.刺激紅血球生成
D.刺激嗜中性白血球生成

(D) 18.王小花，接受異體骨髓移植後出現腹痛及腸阻塞，抽血膽紅素為20 mg/dL，醫師診斷為移植物對抗宿主疾病（graft-versus-host disease, GVHD），下列何者為病人GVHD 之分級？
A. Ⅰ
B. Ⅱ
C. Ⅲ
D. Ⅳ

(D) 19.有關蕁麻疹的敘述，下列何者正確？
A.由T 淋巴球引發的過敏反應，促使肥大細胞釋放組織胺
B.大量血清蛋白由血管進入角質層，形成平坦的紅斑塊
C.風疹塊從出現到消退，持續時間會超過72 小時
D.嚴重者可能引發喉頭水腫及休克

(B) 20.李小姐臉部及雙手有燒傷傷口，換藥前常覺得焦慮不安、沉默、拒絕談話、甚至對家屬發脾氣，下列護理措施何者最適宜？
A.換藥打開傷口敷料時立即給予止痛劑
B.換藥前向病人說明換藥方式及流程
C.換藥時向病人保證換藥技術精良
D.跟病人勸說照顧家屬的辛苦，勿發脾氣

(C) 21.有關類風濕性關節炎護理措施，下列敘述何者錯誤？
A.關節在保持休息狀態時，可採取等長運動維持肌肉強度
B.僵硬的關節可以採用溫水盆浴，以協助活動的進行
C.急性期疼痛發作時，可加強熱敷與關節按摩
D.應依病人耐受性規劃活動，須避免關節過度負荷

(B) 22.照護一位有胸管的氣胸病人時，下列敘述的狀況，何者最需優先處置？
A.水封瓶中有間歇性氣泡
B.病人有輕微的氣管偏向右側
C.病人吸氣和呼氣時水封瓶內液面上下波動
D.病人主訴胸管插入部位有壓痛感

(A) 23.下列何者為發生肺栓塞的高危險群？①右腳踝處有大範圍靜脈鬱積性潰瘍的病人 ②髖骨骨折等待手術的病人 ③有肋膜積液的肺癌病人 ④肩部手術後接受氧氣治療的病人
A.①②
B.①④
C.②③
D.③④

(D) 24.黃小姐此次住院胸部X 光顯示肺部無異常，結核菌素皮膚試驗為陽性反應，但上次試驗結果為陰性反應。下列情況的敘述，何者是最可能的解釋？
A.過去未曾感染肺結核菌
B.肺結核病已治療成功，皮膚試驗仍然保持陽性反應
C.結核菌已進入血液循環
D.自上次試驗後，可能感染過結核菌

(C) 25.有關膀胱癌，下列敘述何者正確？
A.常見於膀胱三角部位，以鱗狀細胞癌最多
B.長期暴露於染劑為其導因，且好發於女性
C.出現無痛性血尿時，膀胱鏡是主要的診斷方式
D.主要轉移以骨骼居多，尤其腰椎部位

(B) 26.有關高血容積性低血鈉，下列敘述何者正確？①出現血壓上升 ②使用排鈉性利尿劑所致 ③腸道引流過多所

【版權所有，翻印必究】

致 ④出現脈搏強而飽滿

A.①②

B.①④

C.②③

D.③④

(B) 27.有關慢性腎臟病飲食限制，下列敘述何者錯誤？

A.限鈉飲食是避免水腫、高血壓

B.低蛋白飲食是避免熱量不足

C.飲水量控制是避免水分滯留體內

D.低鉀攝取是避免心律不整或心跳停止

(C) 28.尿液中的何種成分可以用來協助診斷病人是否罹患嗜鉻細胞瘤？

A.尿白蛋白（urinary albumin）

B.糖皮質素（glucocorticoid）

C.香草扁桃酸（VMA）

D.促腎上腺皮質素（ACTH）

(B) 29.有關經蝶骨切除腦下垂體腫瘤術後病人護理措施，下列敘述何者錯誤？

A.若病人有持續性吞嚥動作與嚴重頭痛，要特別注意有無腦脊髓液外漏的情形

B.要教導病人擤鼻，並提醒手術後2 個月內要將鼻涕擤乾淨，以利清除呼吸道分泌物

C.若有流鼻水現象，可用尿糖試紙測試分泌物，若呈陽性反應，則可能有腦脊髓液外漏

D.要密切觀察病人有無多尿、口渴、體重減輕等現象

(A) 30.林先生35 歲，罹患第1 型糖尿病30 年，下午4 點開始發抖、冒汗，但意識清楚，造成上述症狀最可能的原因是下列何者？

A.早餐前注射胰島素（NPH）量過多

B.食量增加但運動時間減少

C.近日被診斷上呼吸道感染

D.晚餐前注射胰島素（RI）量過少

(D) 31.有關黏液水腫昏迷之敘述，下列何者正確？①為甲狀腺機能亢進的嚴重合併症 ②常發生於年輕女性 ③誘發因素有腸胃道出血、酗酒及暴露在寒冷環境 ④有低體溫、低血糖、低血鈉、高膽固醇血症 ⑤出現皮膚乾燥脫屑、性慾降低 ⑥以抗甲狀腺藥物及腎上腺皮質固酮治療

A.①②④

B.①⑤⑥

C.②③⑥

D.③④⑤

(C) 32.有關急救時，通暢呼吸道及人工呼吸的方法，下列敘述何者正確？

A.對車禍彈出車外的頭部外傷病人採壓額抬下巴法

B.頭部及面部外傷的病人應使用鼻咽人工氣道

C.使用口咽人工氣道太短會造成舌頭往後推擠

D.喉罩式呼吸道固定氣囊的適當壓力約為100 cmH2O

(B) 33.下列何者為一氧化碳中毒之症狀？

A.心跳及呼吸減緩

B.頭暈或暈厥

C.四肢水腫

D.皮膚紅疹

(A) 34.有關諾羅病毒腸胃炎的預防及照護措施，下列敘述何者錯誤？

A.抵抗力低下者可接種疫苗以預防感染

B.主要症狀為嘔吐及腹瀉，症狀一般持續2～3 天

C.確診後應居家休息，避免接觸健康的嬰幼兒與老人

【版權所有，翻印必究】

D.症狀消除後2 天才能幫家人準備餐食

(A) 35.巴金森氏症病人居家照護的護理指導，下列敘述何者正確？

A.走路時雙腳分開，腳跟先著地

B.選擇開前襟，有整排鈕扣的衣服

C.立姿轉為坐姿困難，宜調低馬桶座位

D.易產生腹瀉問題，須減少纖維性食物

(D) 36.下肢骨折病人且接受長腿石膏固定的護理指導，下列敘述何者正確？

A.維持下肢低於心臟以免影響固定效果

B.可用吹風機吹熱風於石膏內以減輕皮膚搔癢

C.下肢蒼白冰冷但無疼痛感可繼續觀察

D.可調整石膏邊緣使其稍微向外避免磨擦皮膚

(C) 37.白內障摘除術後病人的自我照護，下列敘述何者錯誤？

A.睡覺時應躺向健側

B.出門應戴太陽眼鏡

C.術後2 週可以用力擤鼻涕

D.術後眼睛嚴重疼痛應立即就醫

(A) 38.心絞痛病人舌下含服硝酸甘油（Nitroglycerin）的用藥指導，下列敘述何者正確？

A.服用時應採坐姿或臥姿，避免跌倒

B.服用後若感覺舌尖出現麻辣感，表示藥物已經變質

C.疼痛發生後服用一片若未改善，應立即就醫

D.應放在透明的瓶子內，隨身攜帶於口袋中

(D) 39.有關甲狀腺功能亢進的護理措施，下列敘述何者正確？

A.飽和碘化鉀溶液於空腹或飯前以吸管服用

B.鼓勵眼睛向上凝視，以維持肌力避免凸眼

C.鼓勵多攝取高纖維蔬果，補充必須營養素

D.每日體重減少2kg 以上，應報告醫師

(C) 40.有關出血性腦中風病人顱內壓照護之注意事項，下列敘述何者正確？

A.床頭放低，讓病人平躺以增加腦部灌流

B.執行抽痰或翻身移位等護理措施，最好集中執行，可減少誘發顱內壓上升

C.便秘需儘快處置，避免促使顱內壓上升

D.使用Mannitol 時，須注意水腫之合併症

(B) 41.美尼爾氏症（Meniere's disease）病人因眩暈急性發作的護理措施，下列敘述何者正確？

A.告知手術是主要治療方式

B.鼓勵閉上眼睛、臥床休息

C.補充鈉離子攝取，以維持體液平衡

D.建議做促進外耳淋巴液回流的活動

(C) 42.改良式乳房根除術後的護理指導，下列敘述何者正確？

A.傷口完全癒合後才可開始運動

B.每8 小時引流液150 mL 為正常現象

C.患側上肢若有腫脹，可使用彈性繃帶促進回流

D.採取平躺或躺向患側以促進傷口引流

(B) 43.乳癌病人接受化學治療前，抽血檢查結果：WBC 2,300/mm3、Seg 40%、Lymphocyte 40%、Monocyte 7%、Eosinophil 1%、Band 3%、Basophil 1%，以下敘述何者正確？

A.ANC 為230/mm3，不可以接受化學治療

B.ANC 為989/mm3，不可以接受化學治療

C.ANC 為1,840/mm3，可以接受化學治療

D.ANC 為2,070/mm3，可以接受化學治療

高點醫護【版權所有，翻印必究】

(C) 44.帶狀疱疹病人的臨床表徵，下列敘述何者正確？
A.痊癒過程約需6 至12 個月
B.全身皮膚出現紅疹與水疱
C.淋巴腺腫和水疱同時發生與消退
D.發作就出現皮膚問題，沒有前驅症狀

(B) 45.為病人抽血不慎被使用過的針頭扎傷手指，同時衣服沾到檢體的血液，病人拒絕愛滋檢驗，有關全面性防護措施，下列敘述何者正確？
A.避免擠壓傷口，由傷口側靜脈抽血送檢
B.沾血衣物以漂白水浸泡30 分鐘後再清洗
C.暴露愛滋病毒96 小時後進行預防性投藥
D.定期接受愛滋檢驗，持續追蹤4 週結案

(A) 46.氣切造口病人抽痰前的護理措施，下列敘述何者最適當？
A.給予高濃度氧氣30～60 秒
B.更換氣切固定帶與無菌Y 紗
C.取出內管以3%雙氧水溶解黏液
D.先進行口鼻部抽吸

(D) 47.慢性阻塞性肺部疾病（COPD）病人急性惡化的感染症狀與徵象，下列敘述何者錯誤？
A.痰量明顯增加且呈黃綠色膿性痰
B.穿脫衣服感覺到呼吸困難
C.動脈二氧化碳分壓55 mmHg、酸鹼值7.30
D.血色素及血比容下降

(A) 48.急性腎絲球腎炎病人，出現眼瞼及下肢水腫、血尿與蛋白尿、每日尿總量250 c.c.，血壓148/92 mmHg，血液BUN 42mg/dL、creatinine 1.9mg/dL。下列護理措施何者正確？
A.安排靜態活動，並充分臥床休息
B.採高蛋白飲食，以補充尿液流失的蛋白質
C.鼓勵進食高鉀食物，以促進鈉、水的排除
D.限水1,500 c.c./天，避免水腫並製造足量尿液

(A) 49.有關預防草酸鈣與磷酸鈣混合腎結石復發的護理指導，下列敘述何者正確？
A.避免大量攝取維生素C，並減少高鈣食物攝取
B.每日飲用小紅莓汁，以酸化尿液並減少尿鈣形成
C.延長平躺休息時間，養成每4 小時排尿一次的習慣
D.增加維生素D 及深綠色蔬菜攝取，以降低尿中草酸濃度

(B) 50.下列那些徵象表示休克病人的低血壓已改善？
A.每小時尿量15 mL
B.無使用升壓劑收縮壓95 mmHg
C.中心靜脈壓2～3 cmH2O
D.血液pH 值7.10

高點醫護【版權所有，翻印必究】