《產兒科護理學》

(B) 1.有關以家庭為中心的產科護理，下列敘述何者最適當？
A.產婦必須於樂得兒（LDR）進行待產、分娩及產後恢復
B.協助母親及其家庭成員參與新生兒孕育與出生歷程
C.鼓勵父親參與配偶分娩，性別平等工作法之5 天陪產檢及陪產假，須於分娩前請完
D.要求每位母親產後即刻進行母嬰肌膚接觸

(B) 2.李女士，G1P0，產檢無特殊狀況，有關其妊娠期婦女之健康照護，下列敘述何者正確？
A.洗澡時應採盆浴，促進舒適及代謝
B.避免飲酒而影響胎兒腦部細胞生長
C.避免旅遊，以免過度疲倦引發不適
D.避免有性行為，以減少早產的發生

(A) 3.李女士於妊娠12 週時測B 型肝炎表面抗原（HBsAg）為陽性，依衛生福利部國民健康署孕婦健康手冊的建議，下列護理指導何者錯誤？
A.孕婦施打B 型肝炎疫苗使胎兒獲得被動免疫
B.新生兒出生後24 小時內施打B 型肝炎免疫球蛋白（HBIG）
C.新生兒出生後24 小時內施打B 型肝炎疫苗第一劑
D.出生滿12 個月時，幫嬰兒檢驗B 肝表面抗原及抗體

(C) 4.對於低風險孕婦妊娠早期（8～16 週）的超音波檢查，通常不包括下列那項評估？
A.胎兒數量
B.胎兒大小
C.胎盤位置
D.預產期

(A) 5.有關胎盤的組成與功能，下列敘述何者正確？
A.絨毛間腔（intervillous space）能進行母體與胎兒血液交換
B.胎盤母體面是由絨毛膜板（chorionic plate）所形成
C.隨著胎盤的成熟，胎盤障壁（placental barrier）會逐漸增厚
D.細胞滋養層（cytotrophoblast）負責孕期胎盤荷爾蒙分泌

(D) 6.懷孕婦女應避開攝取重金屬含量較高的魚類，下列建議何者正確？
A.吃鮭魚肉，但不要攝取鮭魚卵
B.可吃旗魚肉或旗魚製品
C.可吃肉食性魚類，例如鯊魚或油魚等
D.可吃小型魚，如鯖魚或鱸魚等

(D) 7.有關 Bishop 計分法之敘述，下列那些正確？ ①計分項目包括子宮頸的擴張、變薄、位置、堅硬度及胎頭下降高度 ②計分項目包括羊水量、胎動頻率、胎兒心跳變異性、胎兒呼吸運動、胎兒身體張力 ③常用於評估引產成功率 ④分數越高代表胎兒成熟度越高，妊娠週數越大會接近生產
A.①④
B.②③
C.②④
D.①③

(A) 8.王女士，G1P0，懷孕41 週。目前子宮頸口擴張9 公分，胎兒高度為+1，主訴：「我現在痛起來，會有想上大號的感覺。」正常情況下，此時其胎心率最有可能出現下列那種現象？
A.早期減速
B.晚期減速
C.變異性減速
D.變異性變小

(D) 9.有關胎兒娩出的過程，當右枕前位（ROA）的胎兒已完成外回轉（external rotation）。正常情況下預期的娩出機轉，下列敘述何者正確？
A.胎頭向右轉45°復位，使左肩位於恥骨聯合下方
B.胎頭向左轉45°復位，使右肩位於恥骨聯合下方
C.右肩先娩出，左肩再娩出
D.左肩先娩出，右肩再娩出

(B) 10.有關陪產員（doula）角色功能，下列敘述何者錯誤？
A.利用呼吸法、冥想等協助待產婦度過生產階段
B.協助胎心音監測，提供給待產婦參考
C.提供心理及情緒支持，幫助生產過程順利進行
D.擔任與待產婦、伴侶及醫護人員之溝通橋梁

(D) 11.有關腰椎硬膜外麻醉之敘述，下列何者錯誤？

高點 版權所有，翻印必究

A.麻醉後須監測生命徵象及胎心音
B.麻醉後若有低血壓應採左側臥並給與快速輸液
C.麻醉後易噁心、嘔吐及搔癢
D.適用於產前出血及凝血機能異常者

(D) 12.張女士，陰道生產後一週，主訴全身發熱不舒服，耳溫37.8℃，但身體其他部位沒有明顯疼痛情況。若是發熱不適症狀與乳房或哺乳有關，下列何者為最可能的評估結果？
A.乳房觸診和懷孕前相仿，但有乳汁滴出來
B.乳房觸診如水囊狀沉重飽脹，乳汁會滴出來
C.乳房局部發紅，有膿樣液體感，可以擠出濃稠乳汁
D.兩側乳房腫脹，上緣明顯可見，觸感堅實，乳汁不易流出來

(B) 13.吳女士，陰道生產娩出4,300 公克之男嬰，會陰四度裂傷，輕微內痔，每日水分攝取2,500 c.c.，下列何者是導致其便秘的最可能原因？
A.每日水分攝取不足
B.會陰四度裂傷
C.輕微內痔
D.腹壓增加

(B) 14.有關子宮內避孕器（intrauterine devices）的敘述，下列何者正確？
A.使子宮內膜產生增生反應，干擾受精卵著床
B.教導婦女以手指伸入陰道確認尾線是否存在
C.建議每2 年更換避孕器
D.裝置後出現骨盆腔疼痛是正常現象

(D) 15.有關餵奶後的嬰兒排氣之敘述，下列何者正確？
A.將嬰兒俯趴在一手前臂上，頭低腳高，另一手輕拍嬰兒背部
B.餵配方奶時不要中斷，以免影響喝奶量，喝完後協助嬰兒排氣
C.排氣時一定要聽到打嗝排氣的聲音，否則放回床上嬰兒會吐奶
D.哺餵母乳時，如果一直有「嘖嘖」聲，表示可能吸入空氣而需要排氣

(D) 16.陳女士至醫院照顧媳婦，向護理師表示：「你教導的我都會，我們住一起，阿孫我會照顧沒關係。」下列敘述何者最適當？
A.陳女士對嬰兒照護的知識與技能不一定正確，須提供完整的衛教
B.以產婦接受衛教的意願為主，當產婦提出需求時再衛教
C.透過產婦丈夫協調，請陳女士不要插手新生兒照護
D.同理陳女士的付出，討論照護方式的異同，並適時指導

(C) 17.健康足月的新生兒睡覺應採何種姿勢，才能降低嬰兒猝死症候群（sudden infant death syndrome, SIDS）發生的風險？
A.側臥
B.趴睡
C.躺臥
D.半坐臥

(B) 18.護理師進行新生兒沐浴時，下列何項措施最不適當？
A.新生兒沐浴前護理師應先洗淨雙手
B.使用水龍頭持續沖洗方式沐浴，以維持體溫
C.宜先沐浴再餵奶
D.室溫維持在24～27℃左右

(D) 19.有關新生兒先天性代謝異常篩檢的採血注意事項，下列敘述何者錯誤？
A.初次篩檢時機為出生後48 小時
B.最佳採血部位為後腳跟兩外側
C.以針穿刺採血部位後需將第一滴血擦拭掉
D.未符合篩檢條件者可延後至出生後2 個月採血

(B) 20.有關Rh 因子激敏反應（Rh sensitization）之敘述，下列何者正確？
A.通常發生於Rh 陽性之母親懷有Rh 陰性之胎兒時，或Rh 陰性之母親懷有Rh 陽性之胎兒時
B.母親間接性昆氏試驗（indirect Coomb's test）陰性者，於產後72 小時內需給與母親肌肉注射300 μg RhoGAM
C.若母親及父親均為Rh 陰性，仍會產生Rh 因子激敏反應
D.間接性昆氏試驗（indirect Coomb's test）是為檢測胎兒體內Rh 陽性抗體數

(A) 21.王女士懷孕41 週，醫師建議引產，下列敘述何者錯誤？
A.引產藥物oxytocin 初始須採用高劑量，促使宮縮愈密
B.使用PGE2 可促進子宮頸之成熟與軟化
C.Misoprostol（Cytotec）易引起子宮過度收縮
D.胎頭骨盆不相稱（CPD）為引產禁忌症

【版權所有，翻印必究】

(C) 22.張女士，30 歲，G1P0，妊娠24 週產檢的血壓量測值為118/78 mmHg，尿蛋白與尿糖測試均為陰性(-)。妊娠28 週產檢檢測血壓值為140/96 mmHg，間隔四小時再測之血壓值145/100 mmHg，尿蛋白為1+，尿糖仍為(-)，水腫(++)，依據上述相關症狀的敘述，下列何者為張女士最可能之診斷？
A.慢性高血壓（chronic hypertension）
B.妊娠高血壓（gestational hypertension）
C.子癲前症（preeclampsia）
D.白袍高血壓（white coat hypertension）

(B) 23.心臟病孕婦在那個時期開始心臟負荷達到最高峰？
A.懷孕24～26 週
B.懷孕28～32 週
C.懷孕36～38 週
D.懷孕38～40 週

(C) 24.有關罹患骨盆腔炎症婦女之照護措施，下列何者錯誤？
A.採半坐臥以促進引流
B.性伴侶必須同時接受治療
C.給與陰道灌洗，以減少上行性感染
D.發炎期間要避免性生活

(A) 25.鄭女士子宮頸抹片結果為低度鱗狀上皮病變（LSIL），下列建議何者最適當？
A.每3～6 個月接受1 次抹片檢查
B.立即安排子宮頸錐狀切除
C.6 週後重做抹片檢查
D.每年定期做子宮頸抹片檢查

(D) 26.有關厭食症的敘述，下列何者錯誤？
A.患者大多數為女性
B.自覺身體外型太胖，而甘願忍受飢餓
C.常見症狀有四肢冰冷、頭暈、無月經等
D.治療時體重增加以每週2 公斤為宜

(D) 27.小丁，10 個月大，3 歲姊姊餵他吃果凍，結果發生咳嗽，聲音嘶啞，有意識但呼吸困難，請問此時的急救處理為何？
A.立即抓起小丁雙腳倒立拍背
B.立即讓小丁躺平，一手朝向劍突往上施壓
C.立即讓小丁平躺桌上，胸部按壓30 下
D.立即抱起小丁置於施救者前臂，並將施救者前臂放在大腿上，施予背部叩擊及胸部推擠

(A) 28.小華，2 歲10 個月，有關其發展評估的敘述，下列何者正確？
A.一般情況，20 顆乳牙應全部長齊
B.頭部後囟門已關閉，前囟門尚未關閉
C.此階段是語言發展巔峰期，可以完整表達語意
D.此階段正在發展物體恆存概念，最喜歡玩躲貓貓遊戲

(B) 29.有關兒童給藥時之特別注意事項，下列敘述何者錯誤？
A.劑量小於1 mL 的藥物，應使用1 c.c.空針量計
B.兒童最準確的劑量為成人劑量×兒童體重÷年齡
C.服用藥物時，勿和食物混合吃
D.肌肉注射時若兒童睡著，必須要先喚醒兒童

(D) 30.執行新生兒身體評估時，下列何項反應，需要做進一步的檢查？
A.巴賓斯基氏反射（Babinski's reflex）呈陽性
B.心跳120～160 次／分鐘
C.眼尾與耳廓頂端在同一直線
D.臍帶內有一條動脈二條靜脈

(B) 31.小花，1 歲大，女生，足月產，出生體重3,020 公克，身高45 公分，下列敘述何者最符合此年齡層的生長發展？
A.能自己獨立上下樓梯
B.體重約為9 公斤
C.開始會出現生理性弓形腿
D.乳齒大約長20 顆

(D) 32.小芬，6 個月大，媽媽開始準備副食品以增加營養，宜避免下列何項食物？
A.蘋果汁
B.麥粉或米粉
C.富含鐵質的食物
D.蜂蜜

高點醫護【版權所有翻印必究】

(C) 33.曉鈴，14 歲，診斷第一型糖尿病入院，有關其護理照護措施，下列敘述何者錯誤？
A.尊重曉鈴的決策，鼓勵自我照顧及規劃
B.提供可用資源，協助重建自我心像
C.鼓勵父母協助曉鈴胰島素注射，強化親子連結
D.住院期間鼓勵與同儕聯繫，強化自我認同

(A) 34.陳小妹出生後24 小時內未解胎便，醫師檢查發現其直腸末端出現盲端，肛門無出口，診斷為肛門閉鎖（imperforate anus）。有關手術後的護理照護措施，下列敘述何者不適當？
A.協助採平躺姿勢，以免壓迫傷口縫線
B.禁止量肛溫，避免影響傷口癒合
C.維持傷口區域的清潔與乾燥
D.護理指導術後肛門擴張術的照護事項

(C) 35.陳小妹，7 歲，因腦瘤復發，發生骨頭及肺部轉移，治療無效，面臨死亡時，有關陳小妹之瀕死護理，下列敘述何者最適當？
A.出現臨終嘎聲時，應協助抽痰，維持呼吸道通暢
B.對光線很敏感，應降低室內光線，減少光線刺激
C.依醫囑靜脈注射morphine，減少不必要的口服藥
D.出現呼吸變慢、費力時，應給與插管、使用呼吸器

(A) 36.有關於罹患先天性梅毒病童的診斷及照護措施，下列敘述何者最適當？
A.初期出現鼻塞及鼻炎症狀，變為膿性及黏液性鼻分泌物
B.因病童應適當隔離，教導家屬避免接觸病童
C.病童的皮膚表面剝落處，可以塗敷不含酒精的優碘（iodine）消毒
D.梅毒感染第三期為非傳染期，不需隔離

(B) 37.有關兒童傳染病的隔離方式與隔離時間，下列敘述何者正確？
A.水痘採接觸隔離，直到水疱結痂脫落後24 小時
B.猩紅熱採呼吸道隔離，直到開始抗生素治療後24 小時
C.麻疹採呼吸道隔離，直到疹子痂皮脫落後24 小時
D.德國麻疹採呼吸道隔離，直到疹子消失後24 小時

(B) 38.小強，11 歲，罹患氣喘，尖峰呼氣流速值（peak expiratory flow rate）個人最佳值為240 L/min。某天早上，其尖峰呼氣流速值為160 L/min，到傍晚上升為200 L/min，小強目前尖峰呼氣流速的變異度（variance）之相關敘述，下列何者正確？
A.變異度為16.7%，早上尖峰呼氣流速值處於紅燈區
B.變異度為22.2%，早上尖峰呼氣流速值處於黃燈區
C.變異度為28%，傍晚尖峰呼氣流速值處於綠燈區
D.變異度為30%，傍晚尖峰呼氣流速值處於紅燈區

(D) 39.有關扁桃腺切除（tonsillectomy）術後病童避免傷口出血之護理指導，下列敘述何者不適當？
A.避免清喉嚨
B.不宜用力咳嗽
C.避免擤鼻涕
D.仰臥幫助止血

(C) 40.小東，7 歲，依醫囑服用毛地黃（digoxin），有關小東的護理處置，下列敘述何者錯誤？
A.建議多食用香蕉，增加鉀離子，避免引發毛地黃中毒
B.心尖脈低於70 至80 次／分鐘，則不給毛地黃
C.毛地黃應與食物一起服用，以增加吸收量
D.常見的毛地黃中毒症狀為噁心、嘔吐或厭食

(D) 41.缺鐵性貧血是兒童常見的貧血，下列敘述何者錯誤？
A.口服鐵劑時，應避免與制酸劑和牛奶一起使用
B.症狀為皮膚蒼白、疲倦，症狀不明顯且不易被發現
C.可多補充肝臟、肉類、全穀類及深綠葉蔬菜等食物
D.採Z 字型肌肉注射鐵劑，注射後均勻搓揉以利吸收

(D) 42.兒童罹患白血病，處於復發狀態，醫師建議執行骨髓移植，移植前須經人類白血球抗原配對，下列何者是最佳的骨髓提供者？
A.爸爸或是媽媽
B.奶奶或是爺爺
C.大兩歲的哥哥
D.同卵雙胞胎姐姐

(A) 43.有關高胱胺酸尿症（homocystinuria）之敘述，下列何者錯誤？
A.是一種體染色體顯性遺傳
B.會出現水晶體脫垂和眼睛的病變
C.對維生素B6 反應不佳者，需限制甲硫胺酸食物

【版權所有，翻印必究】

D.禁喝母奶，採用特殊配方奶粉

(C) 44.小傑，3 歲，罹患威爾姆氏腫瘤（Wilms tumor），下列敘述何者最不適當？
A.此為兒童時期常見的腹部腫瘤
B.腎臟切除術為首要的治療方式
C.每班確實進行腹部觸診的護理評估
D.嚴密監測腎臟功能及血壓值的變化

(D) 45.全奶濃度14%，每30 c.c.約含有20 大卡的熱量。若每4 小時需進食配方奶90 c.c.，當濃度為半奶時，則每日由配方奶所獲得的熱量約為多少大卡？
A.120
B.140
C.160
D.180

(A) 46.球球，4 歲，明欲執行腸道手術，今晚需進行手術前大量清潔灌腸，有關執行大量清潔灌腸，下列何者最適當？
A.採左側臥，右膝屈曲姿勢
B.溶液溫度保持37～38℃
C.一般灌腸液體為蒸餾水
D.灌腸筒液面與兒童肛門距離為15～20 公分

(B) 47.王小弟，8 個月，因重複泌尿道感染入院求治，診斷為膀胱輸尿管逆流，有關其抗生素的使用，下列護理指導何者正確？
A.體溫正常即可停用抗生素，以免長期用藥產生副作用
B.抗生素停用前的尿液培養檢查至少兩次呈現陰性
C.從導尿管取尿，若單一病原達104 菌落數，推定為泌尿道感染
D.慢性感染時，低劑量抗生素持續服用至成年

(A) 48.小妮，出生時罹患脊髓脊膜膨出（myelomeningocele），有關其手術前的護理措施，下列敘述何者錯誤？A.協助維持仰臥姿勢，並抬高床頭，以促進末梢血循
B.觀察小妮神經學各項功能之狀況
C.保持臀部與會陰處乾淨，避免膨出的囊沾到排泄物
D.使用無菌生理食鹽水紗布覆蓋膨出的囊，以避免囊袋破裂

(B) 49.張小弟，9 歲，罹患裘馨氏假肥大性肌失養症（Duchenne's pseudohy-pertrophic muscular dystrophy），有時走路較為困難，下列護理指導何者正確？
A.儘早給與坐輪椅，避免常跌倒骨折
B.出現逐漸退化的肌肉無力現象，須關注病童及家屬心理反應
C.避免游泳，以免感染
D.為避免呼吸依賴，呼吸有異常者夜眠仍不宜使用呼吸器

(A) 50.有關顱內壓升高（increased intracranial pressure, IICP）晚期徵候之庫欣氏三病徵（Cushing's triad），下列敘述何者錯誤？
A.體溫下降（hypothermia）
B.血壓上升（hypertension）
C.心跳徐緩（bradycardia）
D.呼吸變慢或不規則（respiratory depression）

【版權所有，翻印必究】