

《產兒科護理學》

- B 1 有關我國目前優生保健法中的人工流產之相關規定與法則，下列敘述何者正確？
 (A)有配偶之婦女若因懷孕或生產將影響其心理健康，而自願實施人工流產者，不須告知配偶，即可實施人工流產
 (B)若符合法令規定之適用對象且無身體異常情形，可以使用Mifepristone-RU486 施行人工流產
 (C) 16 歲以上之未婚婦女依相關規定實施人工流產，不須經過法定代理人同意即可實施
 (D)因配偶之四親等以內之血親患有礙優生之遺傳疾病者，而自願實施人工流產者，須告知配偶，方可實施人工流產
- B 2 李女士 24 歲，G₁P₀，現懷孕 32 週，產檢皆正常。主訴頻尿但無灼熱感，睡覺平躺時很容易頭暈、心悸。詢問護理師原因，下列回應何者最恰當？
 (A)懷孕頻尿和頭暈很正常，小心一點就可以了
 (B)頻尿是目前常見的症狀，不要憋尿；睡覺頭暈、心悸可能跟姿勢有關，試試側睡
 (C)頻尿是泌尿道感染，要注意會陰部清潔；頭暈、心悸可能是貧血，多吃深綠色蔬菜
 (D)頻尿是泌尿道感染，頭暈是貧血，等會告訴醫師檢查一下
- B 3 林女士，G₁P₀，懷孕 14 週，今天產檢時的主訴如下，下列那一項較不符合目前的生理變化？
 (A)最近常覺得有心悸 (B)感覺寶寶在睡前活動較多
 (C)噁心嘔吐感好像比較少了 (D)懷孕前的褲子扣子都扣不上了
- C 4 王女士，懷孕 16 週，有關產檢報告結果，下列何者需最優先給予衛教？
 (A)尿糖陰性 (B)尿蛋白微量 (C)德國麻疹 IgG 陰性 (D) B 型肝炎 HBsAg 陰性
- C 5 阮氏女士，懷孕 32 週，有關胎動監測之護理指導，下列何者不適當？
 (A)每天同一時間測量，兩小時內至少有 10 次胎動
 (B)胎動比昨天的次數少一半是不正常
 (C)飯前或空腹時比較容易有明顯胎動
 (D)觀察時雙手可以放在腹部觸摸感受
- B 6 第三孕期婦女抱怨下肢腫脹，傍晚時鞋子就穿不下，下列護理指導何者不適當？
 (A)可穿舒適軟質包鞋 (B)穿著及膝彈性襪 (C)可做足背屈曲運動 (D)臥床休息時，採左側臥
- A 7 王女士，G₁P₀，妊娠 39 週，因規則陣痛入院待產，護理紀錄上寫著「Effacement: 50%」，其代表的意思為何？
 (A)子宮頸變薄程度達 50% (B)胎心音變異性達 50%
 (C)胎頭下降進入骨盆腔 50% (D)胎兒內轉已完成 50%
- C 8 潘女士，G₁P₀，懷孕 41 週，因規則陣痛而入院待產，胎位為左枕前位 (LOA)，未接受硬脊膜外麻醉。現因宮縮強且密集，陰道內診發現子宮頸已擴張完全，胎兒高度+2。在此情境下，下列敘述何者不適當？
 (A)臉部顯得潮紅，陰道口看到的現血量增加
 (B)宮縮時，出現不自主向下用力的動作
 (C)胎心音在母體左邊腋骨前上棘與肚臍連線的中點附近最清楚
 (D)胎心率在宮縮開始時變慢，在宮縮高峰時達到最低點，宮縮結束又恢復正常
- B 9 第二產程中所應用的呼吸型式中，能減少因胎兒娩出時所致會陰或產道撕裂傷，下列何項最不適當？
 (A)吹蠟燭呼吸法 (B)屏氣 10 秒向下用力 (C)開聲門用力 (D)緩慢哈氣呼吸
- C 10 徐女士 30 歲，G₂P₁，懷孕 35 週。因在家感覺子宮規則收縮疼痛，故入院。檢查發現每隔 10 分鐘宮縮一次，持續 30 秒，強度 40 mmHg，內診子宮頸口開 4 公分，70%變薄，胎位為臀位，主訴有很多水從陰道流出。護理師最優先的照護措施為下列何者？
 (A)立刻通知超音波室 (B)給予靜脈輸液 (C)監測胎兒心跳速率 (D)準備進行催生
- A 11 有關治療子宮內膜異位症的藥物，下列何者錯誤？
 (A)排卵藥 (B)含黃體素的口服避孕藥
 (C)雄性素衍生荷爾蒙，如：Danazol (D)促性腺激素釋放荷爾蒙類似物 (GnRH Analogs)

- D 12 有關產後憂鬱症 (postpartum depression) 的敘述，下列何者錯誤？
 (A)持續支持並協助順利哺餵母乳有利於改善症狀 (B)症狀常在產後 4 週出現，且症狀持續超過 2 週
 (C)可能與面臨經濟壓力與家事照顧問題有關 (D)可能與產後動情素、黃體素濃度突然上升有關
- B 13 有關哺乳期各種避孕法，下列敘述何者錯誤？
 (A)非荷爾蒙作用之避孕措施，不會影響泌乳，可以安全使用
 (B)單一雌性素的荷爾蒙避孕藥不會影響乳汁分泌，適合選用
 (C)雌性素及黃體素之混合型避孕藥，可能減少奶量，不建議使用
 (D)如果不再有生育的計畫，輸精管結紮是永久避孕的首選
- B 14 吳女士陰道生產，產後第 3 天表示：「坐著哺乳我的腰很痠」，下列何種產後運動最適合教導？
 (A)凱格爾氏運動 (Kegel's exercise) (B)骨盆搖擺運動
 (C)下肢抬腿運動 (D)仰臥起坐
- D 15 王女士，初產婦，陰道生產，採純母乳哺育，產後 6 週重返職場的一週後，因發燒乳房紅腫熱痛求診，診斷為乳腺炎。下列的護理措施何者不適當？
 (A)改善發紅部位的乳房引流
 (B)進行完整的哺乳史評估，並去除可能的導因
 (C)給予症狀照護，包括：餵奶前服用止痛藥，或餵奶後冰敷止痛
 (D)立即協助乳汁培養並立即進行完整抗生素治療
- D 16 有關胎盤早期剝離之敘述，下列何者錯誤？
 (A)需要密切觀察胎心音 (B)易呈現高張力宮縮
 (C)可能合併症為瀰漫性血管內凝血 (DIC) (D)為無痛性的陰道出血
- B 17 護理人員使用新貝拉 (New Ballard Score) 量表，進行四位出生第 3 小時的新生兒成熟度評估，下列那位新生兒可能為早產兒？
 (A)王小弟，方形窗徵象角度為 0° ，手臂反彈角度為 60°
 (B)林小妹，膝關節角度為 140° ，全身胎毛豐富
 (C)黃小弟，圍巾徵象手肘不能越過同側乳房中線，乳暈突起且直徑 5 mm
 (D)洪小妹，足底前 2/3 有皺褶，皮膚乾燥看不見血管
- B 18 有關新生兒篩檢的敘述，下列何者正確？
 (A)採血時間為新生兒出生後滿 12 小時
 (B)穿刺部位應選擇足跟的外面兩側
 (C)血量不足時，應用力擠壓穿刺部位以利血液流出
 (D)為減少新生兒的疼痛，應使用注射針頭進行採檢
- C 19 下列何項護理措施較無法改善新生兒溢奶的狀況？
 (A)餵食採漸進式奶量增加 (B)餵食後協助排氣
 (C)餵食後採左側臥 (D)避免過度餵食
- B 20 下列何種情況易導致待產婦女發生子宮內翻 (Uterine Inversion)？①娩出胎盤時過度牽引臍帶 ②過早注射 Methergin ③在子宮底施加壓力 (fundal pressure) ④胎盤早期剝離
 (A)①② (B)①③ (C)③④ (D)②④
- A 21 林女士，入院待產，醫師內診時發現臍帶脫垂，下列處置何者錯誤？
 (A)將脫出的臍帶再推回子宮內 (B)使用無菌生理食鹽水紗布覆蓋
 (C)若子宮頸尚未完全擴張，緊急剖腹生產 (D)戴無菌手套從陰道將先露部位往上頂
- D 22 待產婦女於生產過程中發生肩難產 (shoulder dystocia) 時，下列處置何者為宜？①教導待產婦快速屈曲大腿靠向腹部 ②於子宮底施壓 ③加強子宮收縮藥劑量 ④注意胎心音變化
 (A)①③ (B)②③ (C)②④ (D)①④
- A 23 重度子癩前症孕婦之飲食指導，下列建議何者最適當？
 (A)高蛋白質低鈉飲食 (B)低蛋白質低鈉飲食 (C)低蛋白質高鈉飲食 (D)高蛋白質高鈉飲食
- B 24 護理師從胎兒監測器得知，胎兒心跳 100 次/分，持續 80 秒，其型態與宮縮沒有一定關係，此胎心率型態為：
 (A)胎心率正常 (B)變異性減速 (C)早發性減速 (D)晚發性減速

代號：4101

頁次：4-3

- C 25 毛女士接受人工受精治療後懷孕併多胞胎妊娠，將接受減胎術，毛女士表示很擔心嬰靈會對自己有不好的影響，下列護理師之回應何者最適當？
 (A)嬰靈說法無科學根據，減胎是不得不的決定
 (B)衛教多胞胎的早產風險，告訴毛女士她是以大局為重
 (C)詢問毛女士的宗教信仰，鼓勵毛女士說出對嬰靈的看法
 (D)請毛女士不要胡思亂想，為了腹中胎兒她要往前看
- D 26 合併唇裂 (cleft lip) 與腭裂 (cleft palate) 嬰幼兒之手術前護理措施，下列敘述何者最適當？
 (A)餵食時，使用孔洞小的奶嘴，避免吞食過多空氣
 (B)以鼻胃管餵食，避免使用口腔唇舌肌肉，擴大唇裂與腭裂之裂縫
 (C)餵食時，採平躺姿勢，利於吞嚥，避免奶水溢出
 (D)餵食時，餵食器放於口腔內後方或臉頰內側面，避免奶水進鼻腔內
- D 27 關於自閉症兒童的敘述，下列何者錯誤？
 (A)出現孤立的人際互動，缺乏目光接觸 (B)對環境改變很敏感，須儘量維持一致性
 (C)難以接受改變的僵化思考模式 (D)用 luminal 治療疾病，須服用 6~8 週後效果佳
- C 28 有關成骨不全 (osteogenesis imperfecta) 的相關敘述，下列何者錯誤？
 (A)藍色鞏膜為典型症狀之一 (B)可能會喪失聽力
 (C)需要限制任何活動 (D)四肢極短且彎曲呈弓形、肌肉張力減退
- C 29 小華會把樂高分享給小美，兩人會交換玩具，但各玩各的，是屬於兒童遊戲發展那一個階段？
 (A)合作遊戲 (B)聯合遊戲 (C)平行遊戲 (D)旁觀遊戲
- B 30 關於 9 歲學齡期兒童的發展及生長，下列敘述何者最適當？
 (A)喜歡模仿成人行為 (B)有質量保留的概念 (C)可以做抽象思考 (D)對男女生殖器感到好奇
- C 31 一瓶 nystatin 懸浮液為 100,000 units/mL，兒童罹患鵝口瘡需要一天四次服用，每次給予 250,000 units，請問應給予幾 mL？
 (A) 1.5 (B) 2.0 (C) 2.5 (D) 3.0
- B 32 3 歲的小杰生病住進了加護病房第 4 天，小杰顯得安靜、沉默以及對病房的事物不感興趣，其分離焦慮是處於那個時期？
 (A)抗議期 (protest) (B)失望期 (despair)
 (C)去依戀期 (detachment) (D)過渡期 (transition)
- C 33 有關壞死性結腸炎 (necrotizing enterocolitis) 的敘述，下列何者正確？
 (A)腸黏膜壞死後，以革蘭氏陽性菌最常侵犯腸壁
 (B)常侵犯部位是在幽門附近及小腸近端處
 (C)引起的原因是腸黏膜缺血缺氧
 (D)優先採取的處置是以鼻胃管餵食半奶的嬰兒配方奶
- D 34 楊小妹，妊娠週數 31 週，出生體重 1,628 公克，有關楊小妹出生後的生理特徵，下列敘述何者錯誤？
 (A)腎小管再吸收功能差，會出現蛋白尿及尿糖
 (B)凝血因子不足與維生素 K 低下，易出現凝血功能不良
 (C)乳糖消化能力尚未成熟，會有暫時性乳糖吸收不良症
 (D)肺泡表面張力素分泌不足，容易出現持續性肺動脈高壓
- C 35 7 歲的小雄，面對爺爺過世，小雄一直吵著媽媽說爺爺在睡覺，要去找爺爺說話。有關和小雄談論死亡的敘述，下列何者不適當？
 (A)鼓勵小雄說出心裡的話和問題 (B)正確的向小雄描述死亡的狀態和事實
 (C)避免讓小雄參加喪禮 (D)利用日常經驗或影片認識死亡
- C 36 有關新生兒胎便吸入症候群的症狀及處置之敘述，下列何者錯誤？
 (A)皮膚、指甲，或臍帶有胎便沾染痕跡
 (B)可能發生呼吸窘迫的症狀
 (C)羊水有胎便，嬰兒娩出後，立即以甦醒球 (ambu bag) 加壓刺激呼吸
 (D)動脈血液氣體分析顯示呼吸衰竭，需矯正呼吸性酸中毒
- D 37 有關嬰兒玫瑰疹 (roseola) 的評估，下列敘述何者錯誤？
 (A)會出現突然的高燒且持續 3~5 天左右 (B)枕下/耳後的淋巴結可能有腫大的情形
 (C)軀幹先出現散發性的玫瑰紅斑點 (D)發疹期間大約會持續 1 週以上才消退
- A 38 有關病童接受氧氣治療的照護措施，下列敘述何者最適當？
 (A)以氧氣濃度分析儀上的感應器測量氧氣濃度時，病童的口鼻處為最佳部位
 (B)使用氧氣頭罩時，氧氣流速最好小於 3 L/min，避免二氧化碳滯留
 (C)鼻套管管徑較小，氧氣流速宜在 10 L/min 以上，以免氧氣濃度不足

- (D)使用氧氣帳的目的包括讓病童與他人隔離以避免傳染
- C 39 10 歲的連小妹持續乾咳多日，有輕微發燒，胸部 X 光檢查發現兩側下肺葉呈現間質性浸潤，痰中的單核白血球上升，且家中的雙胞胎妹妹也曾有類似的症狀，下列何者為連小妹罹患肺炎最可能的致病因子？
(A)金黃色葡萄球菌 (B)肺炎鏈球菌 (C)黴漿菌 (D)b 型嗜血桿菌
- C 40 2 歲的王小弟罹患先天性心臟病，以毛地黃 (digoxin) 治療，一天服用兩次。下列敘述何者正確？
(A)餐後半小時內服用藥物 (B)可與牛奶或果汁一起服用
(C)若忘了服用藥物，六小時內可以補給原劑量 (D)給藥後需測量心尖脈
- A 41 6 歲的小強因不明原因的貧血而入院，欲進行骨髓抽吸術 (bone marrow aspiration)，下列處置及護理措施何者錯誤？
(A)此年紀穿刺部位以近側脛骨優先
(B)穿刺後傷口應以紗布覆蓋加壓至少 15 分鐘以防出血
(C)術前評估小強是否有出血異常或服用凝血相關藥物
(D)穿刺後 1 小時內需密切監測生命徵象及傷口出血情形
- A 42 有關預防腫瘤溶解症候群 (tumor lysis syndrome) 所進行的相關處置，下列敘述何者錯誤？
(A)持續監測尿糖 (B)化學治療前大量給水
(C)依醫囑按時服用 allopurinol (D)靜脈輸液加入碳酸氫鈉
- C 43 3 歲的小萱出現發燒、臉色蒼白、腹痛，經醫師確診為神經母細胞瘤第三期，有關提供父母的護理指導，下列敘述何者不適當？
(A)神經母細胞瘤出現的症狀與壓迫部位有關
(B)因腫瘤已超過身體中線，手術已無法完全切除
(C)需抽血監測兒茶酚胺 (catecholamine) 以確認是否轉移
(D)骨髓檢查是要確認小萱骨髓是否受到侵犯
- C 44 有關甲狀腺功能亢進 (hyperthyroidism) 的照護措施，下列敘述何者最不適當？
(A)配合病童代謝率增加的需求，可準備高熱量飲食
(B)不可隨便停藥，以防病童產生甲狀腺危象
(C)觀察病童體溫過低的症狀和徵象
(D)病童注意力不集中，宜安排在安靜環境中學習
- A 45 有關乳糜或粥樣瀉 (celiac disease) 的敘述，下列何者正確？
(A)是自體免疫疾病，對麩質無法耐受所造成的腸病變
(B)飲食治療以穀類與麥類為主，並適時補充維生素 C
(C)無腹痛，但解血絲便
(D)使用廣效型抗生素以減輕腸道發炎情形
- A 46 有關排尿性膀胱尿道攝影 (voiding cystoureterography, VCUG) 的敘述，下列何者最適當？
(A)檢查目的為評估病童尿液逆流的嚴重程度
(B)檢查前應進行小量灌腸以幫助影像判讀
(C)檢查前鼓勵病童多喝水，有助於攝影的進行
(D)檢查過程無使用顯影劑，檢查後讓病童自然排尿即可
- B 47 有關人工肛門造瘻口之術後護理指導，下列何者較適當？
(A)當造瘻口流出大量水樣引流物時，表示功能正常
(B)術後三週內採低渣飲食，減少腸蠕動
(C)術後造瘻口一般外觀應呈深黑色且表面乾燥
(D)乙狀結腸造口糞便多呈液狀
- C 48 7 歲的奇奇罹患腦性麻痺，因基底核和錐體外病變，產生不自主運動，且出現無法控制四肢抖動，尤其影響手部的書寫功能，有關奇奇罹患之腦性麻痺的型態，下列何者正確？
(A)痙攣型 (spastic) (B)運動失調型 (ataxic)
(C)手足徐動型 (athetoid type) (D)無張力型 (atonic)
- B 49 10 歲的曉華罹患頑固型癲癇，醫生建議以生酮飲食治療，下列何者正確？
(A)高蛋白質、低醣類 (B)高脂肪、低醣類 (C)高醣類、高蛋白質 (D)高纖維質、低脂肪
- C 50 有關單側性發展性髖關節發育不良 (developmental hip dysplasia, DDH) 病童的臨床表徵，下列何者錯誤？
(A)病童的臀部及大腿皮膚皺褶左右不對稱
(B)患肢單腿站立時，健肢髖部的高度會向下傾斜
(C)仰臥，將髖部曲折成 90 度時，健肢膝部會降低
(D)患肢腿屈曲做外展運動時，會出現卡嗒 (click) 聲